

## প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাপ্রাঙ্গণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিপ্রিয় পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সময়ের রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দুরসংগ্রাহী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পদ্ধিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দুরসংগ্রাহী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাৎক্ষণ্য সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চৰ্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নবম পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, 2017

---

বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যৱোৱ বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau  
of the University Grants Commission.

## পরিচিতি

বিষয় : গণিতবিদ্যা

সাম্যানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : EMT 04 : 01 & 02

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. জয়শ্রী রায়	ড. কৃষ্ণ পাল (কুণ্ড)
একক 2	ঐ	ঐ
একক 3	ড. রীতা ব্যানার্জী	ঐ
একক 4	ড. কাকন ভট্টাচার্য	ড. দীপক চ্যাটোর্জী
একক 5	ঐ	ঐ
একক 6	ড. উমেশচন্দ্র পান	ড. অমিত দাশগুপ্ত
একক 7	ঐ	ঐ
একক 8	ঐ	ঐ
একক 9	ঐ	ঐ
একক 10	ড. শঙ্কিকান্ত চক্রবর্তী	ঐ

### প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উন্মুক্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়  
নিবন্ধক





## নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EMT 04

ভেষ্টর বীজগণিত

ও

ভেষ্টর ক্যালকুলাস

পর্যায়

1

পুরাতনী বীজগণিত

একক 1	<input type="checkbox"/> ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির কার্তিয স্থানাঙ্ক, দিক্ক-কোসাইন ইত্যাদি	7-35
একক 2	<input type="checkbox"/> ভেষ্টর	36-81
একক 3	<input type="checkbox"/> ভেষ্টর গুণন	82-135
একক 4	<input type="checkbox"/> ভেষ্টরের জ্যামিতিক প্রয়োগ	136-176
একক 5	<input type="checkbox"/> ভেষ্টর অন্যান্য প্রয়োগ	177-193

## পর্যায়

2

### ডেষ্ট্র ক্যালকুলাস

একক 6	ডেষ্ট্র ডেরিভেটিভ বা অবকল	194–225
একক 7	ডেষ্ট্র সমাকলন	226–251
একক 8	প্রেডিয়েণ্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল	252–291
একক 9	গাউস ও স্টোকসের উপপাদ্য	292–341
একক 10	ডেষ্ট্র ক্যালকুলাসের প্রয়োগ	342–372

---

## একক ১ : ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির কার্তিয় স্থানাঙ্ক, দিক্ক নির্দেশক কোসাইন ইত্যাদি

---

গঠন :

- 1.1 প্রস্তাবনা
- 1.2 উদ্দেশ্য
- 1.3 ত্রিমাত্রিক দেশে কার্তিয় স্থানাঙ্ক, বেলনাকার স্থানাঙ্ক ও গোলীয় স্থানাঙ্ক
- 1.4 ত্রিমাত্রিক দেশে দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়, অন্তর্বিভাজন ও বহির্বিভাজন
- 1.5 দিক্ক যুক্ত রেখাংশ, লম্ব অভিক্ষেপ, কোন সরলরেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন ও দিক্কনির্দেশক অনুপাত, নির্দিষ্ট দিক্কযুক্ত দুটি সরলরেখার অন্তর্গত কোণ, ত্রিমাত্রিক দেশে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়,
- 1.6 সারাংশ
- 1.7 বিবিধ প্রশ্নমালা
- 1.8 সমাধান / উত্তরমালা

## 1.1. প্রস্তাবনা :

এই এককে আমরা ত্রিমাত্রিক দেশে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির প্রাথমিক আলোচনা করব। ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ব্যবহার গণিত শাস্ত্রের বিবিধ বিষয়ে। এছাড়া পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), ভূবিদ্যা (Geology), ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা প্রভৃতিতে এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনঙ্গীকার্য। স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বলতে বুঝি জ্যামিতিক সমস্যাগুলিকে বীজগাণিতিক সমীকরণে রূপান্তরিত করে সেই সমীকরণগুলিকে সরল করা এবং তাদের সমাধান বার করা (জ্যামিতিক ধর্ম ব্যবহার করে)। সংক্ষেপে বলা যায় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, — বীজগাণিত ও জ্যামিতির মধ্যে এক একের সম্বন্ধ (one to one correspondence) সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ স্থানাঙ্ক জ্যামিতির ক্ষেত্রে যে কোন জ্যামিতিক ধর্মকে স্থানাঙ্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা যায় ও সেই সব ধর্মের ব্যবহারও স্থানাঙ্কের মাধ্যমেই হয়। যেমন দুটি রেখার অঙ্গুলুক কোন  $\theta = \tan^{-1} \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$  যেখানে  $m_1, m_2$  স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্দেশ করা যায়।

যে সকল বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে তাদের ত্রিমাত্রিক বস্তু বলে। কোন ত্রিমাত্রিক বস্তু যে দেশ জুড়ে থাকে তাকে ত্রিমাত্রিক দেশ বলে। ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বস্তুর জ্যামিতিক দিকগুলি আলোচনা করার জন্য প্রথমেই কোন বিন্দুর ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে আপনাদের জানা আছে। ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা হয় পরস্পর লম্ব দুটি অক্ষের ( $x'ox$  ও  $y'oy$ ) সাপেক্ষে দুটি স্থানাঙ্ক ( $x, y$ ) দ্বারা। একই ভাবে ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা হয় তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে তিনটি স্থানাঙ্ক দ্বারা। এই এককে ত্রিমাত্রিক দেশে দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করা হবে তাদের স্থানাঙ্কের সাপেক্ষে। ছেদ অনুপাত ও কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বলতে কি বোঝায় তার আলোচনাও করা হবে। ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির দ্বারা সমতল, সরলরেখা, গোলক, চোঙ প্রভৃতির সমীকরণ নির্ণয় এবং তাদের বিস্তৃত আলোচনা অন্য পর্যায়ে জানতে পারবেন। এই এককে ভেক্টরের পঠনের জন্যও ভেক্টরের প্রয়োগ জ্যামিতিতে করতে গেলে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির ধারণা যতটুকু প্রয়োজন শুধু সেই অংশটুকুই আলোচিত হবে।

## 1.2. উদ্দেশ্য

এই একক পঠনের পর আপনি যে বিষয়গুলি করতে পারবেন সেগুলি হল :—


- ত্রিমাত্রিক দেশে কোন বিন্দুর লম্ব কার্তিয় স্থানাঙ্ক, বেলনাকার স্থানাঙ্ক ও গোলীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- ত্রিমাত্রিক দেশে দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বার করতে পারবেন।
- অঙ্গুলিভাজন ও বহির্ভাজন পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।
- কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন ও দিক নির্দেশক অনুপাত নির্ণয় করতে পারবেন।
- নির্দিষ্ট দিক্যুক্ত দুটি সরলরেখার অন্তর্গত নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ত্রিমাত্রিক দেশে কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবেন।

### 1.3. ত্রিমাত্রিক দেশে কার্তিয় স্থানাঙ্ক, বেলনাকার স্থানাঙ্ক ও গোলীয় স্থানাঙ্ক

আমরা আগেই বলেছি যে সমস্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে তাদের ত্রিমাত্রিক বস্তু বলে। এই সকল বস্তুর মধ্যস্থিত বা উপরিস্থিত কোন বিন্দুর যদি অবস্থান নির্ণয় করতে হয় তাহলে তিনটি সংখ্যা প্রয়োজন। এখানে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।


#### 1.3.1 লম্ব কার্তিয় স্থানাঙ্ক (Rectangular Cartesian Co-ordinates)

ত্রিমাত্রিক দেশে একটি বিন্দুতে পরস্পর লম্ব তিনটি সরলরেখা অঙ্কন করা যায়। ধরি, যে কোন বিন্দু O-তে  $x'ox$ ,  $y'oy$ ,  $z'oz$  তিনটি পরস্পর লম্ব সরলরেখা অঙ্কন করা হল (O - বিন্দুতে একপ একাধিক ত্রিয় অঙ্কন করা সম্ভব)।  $ox$ ,  $oy$ ,  $oz$  যথাক্রমে পরস্পর লম্ব রেখা তিনটির ধনাত্ত্বক দিক্ষ ও  $ox'$ ,  $oy'$ ,  $oz'$  ঋণাত্ত্বক দিক্ষ নির্দেশ করে। এই দেশে P যে কোন বিন্দু। এখন P বিন্দুগামী তিনটি সমতল অঙ্কন করা হল যারা যথাক্রমে  $yoz$ ,  $zox$  ও  $xoy$  সমতলের সমান্তরাল। এরাপে অঙ্কিত সমতল তিনটি  $x'ox$ ,  $y'oy$  ও  $z'oz$  রেখাগুলিকে যথাক্রমে A, B ও C বিন্দুতে ছেদ করে। এখানে  $OA = x$ ,  $OB = y$ ,  $OC = z$  হলে  $(x, y, z)$  – এই ক্রমিক সংখ্যা (ordered number) তিনটি তাদের মান ও চিহ্ন দ্বারা  $ox$ ,  $oy$ ,  $oz$ -র সাপেক্ষে P বিন্দুর অবস্থান সম্পূর্ণ রূপে নির্দেশ করে। এখানে  $(x, y, z)$ -কে P - বিন্দুর কার্তিয় স্থানাঙ্ক বলে।



চিত্র : 1.1

সহজভাবে ত্রিমাত্রিক দেশে যে কোন বিন্দু P-র স্থানাঙ্ক বার করতে গেলে P বিন্দু থেকে  $xoy$  সমতলের উপর PM লম্ব অঙ্কন করা হল। আপনারা  $xoy$  তলে অবস্থিত পাদবিন্দু M-র স্থানাঙ্ক দ্বিমাত্রিক দেশের স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সাহায্যে বার করতে পারেন। অর্থাৎ M বিন্দু থেকে থেকে  $oy$  এবং  $ox$  অক্ষের সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করা হল যারা  $ox$  ও  $oy$  অক্ষকে যথাক্রমে R ও Q বিন্দুতে ছেদ করে। সূতরাং OR ও OQ যথাক্রমে x ও y স্থানাঙ্ক নির্দেশ করে। যদি  $PM = |Z|$  হয় তবে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  হবে। এখানে লক্ষণীয় Z ধনাত্ত্বক অথবা ঋণাত্ত্বক হবে যদি  $PM$ ,  $OZ$ -র ধনাত্ত্বক অথবা ঋণাত্ত্বক দিকে অবস্থিত থাকে। অতএব বলা যেতে পারে এই ত্রিমাত্রিক দেশে প্রতিটি বিন্দু P-র জন্য তিনটি ক্রমিক বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যাবে। বিপরীত ভাবে যে কোন তিনটি প্রদত্ত ক্রমিক বাস্তব সংখ্যার জন্য ত্রিমাত্রিক দেশে একটি বিন্দুর অবস্থান পাওয়া যাবে যার স্থানাঙ্ক এই



চিত্র : 1.2

তিনটি বাস্তব সংখ্যা হবে। এখানে O বিন্দুটিকে মূল বিন্দু বলে।  $x'ox$ ,  $y'oy$ ,  $z'oz$  অক্ষ তিনটিকে একত্রে স্থানাঙ্ক নির্দেশক অক্ষ বলে বা অক্ষতত্ত্ব (axes of reference) বলে।  $xoy$ ,  $yoz$  ও  $zox$  তলগুলিকে অক্ষতল বলে (Co-ordinates planes)। তিনটি অক্ষ তল ত্রিমাত্রিক দেশকে আটটি অংশে (eight octant) বিভক্ত করে। লক্ষণীয়  $yoz$ ,

$zox$  ও  $xoy$  তল দ্বারা সীমায়িত অংশে  $x$ ,  $y$  ও  $z$ -র স্থানাঙ্ক সবই ধনাত্মক মান যুক্ত অর্থাৎ  $0 \leq x < \infty$ ,  $0 \leq y < \infty$ ,  $0 \leq z < \infty$  হবে। এরপে আটটি অংশে স্থানাঙ্কগুলির চিহ্ন নিম্নলিখিত ছকে নির্দেশিত হল।

আট অংশ (octant) স্থানাঙ্ক	oxyz	ox'y'z	ox'y'z'	ox'y'z'	oxyz'	ox'y'z'	oxy'z'	oxy'z'
$x$	+	-	-	-	+	-	+	+
$y$	+	+	-	-	+	+	-	-
$z$	+	+	+	-	-	-	-	+


### মন্তব্য

- $xoy$  তলে অবস্থিত যে কোন বিন্দুর  $Z$ -স্থানাঙ্ক শূন্য হবে এবং সেই বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $(x, y, 0)$  দ্বারা নির্দেশিত হবে। অনুরূপে  $yoz$  ও  $zox$  তলে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(0, y, z)$  ও  $(x, 0, z)$  হবে।
- $x'ox$ ,  $y'oy$  ও  $z'oz$  অক্ষের উপর অবস্থিত কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x, 0, 0)$ ,  $(0, y, 0)$  ও  $(0, 0, z)$  দ্বারা নির্দেশিত হবে।

### 1.3.2. বেলনাকার স্থানাঙ্ক (cylindrical Co-ordinates) ও গোলীয় (spherical) স্থানাঙ্ক :

কার্তিয় স্থানাঙ্কের পরিবর্তে আরও দূরকম স্থানাঙ্ক দ্বারা ত্রিমাত্রিক দেশে যে কোন বিন্দু  $P$ -র অবস্থান নির্ণয় করা যায়। যথা i) বেলনাকার স্থানাঙ্ক ও ii) গোলীয় স্থানাঙ্ক

- বেলনাকার স্থানাঙ্ক :



চিত্র : 1.3

1.3 নং চিত্রে  $ox$ ,  $oy$  ও  $oz$  পরম্পর তিনটি নির্দেশক অক্ষ।  $P$  যে কোন একটি বিন্দু যার কার্তিয় স্থানাঙ্ক  $(x; y, z)$ ।  $P$  বিন্দু থেকে  $xoy$  তলের উপর  $PN$  লম্ব অঙ্কন করা হল এবং  $N$  বিন্দু থেকে  $ox$  অক্ষের উপর  $NT$  লম্ব অঙ্কন করা হল যা  $ox$  অক্ষকে  $T$  বিন্দুতে ছেদ করে। সূতরাং আপনারা লিখতে পারেন

$$OT = x, TN = y \text{ এবং } NP = z$$

ধরি  $ON = r$ ,  $\angle TON = \theta$

অতএব  $x = r \cos \theta$  .... (1.1) [ $\angle OTN = 90^\circ$ , ত্রিভুজ  $OTN$  থেকে লেখা যায়  $\cos \theta = \frac{x}{r}$ ]

$$y = r \sin \theta \quad \dots \quad (1.2)$$

$$z = z$$

সমীকরণ (1.1) ও (1.2) কে বর্গ করে এবং যোগ করে লেখা যায়

$$r^2 = x^2 + y^2$$

সমীকরণ (2) থেকে  $r$ -র মান বসিয়ে পাওয়া যায়

$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$


অনুরূপে 1.1 নং সমীকরণ থেকে লেখা যায়

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{অতএব } \tan \theta = \frac{y}{x}; \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

সূতরাং  $(x, y, z)$ -র পরিবর্তে  $(r, \theta, z)$  দ্বারাও  $P$  বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা যাবে। এখানে  $(r, \theta, z)$ -কে বেলনাকার স্থানাঙ্ক বলে। চিরানুসারে  $r$ ,  $\theta$  ও  $z$ -র সম্ভাব্য মানের সীমা যথাক্রমে  $0 \leq r < \infty$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $-\infty < z < \infty$ .

iii) গোলীয় স্থানাঙ্ক :



চিত্র : 1.4

1.4 নং চিত্রে ধরি  $\angle ZOP = \theta$ ,  $oP = \rho$ ,  $\angle TON = \phi$ ,  $\angle PNO = 90^\circ$

$$\begin{aligned} \therefore x &= ON \cos \phi = oP \sin \theta \cos \phi \quad [\text{ত্রিভুজ } ONP \text{ থেকে } \cos(90 - \theta) = \sin \theta = \frac{ON}{oP}] \\ &= \rho \sin \theta \cdot \cos \phi \longrightarrow (1.3) \end{aligned}$$

$$y = ON \sin \phi = oP \sin \theta \sin \phi$$

$$= \rho \sin \theta \sin \phi \longrightarrow (1.4)$$

$$z = oP \cos \theta = \rho \cos \theta \longrightarrow (1.5) [\text{যেহেতু } \sin(90^\circ - \theta) = \frac{PN}{oP}]$$

সমীকরণ (1.3), (1.4) ও (1.5) কে বর্গকরে ও যোগ করে লেখা যায়

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

এবং (1.3) ও (1.4) এর বর্গ যোগ করে (1.5) দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়


$$\theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$$

একই ভাবে সমীকরণ (1.4) কে সমীকরণ (1.3) দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

সূতরাং  $(x, y, z)$ -র পরিবর্তে  $P$ -র অবস্থান  $(\rho, \theta, \phi)$  দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে।  $(\rho, \theta, \phi)$ -কে গোলীয় স্থানাঙ্ক বলে। চিত্রানুসারে  $\rho, \theta$ , ও  $\phi$ -র সম্ভাব্য মানের সীমা যথাক্রমে  $0 \leq \rho < \infty$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , এবং  $0 \leq \phi \leq 2\pi$ .

## 1.4 ত্রিমাত্রিক দেশে দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়, অন্তর্বিভাবজন ও বহির্বিভাজন



চিত্র : 1.5

মনে করি ত্রিমাত্রিক দেশে  $P(x_1, y_1, z_1)$  ও  $Q(x_2, y_2, z_2)$  যে কোন দুটি বিন্দু।  $P$  ও  $Q$  বিন্দুদ্বয় হতে যথাক্রমে  $xoy$  তলের উপর  $PM$  ও  $QM'$  লম্বদ্বয় অঙ্কন করা হল।  $M$  ও  $M'$  পাদ বিন্দু। তাহলে  $M$  ও  $M'$  বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, 0)$  ও  $(x_2, y_2, 0)$ । এখানে  $M$  ও  $M'$  বিন্দু দুটি  $xoy$  তলের উপর অবস্থিত। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ত্রিমাত্রিক দেশে দুটি বিন্দুর দূরত্ব কত হবে। অতএব এখানে  $Z = O$  ত্রিমাত্রিক তলে

$$MM'-\text{এর দূরত্ব} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$P$  বিন্দু হতে  $QM'$ -এর উপর  $PR$  লম্ব অঙ্কন করা হল যা  $QM'$ -কে  $R$  বিন্দুতে ছেদ করে। এখন চিত্রানুসারে,

$$PQ^2 = PR^2 + RQ^2 [ \text{PQR ত্রিভুজের } \angle PRQ = 90^\circ ]$$

$$= (MM')^2 + (Z_2 - Z_1)^2$$

$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$$

$$\therefore PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

মনে করি  $Q = (0, 0, 0)$  এবং  $P = (x_1, y_1, z_1)$  হয় তবে  $QP = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$

### 1.4.1 ছেদ অনুপাত : (Section Ratio)


A ও B বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাকে m : n অনুপাতে বিভাজনকারী P বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় :

i) অস্তর্বিভাজন :

ধরি A ও B বিন্দুর কার্তিয় স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$  ও  $(x_2, y_2, z_2)$ । যে কোন বিন্দু P যা AB কে m:n অনুপাতে অস্তর্বিভক্ত করে তার স্থানাঙ্ক হবে

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$$

প্রমাণ :



চিত্র : 1.6

A, P ও B বিন্দু তিনটি হতে xoy তলের উপর যথাক্রমে AA<sub>1</sub>, PP<sub>1</sub> ও BB<sub>1</sub> লম্ব অঙ্কন করা হল। এখন পাদ বিন্দু A<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> ও B<sub>1</sub> থেকে ox-অক্ষের উপর যথাক্রমে A<sub>1</sub>A<sub>2</sub>, P<sub>1</sub>P<sub>2</sub> ও B<sub>1</sub>B<sub>2</sub> তিনটি লম্ব অঙ্কন করা হল যারা ox অক্ষকে যথাক্রমে A<sub>2</sub>, P<sub>2</sub> ও B<sub>2</sub> বিন্দুতে ছেদ করে। এখানে  $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$ । ধরি P বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y, z), চিত্র নং 1.6 থেকে লেখা যায়

$$\frac{A_2 P_2}{P_2 B_2} = \frac{A_1 P_1}{P_1 B_1} = \frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$$

এখন  $OA_2 = x_1, OB_2 = x_2, OP_2 = x$  এবং  $\frac{A_2 P_2}{P_2 B_2} = \frac{m}{n}$

সূতরাং  $\frac{OA_2 - OP_2}{OP_2 - OB_2} = \frac{m}{n}$

বা  $\frac{x_1 - x}{x - x_2} = \frac{m}{n}$

বা  $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$

অনুরূপে A<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> ও B<sub>1</sub> বিন্দু তিনটি হতে oy-অক্ষের উপর লম্ব অঙ্কন করে পাওয়া যাবে  $y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$

এবং A, B, P বিন্দুগুলি হতে xoy তলের পরিবর্তে yoz তলের উপর লম্ব অঙ্কন করে অনুরূপে পাওয়া যাবে  $y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$  এবং  $z = \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}$

অতএব P বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right)$

মন্তব্য : P যদি AB-র মধ্যবিন্দু হয় তবে P-র স্থানাঙ্ক


$$\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2}, \frac{z_2 + z_1}{2} \text{ হবে।}$$

ii) অনুপাতিভক্ত বিন্দু :

P বিন্দু যদি AB-কে m : n অনুপাতে অনুপাতিভক্ত করে তবে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক

$$\left( \frac{m x_2 - n x_1}{m - n}, \frac{m y_2 - n y_1}{m - n}, \frac{m z_2 - n z_1}{m - n} \right) \text{ হবে যদি } A = (x_1, y_1, z_1), B = (x_2, y_2, z_2) \text{ হয়।}$$

প্রমাণ :



চিত্র : 1.7

ধরি P = (x, y, z) দেওয়া আছে

$$\frac{AP}{BP} = \frac{m}{n}$$

$$\text{বা } \frac{AP}{BP} - 1 = \frac{m}{n} - 1$$

$$\text{বা } \frac{AP - BP}{BP} = \frac{m - n}{n}$$

$$\text{বা } \frac{AB}{BP} = \frac{m - n}{n}$$

অর্থাৎ B বিন্দু AP-কে  $(m-n) : n$  অনুপাতে অনুপাতিভক্ত করে। সুতরাং অনুপাতিভক্ত ফর্মুলা থেকে আপনারা লিখতে পারেন.

$$x_2 = \frac{(m-n)x + n x_1}{(m-n) + n} \longrightarrow (1.6)$$

$$y_2 = \frac{(m-n)y + n y_1}{(m-n) + n} \longrightarrow (1.7)$$

$$z_2 = \frac{(m-n)z + n z_1}{m - n + n} \longrightarrow (1.8)$$

অতএব (1.6), (1.7), (1.8) সমীকরণগুলি থেকে লেখা যায়

$$x = \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \quad y = \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \quad z = \frac{mz_2 - nz_1}{m-n}$$

সূতরাং P বিন্দুর স্থানাঙ্ক =  $\left( \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n} \right)$


1.4.2 কোন ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের (centroid) স্থানাঙ্ক নির্ণয় করলে ধার শীর্ষবিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$ ,  $(x_2, y_2, z_2)$  ও  $(x_3, y_3, z_3)$ ।

মনে করি A, B C ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B, C-র স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$ ,  $(x_2, y_2, z_2)$  ও  $(x_3, y_3, z_3)$ , ধরি D, E, F যথাক্রমে BC, CA ও AB-র মধ্যবিন্দু। এখানে D বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে

$$\left( \frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}, \frac{z_2 + z_3}{2} \right)$$

ভরকেন্দ্র G। সূতরাং G, AD মধ্যমার উপর এমন একটি বিন্দু যাতে

$$\frac{AG}{GD} = \frac{2}{1} \text{ হয়।}$$



চিত্র : 1.8

$$\text{অতএব } G \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক} = \left( \frac{2 \cdot \frac{x_2 + x_3}{2} + 1 \cdot x_1}{2+1}, \frac{2 \cdot \frac{y_2 + y_3}{2} + 1 \cdot y_1}{2+1}, \frac{2 \cdot \frac{z_2 + z_3}{2} + 1 \cdot z_1}{2+1} \right)$$

$$= \left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

মন্তব্য : G-র এই প্রতিসম (symmetric) প্রকাশ থেকে বলা যায় এই বিন্দুটি অন্য দুটো মধ্যমার মধ্যেও অবস্থিত।  
সূতরাং কোন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটি সমবিন্দু হবে (concurrent).

উদাহরণ মালা :

উদা : 1.  $(2, 0, -1)$  ও  $(-2, 5, 4)$  বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব কত?

সমাধান : ধরি  $P = (2, 0, -1)$  এবং  $Q = (-2, 5, 4)$ , যদি  $P = (x_1, y_1, z_1)$  ও  $Q = (x_2, y_2, z_2)$  হয় তবে

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

অতএব এখানে নির্ণেয় দূরত্ব

$$|PQ| = \sqrt{(-2 - 2)^2 + (5 - 0)^2 + (4 + 1)^2} \quad \text{একক}$$

$$= \sqrt{66} \text{ একক}$$

উদা : 2 প্রমাণ করুন  $(3, 2, 2), (2, 1, 2)$  দ্বারা  $(1, 3, 4)$  দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ হবে।

সমাধান : ধরি  $P = (3, 2, 2)$ ,  $Q = (2, 1, 2)$ ,  $R = (1, 3, 4)$

$$\text{এখানে } |PQ| = \sqrt{(2-3)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2} \quad \text{একক} = \sqrt{2} \quad \text{একক}$$

$$|QR| = \sqrt{(1-2)^2 + (3-1)^2 + (4-2)^2} \quad \text{একক} = \sqrt{9} \quad \text{একক} \\ = 3 \quad \text{একক}$$

$$|RP| = \sqrt{(3-1)^2 + (2-3)^2 + (2-4)^2} \quad \text{একক} = \sqrt{9} \quad \text{একক} \\ = 3 \quad \text{একক}$$

যেহেতু  $|QR| = |RP|$  অতএব  $PQR$  ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

উদা : 3 কোন বিন্দুর বেলনাকার ও গোলীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন যার কার্তিয় স্থানাঙ্ক  $(3, 4, 5)$ ,

সমাধান : কোন বিন্দুর কার্তিয় স্থানাঙ্ক যদি  $(x, y, z)$  হয় তবে সেই বিন্দুর বেলনাকার ও গোলীয় স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(r, \theta, z)$  ও  $(\rho, \theta, \phi)$  হবে।

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

$$z = 5$$

$$\text{সূতরাং নির্ণেয় বেলনাকার স্থানাঙ্ক} = \left( 5, \tan^{-1} \frac{4}{3}, 5 \right)$$

গোলীয় স্থানাঙ্কের ক্ষেত্রে

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{3^2 + 4^2}}{5} = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

$$\text{সূতরাং নির্ণেয় গোলীয় স্থানাঙ্ক} = \left( 5\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, \tan^{-1} \frac{4}{3} \right)$$

অনুশীলনী :

অনু. 1 : কোন ত্রিভুজের ত্রিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন যার শীর্ষ বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক  $(1, 1, 3)$ ,  $(3, 0, 1)$  এবং  $(5, 5, 5)$

অনু. 2 :  $(x_1, y_1, z_1)$ ,  $(x_2, y_2, z_2)$  ও  $(x_3, y_3, z_3)$  বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের মধ্যমাণ্ডলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

অনু. 3 : কোন বিন্দুর বেলনাকার স্থানাঙ্ক  $\left(2, \frac{\pi}{4}, 5\right)$  হলে তার কার্তিয় স্থানাঙ্ক কত হবে?

অনু. 4 : এমন একটি বিন্দুর সংগতির পথ (Locus) নির্ণয় করুন যা  $(2, 3, 0)$  ও  $(0, 4, 2)$  বিন্দুদ্বয় থেকে সমদূরবর্তী।

অনু. 5 : এমন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন যা  $(2, 0, 4)$  ও  $(-4, -2, -6)$  বিন্দুদ্বয় সংযোগকারী সরলরেখাকে  $xoy$  তল দ্বারা বিভক্ত করে।


অনু. 6 :  $A (5, 0, 6)$  এবং  $B (-3, 5, 7)$  বিন্দু দুটির সংযোজক সরলরেখা  $yoz$  তলকে যে বিন্দুতে ছেদ করে প্রমাণ করুন সেই বিন্দুতে  $AB$ -কে  $5 : 3$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করে।

## 1.5 দিক্যুক্ত রেখাংশ : (Directed line segment)

$L$  একটি সরলরেখা,  $A$  ও  $B$ ,  $L$  - সরলরেখার উপর দুটি বিন্দু। তা হলে  $A$  থেকে  $B$  পর্যন্ত দিক্যুক্ত রেখাংশকে  $AB$  দ্বারা নির্দেশিত করা হয়, অনুরাগে দিক্যুক্ত রেখাংশ  $BA$  বলতে বোঝায়  $B$  থেকে  $A$  পর্যন্ত। এর বিস্তৃত আলোচনা একক 2 - তে করা হয়েছে।

### 1.5.1 লম্ব অভিক্ষেপ : (projection) বা প্রক্ষেপ

i) সমতলের উপর কোন বিন্দুর এবং কোন নির্দিষ্ট দিক্যুক্ত সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ।




চিত্র : 1.9

ত্রিমাত্রিক দেশে  $P$  যে কোন একটি বিন্দু।  $P$  বিন্দু হতে  $xoy$  তলের উপর  $PN$  লম্ব অঙ্কন করা হল।  $N$  বিন্দুটিকে বলা হবে  $P$  বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ  $xoy$  তলের উপর। চিত্র নং 1.9 দেখুন।

ত্রিমাত্রিক দেশে  $AB$  একটি সরলরেখা।  $AB$  সরলরেখার প্রতিটি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ নেওয়া হল  $xoy$  তলের উপর। লম্ব অভিক্ষেপ বিন্দুগুলি  $xoy$  তলের উপর আর একটি সরলরেখা  $A'B'$  সৃষ্টি করবে। এই সরলরেখা  $A'B'$ -কে  $AB$ -সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ বলা হবে  $xoy$  তলের উপর। চিত্র নং 1.9 দেখুন।

ii) কোন নির্দিষ্ট দিক্যুক্ত সরলরেখার উপর কোন রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ : (Projection of a line segment on a directed line)




চিত্র : 1.10

চিত্র নং 1.10-এ  $CD$  একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা।  $AB$  রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ  $CD$  রেখার উপর বলতে বোঝায় রেখাংশ  $A'B'$  যেখানে  $CD$  সরলরেখার উপর  $A', B'$  যথাক্রমে  $A$  ও  $B$  বিন্দুদ্বয়ের লম্ব অভিক্ষেপ। এখানে  $A$  ও  $B$  বিন্দুগামী দুটি তল অঙ্কন করা হল যারা  $CD$  রেখার সঙ্গে লম্ব হয় এবং  $CD$  রেখাকে যথাক্রমে  $A'$  ও  $B'$  বিন্দুতে ছেদ করে। ধরি  $AB$  ও  $CD$  সরলরেখার অঙ্গৰিভৰ্তী কোন  $\theta$ । এখানে  $A'B'$  হবে  $CD$  সরলরেখার উপর  $AB$  রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ যেখানে  $A'B' = AB \cos \theta$ .

### 1.5.2 উপপাদ্য 1 :

ত্রিমাত্রিক দেশে A ও B যে কোন দুটি বিন্দু। বিন্দু দুটিকে AB রেখাংশ দ্বারা যুক্ত করা যেতে পারে অথবা বিভিন্ন রেখাংশ AC, CD, DE, EB দ্বারাও যুক্ত করা যেতে পারে। প্রমাণ করা যায় PQ রেখার উপর AB-র লম্ব অভিক্ষেপ, PQ-রেখার উপর AC, CD, DE, EB-র লম্ব অভিক্ষেপের যোগফলের সমান।

প্রমাণ :




চিত্র : 1.11

ধরি PQ সরলরেখার উপর  $A^1, C^1, D^1, E^1, B^1$  যথাক্রমে A, C, D, E, ও B বিন্দুগুলির লম্ব অভিক্ষেপ।  
সূতরাং PQ সরলরেখার উপর AC, CD, DE ও EB রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপগুলির যোগফল

$$\begin{aligned}
 &= A^1C^1 + C^1D^1 + D^1E^1 - E^1B^1 \quad [\text{চিত্র } 1.11 \text{ লক্ষ করুন}] \\
 &= A^1C^1 + C^1D^1 + D^1B^1 \\
 &= A^1B^1 \\
 &= AB\text{-র লম্ব অভিক্ষেপ } PQ\text{-রেখার উপর}।
 \end{aligned}$$

### 1.5.3 দিক নির্দেশক কোসাইন (Direction Cosine) বা কোসাইন দিগন্ত গোষ্ঠী



চিত্র : 1.12


ত্রিমাত্রিক দেশে  $ox, oy, oz$  লম্ব কার্তিয় অক্ষগুচ্ছ। এই দেশে AB একটি দিক্যুক্ত সরলরেখা। 1.12 নং চিত্রে AB-র উপর তীর চিহ্ন দ্বারা AB-র দিক নির্দেশ করা হয়েছে। এখন O বিন্দু গামী সরলরেখা OL অঙ্কন করা হল যা AB-র সমান্তরাল এবং সমদিক যুক্ত। ধরি OL রেখা x-অক্ষ, y-অক্ষ ও z-অক্ষের ধনাত্ত্বক দিকের সঙ্গে যথাক্রমে  $\alpha, \beta$ , ও  $\gamma$  কোণে নত আছে। এখন  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  – এই তিনটি সংখ্যাকে AB কিংবা OL রেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বলা হবে।

মন্তব্য :

- i) পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলির দিক্ক নির্দেশক কোসাইন একই হবে।
- ii)  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  কে সাধারণত  $\ell, m, n$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়,
- iii) ox-অক্ষ ; ox, oy ও oz অক্ষের সঙ্গে যথাক্রমে  $0^\circ, 90^\circ$  ও  $90^\circ$  কোণে নত থাকে। সূতরাং ox অক্ষের দিক্ক নির্দেশক কোসাইন ( $\cos 0^\circ, \cos 90^\circ, \cos 90^\circ$ ) অর্থাৎ  $(1, 0, 0)$  হবে। অনুরূপে oy এবং oz অক্ষের দিক্ক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে  $(0, 1, 0)$  ও  $(0, 0, 1)$  হবে।

#### 1.5.4. দিক্ক নির্দেশক কোসাইনগুলির মধ্যে সম্বন্ধ :

$\ell, m, n$  যদি কোন সরলরেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন হয় তবে প্রমাণ করা যায়  $\ell^2 + m^2 + n^2 = 1$



চিত্র : 1.13

প্রমাণ :

ধরি AB যে কোন সরলরেখা যার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন  $\ell, m, n$ । AB-র সমান্তরাল ও সমদিক্যুক্ত রেখা OP-র দিক্ক নির্দেশক কোসাইন  $\ell, m, n$  হবে। ধরি P বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  এবং  $OP = r$ , P বিন্দু হতে xoy তলের উপর PQ লম্ব অঙ্কন করা হল, Q বিন্দু হতে ox অক্ষের উপর QR লম্ব অঙ্কন করা হল যা ox অক্ষকে R বিন্দুতে ছেদ করে। সূতরাং  $OR = x, RQ = y, PQ = z$ .

$$\cos ROP = 1, \quad \angle PRO = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore x = OR &= x\text{-অক্ষের উপর OP-র লম্ব অভিক্ষেপ} \\ &= OP \cos ROP \\ &= r\ell. \end{aligned}$$

$$\text{বা } x^2 = r^2 \ell^2$$

$$\text{অনুরূপে দেখানো যায় } y = rm \text{ এবং } z = rn$$

$$\text{সূতরাং } y^2 = r^2 m^2 \text{ এবং } z^2 = r^2 n^2$$

$$\text{অতএব } x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \ell^2 + r^2 m^2 + r^2 n^2$$

$$\text{বা } r^2 = r^2 (\ell^2 + m^2 + n^2)$$

$$\text{বা } 1 = \ell^2 + m^2 + n^2$$

### 1.5.5 দিক্ক নির্দেশক অনুপাত : (Direction Ratios)

কোন সরলরেখা OP-র দিক্ক নির্দেশক অনুপাত রেখাটির দিক্ক নির্দেশক কোসাইন  $\ell, m, n$ -র সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ OP রেখার দিক্ক নির্দেশক অনুপাত যদি  $a, b, c$  হয় তবে  $\frac{a}{\ell} = \frac{b}{m} = \frac{c}{n}$  হবে।

$$\text{ধরি } \frac{a}{\ell} = \frac{b}{m} = \frac{c}{n} = K$$

$$\text{সূতরাং } a = \ell k, b = mk, c = nk$$

$$\text{অতএব } a^2 + b^2 + c^2 = k^2 (\ell^2 + m^2 + n^2) = k^2$$

$$\therefore \ell = \pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, m = \pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, n = \pm \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

মন্তব্য :


- এখনে OP-র দিক্ক নির্দেশক অনুপাত ধনাত্মক হবে এবং PO-র দিক্কনির্দেশক অনুপাত ঋণাত্মক হবে।
- যে কোন তিনটি সংখ্যাকে কোন সরলরেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন ধরা যায় না, কারণ আপনাদের মনে রাখতে হবে  $\ell^2 + m^2 + n^2 = 1$  শর্তটি সিদ্ধ হওয়া দরকার।

### 1.5.6 উপপাদ্য 2

P ও Q দুটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$  ও  $(x_2, y_2, z_2)$  হলে PQ রেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন হবে

$$\left( \frac{x_2 - x_1}{PQ}, \frac{y_2 - y_1}{PQ}, \frac{z_2 - z_1}{PQ} \right)$$

প্রমাণ :



চিত্র : 1.14

ধরি PQ রেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন  $(\ell, m, n)$ , P ও Q বিন্দু দুটি হতে ox-অক্ষের উপর যথাক্রমে PM ও QN লম্ব অক্ষন করা হল, সূতরাং OM =  $x_1$ , ON =  $x_2$  এখনে আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারছেন MN হল PQ সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ ox-অক্ষের উপর। তা হলে  $MN = PQ \cdot \ell$

$$\text{বা } ON - OM = PQ \cdot \ell$$

$$\text{বা } x_2 - x_1 = PQ \cdot \ell$$

$$\text{সূতরাং } \ell = \frac{x_2 - x_1}{PQ}$$

অনুরাপে oy অক্ষ ও oz অক্ষের উপর P ও Q বিন্দুস্থ হতে লম্ব অক্ষন করে দেখানো যাবে

$$m = \frac{y_2 - y_1}{PQ} \text{ এবং } n = \frac{z_2 - z_1}{PQ}$$

অতএব  $PQ$  সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন

$$\left( \frac{x_2 - x_1}{PQ}, \frac{y_2 - y_1}{PQ}, \frac{z_2 - z_1}{PQ} \right)$$

$$\text{মন্তব্য : } \text{যেহেতু } \frac{x_2 - x_1}{\ell} = \frac{y_2 - y_1}{m} = \frac{z_2 - z_1}{n} = PQ$$

সুতরাং  $x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1$  সংখ্যা তিনটি  $PQ$  রেখার দিক নির্দেশক অনুপাত হবে।

### 1.5.7 উপপাদ্য 3

$A(x_1, y_1, z_1)$  ও  $B(x_2, y_2, z_2)$  বিন্দু দুটির সংযোজক রেখাখণ্ড  $AB$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $L$  সরলরেখার উপর

$$(x_2 - x_1) \ell + (y_2 - y_1)m + (z_2 - z_1)n$$

হবে যেখানে  $(\ell, m, n) - L$  সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন।

প্রমাণ :

একটি আয়ত ষড়তলক (parallelopiped) অঙ্কন করা হল যার  
একটি কর্ণ  $AB$ ; এখানে  $AP, PQ, QB$  রেখাগুলি যথাক্রমে  $x$ -  
অক্ষ,  $y$ -অক্ষ ও  $z$ -অক্ষের সমান্তরাল ও সমদিক্ষ যুক্ত। অতএব

$$AP = x_2 - x_1, \quad PQ = y_2 - y_1, \quad QB = z_2 - z_1$$

$AB$ -এর লম্ব অভিক্ষেপ  $L$ -সরলরেখার উপর

$$= AP\text{-র লম্ব অভিক্ষেপ } L\text{-র উপর}$$

[উপপাদ্য 1

$$+ PQ\text{-র লম্ব অভিক্ষেপ } L\text{-র উপর}$$

(1.5.2)-র


সাহায্যে]

$$+ QB\text{-র লম্ব অভিক্ষেপ } L\text{-র উপর}$$

[ যেহেতু  $AP$  রেখা  $x$ -অক্ষের সমান্তরাল এবং  $L$  ও  $x$   
অক্ষের অস্তর্গত কোণের কোসাইন  $\ell$ , অনুরূপে  $PQ$  ও  
 $QB$  রেখার বেলায় তাদের লম্ব অভিক্ষেপ একই ভাবে  
পাওয়া যাবে]

$$= AP \cdot \ell + PQ \cdot m + QB \cdot n$$

$$= (x_2 - x_1) \ell + (y_2 - y_1)m + (z_2 - z_1)n$$




চিত্র : 1.15

### 1.5.8. উপপাদ্য 4 :

$L_1$  ও  $L_2$  সরলরেখা দুটির দিক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে  $(\ell_1, m_1, n_1)$  ও  $(\ell_2, m_2, n_2)$  এবং রেখা দুটির  
অস্তর্গত কোণ  $\theta$  হলে প্রমাণ করা যায়  $\cos \theta = \ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$

প্রমাণ :



চিত্র : 1.16

ধরি  $OP$  ও  $OQ$  রেখা দুটি মূলবিন্দুগামী যারা যথাক্রমে  $L_1$  ও  $L_2$  সরলরেখার সঙ্গে সমান্তরাল, সূতরাং  $OP$  ও  $OQ$ -র অঙ্গর্গত কোণ  $\theta$  হবে। ধরি  $P = (x_1, y_1, z_1)$  এবং  $Q = (x_2, y_2, z_2)$   $Q$  বিন্দু হতে  $xoy$  তলের উপর  $QM$  লম্ব অক্ষন করা হল এবং  $M$  বিন্দু হতে  $ox$ -অক্ষের উপর  $MN$  লম্ব অক্ষন করা হল যা  $ox$ -অক্ষকে  $N$  বিন্দুতে ছেদ করে।

$$\text{সূতরাং } ON = x_2 = OQ \cdot \ell_2$$

$$NM = y_2 = OQ \cdot m_2$$

$$MQ = z_2 = OQ \cdot n_2$$

$OP$  রেখার উপর  $OQ$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $OP$ -রেখার উপর  $ON$ ,  $NM$  ও  $MQ$ -র লম্ব অভিক্ষেপের যোগফলের সমান।

অতএব

$$\begin{aligned} OQ \cdot \cos \theta &= x_2 \ell_1 + y_2 m_1 + z_2 n_1 \\ &= (OQ \cdot \ell_2) \ell_1 + (OQ \cdot m_2) m_1 + (OQ \cdot n_2) n_1 \\ \Rightarrow \cos \theta &= \ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 \end{aligned}$$

মন্তব্য :

- যদি  $L_1$  ও  $L_2$  সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হয় তবে,  
 $\ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$  হবে যেহেতু  $\cos 90^\circ = 0$

- যদি  $L, M, N$  ও  $L^1, M^1, N^1$  যথাক্রমে  $L_1$  ও  $L_2$  রেখাদ্বয়ের দিক্ক নির্দেশক অনুপাত হয় তবে

$$\cos \theta = \frac{LL^1 + MM^1 + NN^1}{\sqrt{L^2 + M^2 + N^2} \sqrt{L^{12} + M^{12} + N^{12}}}$$

**1.5.9** ত্রিমাত্রিক দেশে কোন ত্রিভুজ  $\Delta$ -র লম্ব অভিক্ষেপ তিনটি অক্ষ তলের উপর যথাক্রমে  $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$  হলে প্রমাণ করা যায়

$$\Delta^2 = \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2$$

প্রমাণ :

$\Delta$  ত্রিভুজটি যে সমতলের উপর অবস্থিত ধরি সেই সমতলের উপর লম্ব সরলরেখার দিক্ক নির্দেশক কোসাইন  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma, \Delta$  ত্রিভুজটির লম্ব অভিক্ষেপ  $yoz$  তলের উপর  $\Delta \cos \alpha$ ।

$$\text{সুতরাং } \Delta_1 = \Delta \cos \alpha$$

$$\text{অনুরূপে } \Delta_2 = \Delta \cos \beta$$

$$\text{এবং } \Delta_3 = \Delta \cos \gamma$$

$$\text{অতএব } \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2 = \Delta^2 \cos^2 \alpha + \Delta^2 \cos^2 \beta + \Delta^2 \cos^2 \gamma$$

$$= \Delta^2 (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma)$$

$$= \Delta^2 \quad [\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1]$$

### 1.5.10 ত্রিমাত্রিক দেশে কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় :

মনে করি ABC একটি ত্রিভুজ যেখানে  $A = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $B = (x_2, y_2, z_2)$ ,  $C = (x_3, y_3, z_3)$  এবং এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $\Delta$ . এখানে A, B, C বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ  $yoz$  তলের উপর যথাক্রমে  $(0, y_1, z_1)$ ,  $(0, y_2, z_2)$  ও  $(0, y_3, z_3)$  হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দ্বিমাত্রিক তলে কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $\frac{1}{2} \left\{ y_1(y_2 - y_3) + y_2(y_3 - y_1) + y_3(y_1 - y_2) \right\}$  হয় যেখানে শীষবিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ ,  $(x_3, y_3)$ । যদি  $(0, y_1, z_1)$ ,  $(0, y_2, z_2)$  ও  $(0, y_3, z_3)$  দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল  $\Delta_1$  ধরা হয় তবে

$$\Delta_1 = \frac{1}{2} \left\{ y_1(z_2 - z_3) + y_2(z_3 - z_1) + y_3(z_1 - z_2) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}$$

অনুরূপে A, B, C বিন্দুগুলির  $zox$  ও  $xoy$  তলের লম্ব অভিক্ষেপ অঙ্কন করে দেখানো যায়

$$\Delta_2 = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

আপনারা আগে প্রমাণ করেছেন

$$\Delta^2 = \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2$$

$$\text{অতএব } \Delta^2 = \frac{1}{4} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \frac{1}{4} \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix}^2 + \frac{1}{4} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}^2$$

উদাহরণ-মালা :

উদা : 4(a) এমন একটি সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বার করুন যা x-অক্ষ, y-অক্ষ, ও z-অক্ষের সঙ্গে সমান কোণে নত থাকে।

সমাধান : ধরি রেখাটি x-অক্ষ, y-অক্ষ ও z-অক্ষের সঙ্গে  $\alpha$  কোণে নত থাকে। সূতরাং রেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন  $\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha$  হবে।

$$\text{অতএব } \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\text{বা } \cos^2 \alpha = \frac{1}{3}$$

$$\text{বা } \cos^2 \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{সূতরাং রেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন} \left( \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

উদা : 4(b)  $\left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} \right)$  কি কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন হতে পারে?

সমাধান :

$$\text{এখানে } l = \frac{1}{\sqrt{2}}, m = \frac{1}{\sqrt{2}}, n = \frac{1}{2}$$

$$l^2 + m^2 + n^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \neq 1$$

সূতরাং  $\left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} \right)$  কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন হতে পারে না।

উদা : 5  $L_1$  ও  $L_2$  সরলরেখা দুটির দিক নির্দেশক অনুপাত যথাক্রমে  $(a, b, c)$  ও  $(a^1, b^1, c^1)$  হলে এমন একটি সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত নির্ণয় করুন যা  $L_1$  ও  $L_2$  উভয় রেখার সঙ্গে লম্ব হবে।

সমাধান : ধরি নির্ণেয় সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত  $(l, m, n)$

$$\text{অতএব শর্তানুসারে } a l + b m + c n = 0$$

$$\text{এবং } a^1 l + b^1 m + c^1 n = 0$$

উপরের সমীকরণ দুটি থেকে বজ্জগণন করে আপনারা লিখতে পারেন

$$\frac{l}{bc^1 - b^1 c} = \frac{m}{ca^1 - ac^1} = \frac{n}{ab^1 - a^1 b}$$

অতএব নির্ণেয় দিক নির্দেশক অনুপাত  
 $(bc^1 - b^1 c, ca^1 - ac^1, ab^1 - a^1 b)$

উদা : 6 দুটি সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত যথাক্রমে  $(1, 1, 2)$  ও  $(\sqrt{3}, -\sqrt{6}, 4)$  হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণের মান কত ?

সমাধান : প্রথম সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন।

$$\frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}}, \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}}, \frac{2}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \text{ বা } \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}$$

অনুরূপে দ্বিতীয় সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন। A

$$\frac{\sqrt{3}}{5}, \frac{\sqrt{6}}{5}, \frac{4}{5}$$

ধরি সরলরেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণের মান  $\theta$

$$\begin{aligned} \text{অতএব } \cos \theta &= \left( \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \left( \frac{\sqrt{3}}{5} \right) + \left( \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \left( -\frac{\sqrt{6}}{5} \right) + \left( \frac{2}{\sqrt{6}} \right) \left( \frac{4}{5} \right) \\ &= \frac{1}{5\sqrt{6}} \left( \sqrt{3} - \sqrt{6} + 8 \right) \end{aligned}$$

অনুশীলনী :

অনু : 7 তিনটি সমতলীয় সরলরেখা যাদের দিক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে  $(l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2), (l_3, m_3, n_3)$  একটি বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ করুন

$$\begin{vmatrix} l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l_3 & m_3 & n_3 \end{vmatrix} = 0$$

অনু : 8  $(0, 2, -3)$  ও  $(3, -1, 2)$  স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বার করুন।

অনু : 9  $y = mx + c$  সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন নির্ণয় করুন।

অনু : 10 তিনটি সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত যথাক্রমে  $(1, -2, 3), (1, -2, 1), (4, 1, -2)$  হলে প্রমাণ করুন সরলরেখা তিনটি পরস্পর লম্ব হবে।

অনু : 11  $(2, -1, 4)$  এ  $(0, 1, 5)$  স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখার উপর  $(3, 3, 5)$  ও  $(5, 4, 3)$  স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরললেখার লম্ব অভিক্ষেপ বার করুন।

অনু : 12 প্রমাণ করুন তিনটি সরলরেখা যাদের দিক নির্দেশক অনুপাত যথাক্রমে  $(2, 0, 5), (2, 2, 3)$  ও  $(4, 3, 7)$  সমতলীয়।

## 1.6 সারাংশ :

এই এককে আগনীরা যা জানতে পারলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

- (i) ত্রিমাত্রিক কার্তিয়, বেলনাকার ও গোলীয় স্থানাঙ্ক :

ত্রিমাত্রিক দেশে যে কোন বিন্দু P-র কার্তিয় স্থানাঙ্ক তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষ x'ox, y'oy, z'oz-র সাপেক্ষে (x, y, z) দ্বারা সূচিত হয়। P বিন্দুর বেলনাকার ও গোলীয় স্থানাঙ্ক যথাক্রমে {x = r Cos θ, y = Sin θ, z = z} ও {x = r Sin θ Cos φ, y = r Sin θ Sin φ, z = r Cos θ} দ্বারা নির্দেশিত হয়।

- (ii) ত্রিমাত্রিক দেশে (x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, z<sub>1</sub>) ও (x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, z<sub>2</sub>) স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট দুই বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব =

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

- (iii) A ও B বিন্দুর কার্তিয় স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, z<sub>1</sub>) ও (x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, z<sub>2</sub>) হলে যে কোন বিন্দু P যা AB কে m : n অনুপাতে অঙ্গীভূত (বা বহির্ভূত) করে তার স্থানাঙ্ক

$$\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n} \right) \quad \text{বা} \quad \left( \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n} \right)$$

হবে।

- (iv) (x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, z<sub>1</sub>), (x<sub>2</sub>, y<sub>2</sub>, z<sub>2</sub>), (x<sub>3</sub>, y<sub>3</sub>, z<sub>3</sub>) শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক

$$\left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right)$$

- (v) লম্ব অভিক্ষেপ : AB ও CD সরলরেখার অঙ্গীভূতী কোণ θ হলে, AB রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ CD সরলরেখার উপর A'B' দ্বারা সূচিত হবে যেখানে A'B' = AB Cos θ [চিত্র নং 1.10]

- (vi) কোন সরলরেখা যদি ox, oy ও oz অক্ষের সঙ্গে যথাক্রমে α, β, γ কোণে নত থাকে তবে সেই রেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বলতে বুঝি  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  এবং  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  হবে।

- (vii) কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন  $\ell, m, n$  হলে সেই রেখার দিক নির্দেশক অনুপাত  $\ell, m, n$ -র সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ যদি দিক নির্দেশক অনুপাত a, b, c হয় তবে  $\frac{a}{l} = \frac{b}{m} = \frac{c}{n}$  তবে। এখানে

$$\ell = \pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, m = \pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, n = \pm \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

- (viii) L<sub>1</sub> এবং L<sub>2</sub> সরলরেখা দুটির দিক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে ( $\ell_1, m_1, n_1$ ) ও ( $\ell_2, m_2, n_2$ ) এবং রেখাদুটির অঙ্গীভূত কোণ θ হলে  $\cos \theta = \ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$ .

- (ix)  $A(x_1, y_1, z_1)$  ও  $B(x_2, y_2, z_2)$  বিন্দুটির সংযোজক রেখাংশ  $AB$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $(\ell, m, n)$  দিক নির্দেশক কোসাইন বিশিষ্ট  $L$  সরলরেখার উপর  $(x_2 - x_1)\ell + (y_2 - y_1)m + (z_2 - z_1)n$  হবে।

## 1.7 বিবিধ প্রশ্নমালা

প্রশ্ন : 1. কোন বিন্দুর গোলীয় স্থানাঙ্ক  $\left(2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$  হলে তার কার্তিয় স্থানাঙ্ক কত হবে?

প্রশ্ন : 2. প্রমাণ করুন তিনটি বিন্দু যাদের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(4, 5, 0), (2, 6, 2)$  ও  $(2, 3, -1)$  একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

প্রশ্ন : 3. প্রমাণ করুন তিনটি বিন্দু  $P, Q, R$  যাদের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(2, 5, -4), (1, 4, -3)$  ও  $(4, 7, -6)$  সমরেখ (Collinear).

প্রশ্ন : 4.  $A(0, 0, 0), B(3, -4, 4)$  ও  $C(7, 2, 4)$  বিন্দুগামী তলে  $D(x, y, z)$  এমন একটি বিন্দু যে  $ABCD$  একটি সামান্তরিক গঠন করে।  $D$  বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন।

প্রশ্ন : 5. কোন বিন্দু  $P$ -র স্থানাঙ্ক  $(2, 1, 2)$  হলে মূলবিন্দু ও  $P$ -র সংযোজক সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন বার করুন।

প্রশ্ন : 6. কোন সরলরেখা  $ox$  ও  $oy$  অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে যথাক্রমে  $30^\circ$  ও  $60^\circ$  কোণে নত হলে ঐ সরলরেখাটি  $oz$  অক্ষের সঙ্গে কত কোণে নত থাকবে?

প্রশ্ন : 7. মূলবিন্দুগামী কোন সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত  $(1, 2, 3)$  হলে ঐ রেখার উপর অবস্থিত এমন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন যার দূরত্ব মূল বিন্দু থেকে 5 একক।

প্রশ্ন : 8. যদি কোন রেখার দিক নির্দেশক কোসাইন  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  হয় তবে প্রমাণ করুন  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

প্রশ্ন : 9. প্রমাণ করুন  $A(2, 3, 1), B(-2, 2, 0)$  ও  $C(0, 1, -1)$  বিন্দুগুলি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভুজ। অন্য কোণ দুটির মান কত হবে?

প্রশ্ন : 10. কোন ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি  $A(2, -5, 3), B(1, -7, 4) C(2, -3, 5)$  হলে তার ক্ষেত্রফল কত হবে?

প্রশ্ন : 11.  $A(0, 1, 7), B(1, 0, 5), C(-1, 2, 4)$  এবং  $D(2, 5, -2)$  চারটি বিন্দু, নিম্নলিখিত লম্ব অভিক্ষেপগুলি নির্ণয় করুন।

i)  $AB$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $CD$ -র উপর

ii)  $CA$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $CD$ -র উপর


iii)  $AC$ -র লম্ব অভিক্ষেপ  $BD$ -র উপর

প্রশ্ন : 12. চিত্রে OAFBDEGC একটি আয়ত বড়তলক।  $OA = a, OB = b, OC = c$  হলে

i) OE, AD, CF কর্ণগুলির দিক নির্দেশক কোসাইন বার করুন

ii) OE ও AD-র অন্তর্বর্তী কোণের মান কত?

প্রশ্ন : 13.  $L_1$  ও  $L_2$  রেখা দুটির দিক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে  $(l_1, m_1, n_1)$  ও  $(l_2, m_2, n_2)$  এবং রেখা দুটির অঙ্গুষ্ঠি কোণ  $\theta$  হলে প্রমাণ করুন



$$\sin \theta = \left\{ \left| \begin{matrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{matrix} \right|^2 + \left| \begin{matrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{matrix} \right|^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \quad \text{চিত্র : 1.17}$$

প্রশ্ন : 14.  $(1, 2, -1)$  এবং  $(2, -3, 6)$  দিক নির্দেশক অনুপাতবিশিষ্ট সরলরেখা দুটির উপর লম্ব সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন নির্ণয় করুন।

## 1.8 সমাধান/উত্তরমালা

অনুশীলনীর সমাধান

অনু : 1. ত্রিভুজের ভর কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক

$$\begin{aligned} & \left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right) \\ &= \left( \frac{1+3+5}{3}, \frac{1+0+5}{3}, \frac{3+1+5}{3} \right) \\ &= (3, 2, 3) \end{aligned}$$

অনু : 2. ধরি ABC ত্রিভুজের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$ ,  $(x_2, y_2, z_2)$  ও  $(x_3, y_3, z_3)$ । BC বাহুর মধ্য বিন্দু D হলে তার স্থানাঙ্ক  $\left( \frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{y_2 + y_3}{2}, \frac{z_2 + z_3}{2} \right)$   $\therefore$  AD মধ্যমার দূরত্ব হবে

$$\sqrt{\left( \frac{x_2 + x_3}{2} - x_1 \right)^2 + \left( \frac{y_2 + y_3}{2} - y_1 \right)^2 + \left( \frac{z_2 + z_3}{2} - z_1 \right)^2}$$

অনুরাপে অন্য মধ্যমা দুটির দূরত্ব আপনারা নিজেরাই নির্ণয় করতে পারবেন।

অনু : 3. ধরি P বিন্দুর বেলনাকার স্থানাঙ্ক  $(r, \theta, z)$  এবং কার্তিয় স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  সূতরাং  $r = 2$ ,  $\theta = \frac{\pi}{4}$ ,  $z = 5$ .

$$x = r \cos \theta = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$y = r \sin \theta = 2 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$z = z = 5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কার্তিয় স্থানাঙ্ক} = \left( \frac{2}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}, 5 \right)$$

অনু : 4. ধরি  $A = (2, 3, 0)$  এবং  $B = (0, 4, 2)$ , P এমন একটি বিন্দু যা A ও B বিন্দু দুটি হতে সমদূরবর্তী।  
ধরি  $P = (\alpha, \beta, \gamma)$

$$\therefore AP = BP, \text{ যা } (\alpha - 2)^2 + (\beta - 3)^2 + (\gamma - 0)^2 = (\alpha - 0)^2 + (\beta - 4)^2 + (\gamma - 2)^2 \\ \text{ যা } 4\alpha - 2\beta - 4\gamma + 7 = 0$$

$$\text{অতএব } P \text{ বিন্দুর সঞ্চার পথ } 4x - 2y - 4z + 7 = 0$$

অনু : 5 ধরি প্রয়োজনীয় বিন্দুটি  $(x, y, z)$  যা প্রদত্ত বিন্দু দ্বারা সংযোজক রেখাকে xoy তল দ্বারা  $m : n$  অনুপাতে  
ছেদ করে।

$$\text{সূতরাং } z = \frac{-6m + 4n}{m + n} = 0 \quad [\text{এখানে } z\text{-এর মান শূন্য হবে কারণ xoy তলে অবস্থিত কোন} \\ \text{বিন্দুর } z\text{-র স্থানাঙ্ক শূন্য}]$$

$$\text{যা } \frac{m}{n} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore x = \frac{2 \cdot (-4) + 3 \cdot 2}{2 + 3} = -\frac{2}{5}$$

$$y = \frac{2(-2) + 3 \cdot 0}{2 + 5} = -\frac{4}{5}$$

$$\therefore \text{বিন্দুটির স্থানাঙ্ক} = \left( -\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, 0 \right)$$

অনু : 6. এখানে yoz তলে অবস্থিত কোন বিন্দুর x-স্থানাঙ্ক শূন্য হবে। এবার অনু : 5 এর মত করে করুন

অনু : 7. ধরি তিনটি রেখা যে তলে অবস্থিত তার উপর লম্ব সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন  $(\ell, m, n)$

যেহেতু লম্ব সরলরেখাটি তিনটি প্রদত্ত রেখার উপর লম্ব

$$\text{সূতরাং } \ell_1 \ell + m_1 m + n_1 n = 0$$

$$\ell_2 \ell + m_2 m + n_2 n = 0$$

$$\ell_3 \ell + m_3 m + n_3 n = 0$$

এই সমীকরণ তিনটি থেকে  $\ell$ ,  $m$ ,  $n$  অপনয়ন করে পাওয়া যায়

$$\begin{vmatrix} \ell_1 & m_1 & n_1 \\ \ell_2 & m_2 & n_2 \\ \ell_3 & m_3 & n_3 \end{vmatrix} = 0$$

অনু : 8.  $(0, 2, -3)$  ও  $(3, -1, 2)$  সংযোজক রেখার দিক নির্দেশক

অনুপাত  $(3-0, -1-2, 2+3)$  বা  $(3, -3, 5)$

সুতরাং এই রেখার দিক নির্দেশক কোসাইন

$$\frac{3}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2}}, \frac{-3}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2}}, \frac{5}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 5^2}} \text{ বা } \frac{3}{\sqrt{43}}, \frac{-3}{\sqrt{43}}, \frac{5}{\sqrt{43}}$$

অনু : 9. প্রদত্ত সরলরেখাটি  $xoy$  তলে অবস্থিত। সুতরাং এই সরলরেখাটি  $z$ -অক্ষের সঙ্গে  $\frac{\pi}{2}$  কোণে নত আছে। এখানে  $m = \tan \theta$ । অতএব  $x$ -অক্ষের সঙ্গে সরলরেখাটি  $\theta$  কোণে এবং  $z$ -অক্ষের সঙ্গে  $\frac{\pi}{2} - \theta$  কোণে নত আছে। অতএব সরলরেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন  $\left(\cos \theta, \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \cos \frac{\pi}{2}\right)$  বা  $(\cos \theta, \sin \theta, 0)$

অনু : 10. নিজেরা প্রমাণ করুন।

অনু : 11.  $(2, -1, 4)$  ও  $(0, 1, 5)$  স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার দিক নির্দেশক অনুপাত  $(-2, 2, 1)$ .

সুতরাং এই সরলরেখার দিক নির্দেশক কোসাইন  $\left(\frac{-2}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}}, \frac{2}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}}, \frac{1}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}}\right)$  বা  $\left(\frac{-2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$  অতএব উপপাদ্য 3 ( $1, 5, 7$ ) এর সাহায্যে  $(3, 3, 5)$  ও  $(5, 4, 3)$  বিন্দুবয় সংযোজক সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ  $(2, -1, 4)$  ও  $(0, 1, 5)$  বিন্দুবয় সংযোজক রেখার উপর

$$= (5-3) \left(-\frac{2}{3}\right) + (4-3) \left(\frac{2}{3}\right) + (3-5) \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= -\frac{4}{3}$$

অনু : 12. প্রদত্ত সরলরেখা তিনটির দিক নির্দেশক কোসাইন যথাক্রমে  $\left(\frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{0}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}}\right)$ ,  $\left(\frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{3}{\sqrt{17}}\right)$ ,  $\left(\frac{4}{\sqrt{74}}, \frac{3}{\sqrt{74}}, \frac{7}{\sqrt{74}}\right)$ । ধরি সরলরেখা তিনটি সমতলীয়। এখন এই সমতলের উপর লম্বরেখা প্রতিটি সরলরেখার উপর লম্ব হবে। অতএব লম্ব সরলরেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন  $(\ell, m, n)$  হলে আপনারা লিখতে পারেন

$$\ell \frac{2}{\sqrt{29}} + m \frac{0}{\sqrt{29}} + n \frac{5}{\sqrt{29}} = 0$$

$$\ell \frac{2}{\sqrt{17}} + m \frac{2}{\sqrt{17}} + n \frac{3}{\sqrt{17}} = 0$$

$$\ell \frac{4}{\sqrt{74}} + m \frac{3}{\sqrt{74}} + n \frac{7}{\sqrt{74}} = 0$$

উপরের সমীকরণগুলি থেকে  $\ell, m, n$  অপনয়ন করে পাওয়া যায়

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

অতএব যদি এই নির্ণয়কটি (determinant) সিদ্ধ হয় তবেই বলা যাবে সরলরেখা তিনটি সমতলীয়।

$$\begin{aligned} \text{ধার দিকের মান} &= 2(14 - 9) - 0(14 - 12) + 5(6 - 8) \\ &= 10 - 10 \\ &= 0. \end{aligned}$$

$\therefore$  সরলরেখা তিনটি সমতলীয়।

বিবিধ প্রশ্নমালার সমাধান :

প্রশ্ন 1. কোন বিন্দুর কার্তিয় স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  ও গোলীয় স্থানাঙ্ক  $(\rho, \theta, \phi)$  হলে আপনারা লিখতে পারেন

$$x = \rho \sin \theta \cos \phi = 2 \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$$

$$y = \rho \sin \theta \sin \phi = 2 \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$$

$$z = \rho \cos \theta = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় স্থানাঙ্ক} = (1, 1, \sqrt{2})$$

প্রশ্ন : 2 ধরি  $A = (4, 5, 0)$ ,  $B = (2, 6, 2)$ ,  $C = (2, 3, -1)$ । এখানে  $AB = 3$ ,  $BC = 3\sqrt{2}$ ,  $CA = 3$

প্রশ্ন : 3 ধরি  $P = (2, 5, -4)$ ,  $Q = (1, 4, -3)$ ,  $R = (4, 7, -6)$

$$PQ = \sqrt{3}, QR = 3\sqrt{3}, RP = 2\sqrt{3}, \text{ অতএব } PQ + RP = RQ$$

প্রশ্ন : 4 ধরি  $D = (x, y, z)$  এবং  $AC$ -র মধ্যবিন্দু  $O = \left( \frac{7}{2}, \frac{2}{2}, \frac{4}{2} \right)$

আবার  $O$  বিন্দুটি  $BD$ -র মধ্য বিন্দু হবে যেহেতু সামান্তরিকের কর্ণ দুটি পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত হয়।

$$\text{অতএব } \frac{7}{2} = \frac{3+x}{2} \Rightarrow x = 4$$

$$\frac{2}{2} = \frac{-4+y}{2} \Rightarrow y = 6$$

$$\frac{4}{2} = \frac{z+4}{2} \Rightarrow z = 0$$

$$\therefore D = (4, 6, 0)$$

প্রশ্ন : 5. উত্তর  $\left( \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$

প্রশ্ন : 6. ধরি রেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন  $\ell, m, n$

$$\therefore \ell = \cos 30^\circ, m = \cos 60^\circ$$

$$\text{অতএব } \ell^2 + m^2 + n^2 = 1$$

$$\text{বা } \frac{3}{4} + \frac{1}{4} + n^2 = 1$$

$$\text{বা } n^2 = 0$$

$$\text{বা } n = \cos 90^\circ$$

উত্তর :  $90^\circ$

প্রশ্ন : 7. ধরি রেখাটির দিক নির্দেশক কোসাইন  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

মনে করি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক  $= (x, y, z)$

অতএব আপনারা লিখতে পারেন

$$x = r \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{14}} \quad \left[ \because \frac{x-0}{\cos \alpha} = \frac{y-0}{\cos \beta} = \frac{z-0}{\cos \gamma} = r \right]$$

$$y = r \cos \beta = \frac{10}{\sqrt{14}}$$

$$z = r \cos \gamma = \frac{15}{\sqrt{14}}$$

প্রশ্ন : 8. নিজেরা করুন

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 - \text{এর সাহায্য নিয়ে।}$$

প্রশ্ন : 9. BA, BC ও CA সরলরেখাগুলির দিক্ক নির্দেশক কোসাইন বার করুন। এরপর BA ও BC রেখা দুটির এবং CA ও BA রেখা দুটির অঙ্গৰ্ত কোণগুলির মান নির্ণয় করুন। দেখা যাবে BC ও CA-র অঙ্গৰ্ত কোণ  $90^\circ$ ।

$$\text{অন্য দুটি কোণের মান যথাক্রমে } \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ ও } \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{6}} \text{ হবে।}$$

প্রশ্ন : 10. ধরি  $(0, -5, 3)$ ,  $(0, -7, 4)$  ও  $(0, -3, 5)$  বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল A।

$$\therefore A_1 = \frac{1}{2} \left\{ -5(4-5) - 7(5-3) - 3(3-4) \right\} \text{ বর্গ একক}$$

$= 3$  বর্গ একক

$$\text{অনুরূপে } A_2 = 1 \text{ বর্গ একক}, A_3 = 1 \text{ বর্গ একক}$$

$$\text{যেহেতু } A^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2$$

[এখানে  $A_1$  এর মান  $(-3)$  হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই  
মনে অছে বিন্দু তিনটিকে যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত  
দিকে নেওয়া যায় তবে এর মান ধনাত্মক হবে। এখানে  
ধনাত্মক মান নেওয়া হয়েছে]

$$\text{সূতরাং নির্ণেয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল } \sqrt{9+1+1} = \sqrt{11} \text{ বর্গ একক}$$

প্রশ্ন : 11. AB-র লম্ব অভিক্ষেপ CD সরলরেখার উপর  $= ABC \cos \theta$ , AB ও CD-র অঙ্গৰ্ত কোণ  $\theta$ , AB ও CD-র অঙ্গৰ্ত কোণ  $\theta$ ।

$\therefore$  AB-র লম্ব অভিক্ষেপ CD সরলরেখার উপর

$$= AB \left\{ \frac{1-0}{AB}, \frac{2+1}{CD} + \frac{0-1}{AB} \cdot \frac{5-2}{CD} + \frac{5-7}{AB} \cdot \frac{-2-4}{CD} \right\}$$

$$= \frac{3-3+12}{CD} = \frac{12}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 6^2}} = \frac{12}{\sqrt{54}}$$

অনুরূপে ii) ও iii) নিজেরা করুন।

প্রশ্ন : 12. O বিন্দুকে মূলবিন্দু এবং OA, OB, OC বরাবর যথাক্রমে x-অক্ষ, y-অক্ষ ও z-অক্ষ ধরে পাই  
 $O = (0, 0, 0)$ ,  $A = (a, 0, 0)$ ,  $B = (0, b, 0)$ ,  $C = (0, 0, c)$ ,  $D = (0, b, c)$ ,  $E = (a, b, c)$ ,  $F = (a, b, 0)$ ,  $G = (a, 0, c)$ .

অতএব OE কর্ণের দিক নির্দেশক কোসাইন

$$= \frac{a - 0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{b - 0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{c - 0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\text{AD-কর্ণের দিক নির্দেশক কোসাইন} = \frac{0 - a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{b - 0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{c - 0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\text{সুতরাং } OE \text{ ও } OD\text{-র অন্তর্বর্তী কোণ} = \cos^{-1} \left( \frac{-a^2 + b^2 + c^2}{a^2 + b^2 + c^2} \right)$$

অনুরূপে অপর কর্ণগুলির দিক নির্দেশক নিজেরা করুন।

প্রশ্ন : 13. আপনারা জানেন

$$\cos \theta = \ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$$

$$\text{অতএব } \sin^2 \theta = (1 - \cos^2 \theta)$$

$$= 1 - (\ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)^2$$

$$= (\ell_1^2 + m_1^2 + n_1^2)(\ell_2^2 + m_2^2 + n_2^2) - (\ell_1 \ell_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2)^2$$

$$\text{যেহেতু } \ell_1^2 + m_1^2 + n_1^2 = 1 \text{ and } \ell_2^2 + m_2^2 + n_2^2 = 1$$

$$= \ell_1^2 m_2^2 + \ell_1^2 n_2^2 + m_1^2 \ell_2^2 + m_1^2 n_2^2 + n_1^2 m_2^2$$

$$- 2 \ell_1 \ell_2 m_1 m_2 - 2 \ell_1 \ell_2 n_1 n_2 - 2 m_1 m_2 n_1 n_2$$

$$= (\ell_1 m_2 - \ell_2 m_1)^2 + (m_1 m_2 - m_2 m_1)^2 + (n_1 \ell_2 - n_2 \ell_1)^2$$

$$= \left| \begin{vmatrix} \ell_1 & m_1 \\ \ell_2 & m_2 \end{vmatrix} \right|^2 + \left| \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix} \right|^2 + \left| \begin{vmatrix} n_1 & \ell_1 \\ n_2 & \ell_2 \end{vmatrix} \right|^2$$

প্রশ্ন : 14. ধরা যাক নির্গেয় দিক নির্দেশক কোসাইন  $(\ell, m, n)$  শর্তানুসারে  $(\ell, m, n)$  দিক বিশিষ্ট সরলরেখাটি  $(1, 2, -1)$  ও  $(2, -3, 6)$  দিক নির্দেশক অনুপাত বিশিষ্ট সরল রেখা দুটির উপর লম্ব। অতএব

$$\ell \cdot 1 + m \cdot 2 + n (-1) = 0$$

$$\ell \cdot 2 + m \cdot (-3) + n \cdot 6 = 0$$

উপরের সমীকরণ দুটির মধ্যে ব্রজগুণ দ্বারা পাই

$$\frac{\ell}{9} = \frac{m}{-8} = \frac{n}{-7} = \frac{\sqrt{\ell^2 + m^2 + n^2}}{\sqrt{194}} = \frac{1}{\sqrt{194}}$$

$$\therefore \ell = \frac{9}{\sqrt{194}}, \quad m = \frac{-8}{\sqrt{194}}, \quad n = \frac{-7}{\sqrt{194}}$$

## একক 2 □ ভেক্টর

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 উদ্দেশ্য

2.3 ভেক্টরের সংজ্ঞা - সদিক্ রেখাংশ

ভেক্টর সংক্রান্ত কতিপয় সংজ্ঞাদি

2.4 ভেক্টরের বীজগণিত

2.5 সারাংশ


2.6 বিবিধ প্রশ্নমালা

2.7 সমাধান / উত্তরমালা

### 2.1 প্রস্তাবনা :

আপনাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে সকল ভৌত রাশিগুলিকে সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ক্ষেলার রাশি অপরটি ভেক্টর রাশি। যে সকল রাশি শুধু একটি মান বিশিষ্ট, অর্থাৎ কোনো সাংখ্য মানের দ্বারা তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, এমন রাশিগুলিকে ক্ষেলার রাশি বলা হয়। যেমন দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি ক্ষেলার রাশি। কোন বস্তুর ভর 100 গ্রাম বলতে বুঝি একটি বিশেষ এককের সাহায্যে বস্তুর ভরের পরিমাণ একটি বাস্তব সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। সুতরাং যে কোনো ক্ষেলার রাশিকে কোনো উপযুক্ত এককের সাহায্যে বাস্তব সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আপনারা জানেন জলের ফ্লুটনাঙ্ক বায়ুর সাধারণ চাপে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এখানে তাপমাত্রা ক্ষেলার রাশি। কেননা এর শুধু মান প্রকাশ করলেই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় রাশিটির কিন্তু শুধু মান বললেই তার সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দিক্ নির্দেশ অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। যেমন আমরা যদি বলি দূরত্ব 50 মিটার, তখনই প্রশ্ন জাগে দূরত্ব কোথা থেকে কত পর্যন্ত।



চিত্র : 2.1

এখানে আমাদের বলতে হবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপর কোন নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব 50 মিটার। 2.1 নং চিত্রে A ও B দুটি বিন্দু যেখানে A থেকে B-র দূরত্ব 50 মিটার। এখানে এই রাশিটি অর্থাৎ দূরত্বকে আমরা ভেক্টর

রাশি বলব। সুতরাং যে সকল রাশি একটি মান বিশিষ্ট কোনো বিশেষ দিকের ভাব প্রকাশ করে তাদের ভেস্টের রাশি বলা হয়। যেমন সরণ, ভার, গতিবেগ ও বল ভেস্টের রাশির উদাহরণ।

যে কোন জ্যামিতিক, ভৌত ও স্থিতিবিদ্যার সম্পাদ্য বা সমস্যা (problem) ভেস্টের সাহায্যে আমরা সমাধান করতে পারি। এই সকল সমস্যার সমাধান আমরা ভেস্টের ব্যাতীত অন্য পদ্ধতিতেও করতে পারি। কিন্তু দেখা যায় ভেস্টের বা ভেস্টের বিশেষ বিদ্যার সাহায্যে অতি সহজে আমরা কঠিন গণনা ছাড়া অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারি। তাই ভেস্টের সম্বন্ধে আপনাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

এই এককে আমরা প্রথমে আলোচনা করব ভেস্টের হলো নির্দিষ্ট দিক যুক্ত সরলরেখার অংশ বিশেষ। ভেস্টের বীজগণিতের আলোচনাও করা হবে, যার সাহায্যে দেখতে পারবেন অনেক ভৌত ও জ্যামিতিক সমস্যা সমাধান করা যাবে। এই ভেস্টের বীজগণিতে যাবার আগে প্রথমে বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোচনা করা হবে। ভেস্টের ত্রিমাত্রিক প্রকাশের পর কোনো বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের সম্বন্ধেও আপনারা জানতে পারবেন এবং দেখতে পাবেন কোনো ভেস্টেরকে হানাক দিয়েও প্রকাশ করা যায়। অবশ্যে রৈখিক সম্পর্কযুক্ত ভেস্টের সাহায্য নিয়ে তিনটি বিন্দু সমরেখ ও চারটি বিন্দু সমতলীয় হ্বার শর্ত আলোচনা করা হবে এবং এদের প্রয়োগ নানান সমস্যার মাধ্যমে দেখানো হবে।

## 2.2 উদ্দেশ্য :

এই এককটি পঠনের পর আপনি

- ভেস্টের ও ক্ষেত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- ভেস্টেরকে নির্দিষ্ট দিক যুক্ত সরলরেখা দ্বারা প্রকাশ করতে পারবেন।
- বীজগণিতে ভেস্টের প্রয়োগ দেখাতে পারবেন।
- দুই বা ততোধিক ভেস্টের যোগ ও বিয়োগ করতে শিখবেন।
- ভেস্টের ত্রিমাত্রিক প্রকাশ, অবস্থান ভেস্টের নির্ণয় করতে পারবেন।
- সরল জ্যামিতিক ও ভৌত সমস্যাতে ভেস্টের ব্যবহার করতে পারবেন।


## 2.3 ভেস্টের হল নির্দিষ্ট দিক যুক্ত একটি সরলরেখার অংশ বিশেষ (Vector as directed line segment)

### 2.3.1 দিষ্ট রেখাংশ বা রেখাখণ্ড (Directed line segment) :

কোন একটি নির্দিষ্ট সরলরেখার নির্দিষ্ট অংশ যার একটি আদি (initial) বিন্দু ও অস্তিম (terminal) বিন্দু থাকে তাকে রেখাংশ বলা হয়। 2.2.

নং চিত্রে CD সরলরেখার উপর A ও B দুটি বিন্দু। এখানে  $\overrightarrow{AB}$  প্রতীক (symbol) দ্বারা রেখাংশ বোঝায় যার আদি বিন্দু A এবং অস্তিম বিন্দু B।

লক্ষণীয়, রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$  ও  $\overrightarrow{BA}$  কিন্তু এক নয়। অর্থাৎ এরা বিপরীত দিক যুক্ত।



চিত্র : 2.2

### 2.3.2 রেখাংশের দৈর্ঘ্য (length), অবলম্বন (support) ও অভিদিশা (sense) :

যে কোন রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$ -র দৈর্ঘ্য, অবলম্বন ও অভিদিশা থাকে। রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$ -র দৈর্ঘ্য বলতে বোঝায়  $|AB|$  বা  $AB$  অর্থাৎ রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$ -র মাপাঙ্ক (modulus), রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$  যে নির্দিষ্ট সরলরেখার অংশ তাকে বলে অবলম্বন। 2.2 নং চিত্রে রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$  হল  $CD$  সরলরেখার অংশ। সুতরাং এখানে  $CD$  হল অবলম্বন। রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$ -র অভিদিশা হল  $A$  বিন্দু থেকে  $B$  পর্যন্ত এবং রেখাংশ  $\overrightarrow{BA}$ -র অভিদিশা হল  $B$  বিন্দু থেকে  $A$  পর্যন্ত। এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$  ও  $\overrightarrow{BA}$ -র দৈর্ঘ্য ও অবলম্বন এক কিন্তু অভিদিশা আলাদা। অর্থাৎ

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BA}|, \quad \overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$$

$\overrightarrow{AB}$  কে  $\overrightarrow{BA}$ -র অথবা  $\overrightarrow{BA}$  কে  $\overrightarrow{AB}$  খণ্ডক ভেষ্টের বলা হয়।

### 2.3.3 স্কেলার ও ভেষ্টের :

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে স্কেলারকে একটি সরলরেখার অংশ বিশেষের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং ভেষ্টের হল নির্দিষ্ট দিক্যুক্ত একটি সরলরেখার অংশ বিশেষ যার একটি আদি বিন্দু ও একটি অস্তিম বিন্দু থাকে। অর্থাৎ আরো সহজে বলা যেতে পারে ভেষ্টের হল সদিক রেখাংশ। 2.2 নং চিত্র হতে রেখাংশ  $\overrightarrow{AB}$  একটি ভেষ্টের। যার মানকে  $|\overrightarrow{AB}|$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা  $\overrightarrow{AB}$ -র মাপাঙ্ক।  $|\overrightarrow{AB}|$ -র মান কখনও খণ্ডক হয় না। একে সবসময় ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা একটি নির্দিষ্ট এককে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ বোঝায়। বাস্তব সংখ্যাগুলিকে স্কেলার বলা হয়। কোন স্কেলার  $m$ -র পরম মান (absolute value) আমরা  $|m|$  চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি। যেখানে  $|m| = m$ , যদি  $m \geq 0$  হয় এবং  $|m| = -m$ , যদি  $m < 0$  হয়। একটি চলস্তুতি বিন্দুর গতিবেগ অথবা একটি বস্তুখণ্ডের কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রযুক্ত একটি বলের মান এবং দিক একটি সরলরেখা দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সূচিত করা যেতে পারে।

ভেষ্টের রাশিকে আমরা কোন অক্ষরের মাথার উপর তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। যেমন  $\vec{v}, \vec{t}, \vec{r}$ । অথবা গ্রীক হরফের মাথার উপর তীর চিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ  $\vec{r}, \vec{\theta}, \vec{\tau}$  দ্বারাও উল্লেখ করা হয়। স্কেলার রাশিকে সাধারণত  $x, y, z$  দ্বারা চিহ্নিত করে থাকি।

### 2.3.4 শূন্য ভেষ্টের (Null vector) :

যে ভেষ্টেরের আদি ও অস্তিম বিন্দু এক তাকে শূন্য ভেষ্টের বলে। যথা  $\overrightarrow{AA}$  অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য শূন্য। শূন্য ভেষ্টেরকে  $\vec{0}$  বা  $\vec{0}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যে ভেষ্টেরের দৈর্ঘ্য শূন্য নয় তাকে প্রকৃত (proper) ভেষ্টের বলা হয়।


### 2.3.5 একক ভেষ্টের (Unit vector) :

একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভেষ্টেরকে একক ভেষ্টের বলা হয়। যে কোন ভেষ্টের  $\vec{v}$ -র দিক যুক্ত একক ভেষ্টের হল  $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ । লক্ষ্য করুন  $|\vec{u}| = 1$

### 2.3.6 সমান ভেক্টর (Equality of two vectors) :

দুটি ভেক্টরকে সমান ভেক্টর বলা হয় যখন

- উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান
- উভয়ের অবলম্বন একই সরলরেখা কিংবা দুটি পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা
- উভয়ের অভিদিশা এক।




চিত্র : 2.3


2.3 নং চিত্রে  $\vec{AB} = \vec{BC} = \vec{DE}$ । একটু লক্ষ্য করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন  $\vec{AB}$  ও  $\vec{BC}$ -র দৈর্ঘ্য, অবলম্বন ও অভিদিশা এক কিন্তু  $\vec{DE}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ও অভিদিশা  $\vec{AB}$  অথবা  $\vec{BC}$ -র সমান কিন্তু এর অবলম্বন  $\vec{AB}$ -র সমান্তরাল।

### 2.3.7 সদৃশ ও অসদৃশ ভেক্টর (Like and unlike vectors) :

যে দুটি ভেক্টর একই দিক নির্দেশ করে তাদের সদৃশ ভেক্টর বলা হয় এবং যারা বিপরীত দিক নির্দেশ করে তাদের অসদৃশ ভেক্টর বলা হয়। চিত্র নং 2.4-এ  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  সদৃশ ভেক্টর এবং চিত্র নং 2.5-এ  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  অসদৃশ ভেক্টর।




চিত্র : 2.4



চিত্র : 2.5

### 2.8 মুক্ত ভেক্টর (Free Vector) :

সমান ভেক্টরের ধারণা হতে সহজেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে সকল ভেক্টরগুলি একই মান বিশিষ্ট এবং একই দিক যুক্ত তারা প্রত্যেকেই একটি ভেক্টরকেই নির্দেশ করছে। সূতরাং এই সকল সমান ভেক্টরকে যে কোন বিন্দুকে আদি বিন্দু ধরে প্রকাশ করা সম্ভব। 2.6 নং চিত্রে প্রদত্ত ভেক্টর  $\vec{a} = \vec{AB}$ , অন্য যে কোন একটি আদি বিন্দু  $A'$  থেকে  $\vec{AB}$ -র সমান ও সমান্তরাল একই দিক্যুক্ত সরলরেখার অংশ বিশেষ  $\vec{A'B'}$  দ্বারা প্রকাশ করা যাচ্ছে। অনুরূপে  $\vec{A''B''} = \vec{a}$ , এই সকল ভেক্টরগুলিকে মুক্ত ভেক্টর বলে।



চিত্র : 2.6


### 2.3.9 ভেক্টরকে স্কেলার দ্বারা গুণন (Multiplication of a vector by a scalar) :

আপনারা স্কেলারের সংজ্ঞা থেকে জানতে পেরেছেন স্কেলারকে বাস্তব সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ধরি  $p$  একটি বাস্তব সংখ্যা।  $p$ -র মান শূন্য, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।  $\vec{p}$  যে কোন একটি ভেক্টর। এখানে  $p \vec{p}$  বলতে এমন একটি ভেক্টরকে বোঝাবে যে

- $p \vec{p}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্য  $\vec{p}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্যের  $|p|$  গুণ হবে।
- $p \vec{p}$  ও  $\vec{p}$  ভেক্টরের অবলম্বন একই সরলরেখা বা পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা হবে।
- $p \vec{p}$  ও  $\vec{p}$ -র দিক একই দিক নির্দেশ করবে অর্থাৎ এদের অভিদিশা এক হবে যখন  $p > 0$  এবং  $p \vec{p}$ -র দিক ও  $\vec{p}$ -র দিক পরস্পর বিপরীত দিক নির্দেশ করবে যখন  $p < 0$  হবে।

মন্তব্য :


- $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ , এখানে  $\vec{0}$  দিকের শূন্য স্কেলার কিন্তু ডান দিকের শূন্য, “শূন্য ভেক্টর” নির্দেশ করে।
- $(mn) \vec{p} = m(n \vec{p})$  হবে।
- যদি দুটি ভেক্টরের একই অথবা পরস্পর সমান্তরাল অবলম্বন হয় তবে যে কোন একটিকে অপরটির সঙ্গে কোন স্কেলার গুণন দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন 2.3 নং চিত্রে  $B$  যদি  $AC$ -র মধ্য বিন্দু হয় তবে  
 $\vec{AC} = 2 \vec{AB}$ ,  $\vec{CB} = -\frac{1}{2} \vec{AC}$  হবে।
- যদি  $p$  একটি স্কেলার ও  $\vec{p}$  একটি ভেক্টর হয় তা হলে  $p \vec{p}$  ভেক্টর প্রাপ্তি ভেক্টরের সমান্তরাল হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক  $2 \vec{p}$  একটি ভেক্টর যা  $\vec{p}$  ভেক্টরের সমান্তরাল এবং যার মান  $\vec{p}$  ভেক্টরের দ্বিগুণ।



চিত্র : 2.7

### 2.3.10 ঋণাত্মক ভেক্টর (Negative vector) :

কোন ভেক্টর  $\vec{p}$ -র ঋণাত্মক ভেক্টর বলতে বুঝি যার মান  $\vec{p}$  ভেক্টরের সমান কিন্তু অভিদিশা বিপরীত দিক যুক্ত। অর্থাৎ -  $\vec{p}$  ভেক্টরকে  $\vec{p}$  ভেক্টরের ঋণাত্মক ভেক্টর বলা হবে।  $\vec{OA} = \vec{p}$  হলে  $\vec{AO} = -\vec{p}$  হবে।




চিত্র : 2.8

মন্তব্য : ক্ষেত্রের দ্বারা গুণনে p-র মান  $-1$  হলে ( $- \vec{r}$ ) ভেক্টরটি  $\vec{r}$ -র সমান মান বিশিষ্ট কিন্তু বিপরীত দিকযুক্ত ভেক্টরকে নির্দেশ করে। এখানে ( $- \vec{r}$ )-কে  $\vec{r}$ -র ঋণাত্মক ভেক্টর বলে।

### 2.3.11 একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর (Co-initial vectors)

দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশির আদি বিন্দু একই বিন্দু হলে তাদের একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর বলা হয়।



চিত্র : 2.9

2.9 চিত্রে  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$ ,  $\vec{OC}$  ভেক্টরগুলি একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর।


## 2.4 ভেক্টর বীজগণিত(Algebra of vectors)

ভেক্টর রাশির সম্বন্ধে নিচ্যয়ই আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। এখন ভেক্টর রাশিগুলির দ্বারা একটি সেট গঠন করা যায়। সেট সম্বন্ধে অল্প ধারণা থাকলেই হবে। আপনাদের হয়ত মনে আছে কোন প্রদত্ত নিয়মানুসারে কতকগুলি সংজ্ঞায়িত (well defined) বস্তু বা উপাদানের (elements) সমবায়কে (collection) একটি সেট বলা হয়। এবং সেটের এক একটি উপাদানকে সেটের এক একটি পদ (element) বলা হয়। এই ভেক্টর রাশি গুলির দ্বারা গঠিত সেটে যে কোন দুটি ভেক্টরের মধ্যে ত্রিভুজ সূত্রানুসারে (এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে) যোগ প্রক্রিয়া সংযুক্ত হয়ে একটি গাণিতিক কাঠামো বা গঠন সৃষ্টি হয়েছে। এই গাণিতিক কাঠামোটিই হল ভেক্টর বীজগণিত। ভেক্টর বীজগণিতের বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্বগুলি জ্যামিতি, স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় সহায়তা করে।

### 2.4.1 ভেক্টরের যোগপ্রক্রিয়া (Addition of vectors)

যোগ প্রক্রিয়া : ত্রিভুজ সূত্র (Addition operation : Triangle Law)

ধরি  $\vec{r}$  ও  $\vec{t}$  দুটি নির্দিষ্ট ভেক্টর। আমরা এই দুটি ভেক্টরের যোগফল বার করতে চাই। যে কোন বিন্দু  $O$ -কে আদি বিন্দু ধরে নিয়ে  $\vec{OA}$  ভেক্টর অঙ্কন করা হল যা  $\vec{r}$  ভেক্টরের সমান।  $\vec{r} = \vec{OA}$  অর্থাৎ  $\vec{OA}$  ভেক্টরের মান ও দিক উভয়েই  $\vec{r}$  ভেক্টরের সমান। অনুরূপে  $A$  বিন্দুকে আদি বিন্দু ধরে  $\vec{AB}$  আরও একটি ভেক্টর অঙ্কন করা হল যা  $\vec{t}$  ভেক্টরের সমান। এখানে  $\vec{t} = \vec{AB}$ । তা হলে  $\vec{OB}$  ভেক্টর  $\vec{r}$  ও  $\vec{t}$ -র যোগফল নির্দেশ করবে অর্থাৎ



চিত্র : 2.10


$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$  অথবা  $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ । সূতরাং ভেক্টর  $\vec{OA}$  ও  $\vec{AB}$ -র যোগফল হবে একটি ভেক্টর যা  $\vec{OB}$  ভেক্টর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রূপ পাবে অর্থাৎ  $OAB$  ত্রিভুজের  $\vec{OA}$  ও  $\vec{AB}$  ভেক্টর দুটির যোগফল তৃতীয় বাহ্যিক দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যোগফল ভেক্টরটির আদি বিন্দু হবে প্রথম ভেক্টরটির অর্থাৎ  $\vec{OA}$ -র আদিবিন্দু এবং অস্তিম বিন্দু হবে দ্বিতীয় ভেক্টর  $\vec{AB}$ -র অস্তিম বিন্দু। একেই বলে ত্রিভুজ সূত্র।

মন্তব্য : i) আমরা লিখতে পারি যে কোন ভেক্টর  $\vec{r}$ -র জন্য  $\vec{r} + \vec{0} = \vec{r}$  যেখানে  $\vec{0}$  শূন্য ভেক্টর।

ii) এই যোগফল ত্রিভুজের সূত্র সকল প্রকার ভেক্টর দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু এটি আমদের জ্যামিতির পরিচিত ধর্মকে যেন বিরুদ্ধাচরণ করছে। অর্থাৎ “যে কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু থেকে বৃহত্তর হয়।” কিন্তু এখানে লক্ষণ্যভাবে ভেক্টরের যোগফল প্রক্রিয়ায় দেখা যায় দুটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহুর সমান। এখানে ভেক্টরের যোগফলের ত্রিভুজের বাহুর শুধু মান নয় দিক নির্দেশও আছে।

#### 2.4.2 সামান্তরিক সূত্র (Parallelogram law of addition)

ধরি একই আদি বিন্দু  $P$  বিশিষ্ট  $\vec{PQ}$  ও  $\vec{PS}$  দুটি ভেক্টর। 2.11 নং চিত্রে  $PQRS$  সামান্তরিকটি অঙ্কন করা হল। এখানে  $\vec{PQ} = \vec{SR}$  ও  $\vec{PS} = \vec{QR}$ । এখন ত্রিভুজ সূত্রানুযায়ী লেখা যায়  $\vec{PR} = \vec{PQ} + \vec{QR}$   
 $= \vec{PQ} + \vec{PS}$



চিত্র : 2.11

সূতরাং একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট দুটি ভেক্টর  $\vec{PQ}$  ও  $\vec{PS}$ -র যোগফল  $PQRS$  সামান্তরিকের কর্ণ  $\vec{PR}$  ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা যায়, একে ভেক্টর যোগফলের সামান্তরিক সূত্র বলে।

### 2.4.3 বহুজ সূত্র


আপনারা 2.12 নং চিত্র থেকে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন কि ভাবে 4টি ভেক্টর  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ ,  $\vec{d}$  কে যোগ করা হবে উপরের সংজ্ঞাদির প্রয়োগে। এখানে ত্রিভুজ সূত্র বাবে বাবে প্রয়োগ করে ভেক্টর গুলির যোগফল বাবে করা হয়েছে। 2.12 চিত্র থেকে লিখতে পারেন  $\vec{a} = \vec{AB}$ ,  $\vec{b} = \vec{BC}$ ,  $\vec{c} = \vec{CD}$ ,  $\vec{d} = \vec{DE}$  এখন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টরের যোগফল  $AC$  অর্থাৎ  $AC = AB + BC$  বা  $AC = \vec{a} + \vec{b}$ , ত্রিভুজ সূত্রানুসারে।

একই ভাবে  $AC$  ও  $CD$ -র যোগফল  $AD$

$$\vec{AD} = \vec{AC} + \vec{CD} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

আবাব  $AD$  ও  $DE$ -র যোগফল  $AE$  অর্থাৎ

$$\vec{AE} = \vec{AD} + \vec{DE} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$$



চিত্র : 2.12

এখানে  $ABCD$  বহুজের  $\vec{AB}$ ,  $\vec{BC}$ ,  $\vec{CD}$ ,  $\vec{DE}$  চারটি নির্দিষ্ট ভেক্টর হলে তাদের যোগফল  $\vec{AE}$  দ্বাবা প্রকাশিত হয়। একেই বহুজ সূত্র বলে। একই নিয়মে আপনারা যে কোন সংখ্যক ভেক্টরের যোগফল বাবে করতে পারবেন।


### 2.4.4 যোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নিয়ম : (Laws of addition)

#### 1) বিনিময় সূত্র : (commutative law)

যে কোন দুটি ভেক্টর রাশির মদ্যে যোগ প্রক্রিয়া বিনিময় নিয়ম মনে চলে। যথা  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

প্রমাণ : ধরি  $\vec{a} = \vec{PQ}$  ও  $\vec{b} = \vec{PS}$  দুটি একই বিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর।

$PQRS$  সামান্তরিকটি অঙ্কন করা হল।



চিত্র : 2.13

এখানে সামান্তরিকের সূত্রের সাহায্যে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{PR} = \vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{a} + \vec{b} \text{ আবাব } \vec{PR} = \vec{PS} + \vec{SR}$$

$$\text{অতএব } \vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PS} + \vec{SR} \text{ অথবা } \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

সুতরাং দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যে যোগ প্রক্রিয়া বিনিময় সূত্র মেনে চলে।


**মন্তব্য :** যদি সকল ভেক্টর রাশির দ্বারা গঠিত সেটকে  $V$  ধরি, তাহলে যে কোন দুটি ভেক্টর  $\vec{a}, \vec{b} \in V$  হলে  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$  সিদ্ধ হবে।

## 2) সংযোগ সূত্র : (Associative Law)

যে কোন তিনটি ভেক্টর রাশির মধ্যে যোগ প্রক্রিয়া সংযোগ নিয়ম মেনে চলে। যথা

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

প্রমাণ :



চিত্র : 2.14

ধরি  $\vec{PQ} = \vec{a}$ ,  $\vec{QR} = \vec{b}$ ,  $\vec{RS} = \vec{c}$  এখানে ত্রিভুজ সূত্রানুযায়ী

$$\Delta PQR\text{-র } \vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}, \text{ বা } \vec{a} + \vec{b} = \vec{PR}$$

আবার  $\Delta PRS$  থেকে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{PR} + \vec{RS} = \vec{PS}, \text{ বা } (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{PS} \quad \longrightarrow \quad (1)$$

$$\text{আবার } \Delta QRS\text{-র } \vec{QR} + \vec{RS} = \vec{QS} \text{ বা } \vec{b} + \vec{c} = \vec{QS}$$

$$\Delta PQS\text{-র } \vec{PQ} + \vec{QS} = \vec{PS}, \text{ বা } \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{PS} \quad \longrightarrow \quad (2)$$

সুতরাং (1) ও (2) হতে লেখা যায়  $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$

অতএব তিনটি ভেক্টর সংযোগ সূত্র মেনে চলে।


## 3) স্কেলার দ্বারা ভেক্টর গুণনের বর্ণন সূত্র : (The distributive law for multiplication of a vector by a scalar)

যে কোন দুটি ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  এবং দুটি স্কেলার  $m$  ও  $n$ , স্কেলার দ্বারা ভেক্টর গুণনের বর্ণন সূত্র মেনে চলে।  
যথা

$$i) m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$$

$$ii) (m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$$

i) প্রমাণ : ধরা যাক  $m$  একটি স্কেলার এবং  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{AB} = \vec{b}$



চিত্র : 2.15

$$\text{সূতরাং } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = \vec{a} + \vec{b} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$\vec{OA}$  রেখাকে  $A'$  বিন্দু পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করা হল যে

$$\vec{OA}' = m\vec{a} = m\vec{OA} \quad \therefore \frac{\vec{OA}}{\vec{OA}'} = \frac{1}{m}$$

এখন  $A'$  বিন্দু হতে  $AB$ -র সমান্তরাল করে  $A'B'$  রেখা অঙ্কন করা হল যা  $OB$  বর্ধিত রেখাকে  $B'$  বিন্দুতে ছেদ করে।  $A'B'$  ও  $AB$  রেখার অভিদিশা এক। সূতরাং আপনারা লিখতে পারেন,

$$\vec{A'B'} = m\vec{AB} \text{ ও } \vec{OB'} = m\vec{OB} \quad \left[ \text{যেহেতু } AB \parallel A'B' \right]$$

$$\text{অতএব } \vec{A'B'} = m\vec{AB} = m\vec{b} \quad \therefore \frac{\vec{OA}}{\vec{OA}'} = \frac{\vec{OB}}{\vec{OB}'} = \frac{\vec{AB}}{\vec{A'B'}} = \frac{1}{m}$$

$$\vec{OB'} = m\vec{OB} = m(\vec{a} + \vec{b}) \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{আবার } \vec{OB'} = \vec{OA}' + \vec{A'B'}$$

$$= m\vec{a} + m\vec{b} \quad \dots \dots \dots (3)$$


$\therefore$  সমীকরণ (2) ও (3) হতে লেখা যায়

$$m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$$

এবার  $m$  যদি ঋণাত্মক হয় তবেও প্রমাণ করা যাবে

$$m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$$

2.16 চিত্রে ধরি  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{AB} = \vec{b}$ ,  $m$ -এর ঋণাত্মক মানের জন্য  $\vec{AO}$  কে এমনভাবে বর্ধিত করা হল যাতে  $\vec{OA}' = m\vec{OA}$  হয়। অর্থাৎ  $\vec{OA}$  এবং  $\vec{OA}'$  বিপরীত দিক নির্দেশ করবে। এখন  $A'$  বিন্দু থেকে  $BA$ -র সমান্তরাল  $A'B'$  রেখা অঙ্কন করা হল যা  $BO$  বর্ধিত রেখাকে  $B'$  বিন্দুতে ছেদ করে।



চিত্র : 2.16

সূতরাং লেখা যায় (2.16 নং চিত্রানুসারে)

$$\frac{OA}{OA'} = \frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{1}{m}$$

$$\therefore \vec{A'B'} = m\vec{AB}, \quad \vec{OB'} = m\vec{OB}, \quad \vec{OA'} = m\vec{OA}$$


$$\vec{OB'} = \vec{OA'} + \vec{A'B'} = m\vec{OA} + m\vec{AB} = m\vec{a} + m\vec{b} \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{আবার } \vec{OB'} = m\vec{OB} = m(\vec{OA} + \vec{AB}) = m(\vec{a} + \vec{b})$$

অতএব সমীকরণ (1) ও (2) হতে লেখা যায়

$$m\vec{a} + m\vec{b} = m(\vec{a} + \vec{b})$$

ii) প্রমাণ :



চিত্র : 2.17

ধরি  $\vec{AB} = m\vec{a}$  সূতরাং  $\vec{AB}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্য  $\vec{a}$  ভেক্টরের  $m$  গুণ।  $\vec{AB}$  কে  $C$  বিন্দু পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করা হল যাতে,  $\vec{BC} = n\vec{a}$  হয়। সূতরাং  $\vec{BC}$ -র দৈর্ঘ্য  $\vec{a}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্যের  $n$  গুণ। অতএব  $\vec{AC}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্য  $\vec{a}$  ভেক্টরের  $(m+n)$  গুণ।

$$\therefore \vec{AC} = (m+n)\vec{a} \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{আবার } \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = m\vec{a} + n\vec{a} \quad \text{--- (2)}$$

সূতরাং সমীকরণ (1) ও (2) হতে লেখা যায়

$$(m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$$

মন্তব্য : রৈখিক সংযোজনের মৌল ধর্ম গুলিকে (Basic properties of the linear composition) নিম্নলিখিত যোগ সূত্র ও ক্ষেলার দ্বারা ভেক্টরের গুণন সহযোগে সংক্ষেপে একত্রে সাজানো যেতে পারে।

আমরা যদি সকল ভেক্টর দ্বারা গঠিত সেটকে  $V$  ধরি এবং সকল বাস্তব সংখ্যা দ্বারা গঠিত সেটকে  $R$  ধরি তবে

$$\text{i) } \vec{a} + \vec{b} + \vec{b} + \vec{a}, \quad \forall^* \vec{a}, \vec{b} \in V$$

$$\text{ii) } \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}, \quad \forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V$$

$$\text{iii) } \exists^* \text{ একটি শূন্য } (\vec{O}) \text{ ভেক্টর যাতে}$$

$$\vec{a} + \vec{O} = \vec{a} = \vec{O} + \vec{a} = \forall \vec{a} \in V$$

iv) প্রত্যেকটি  $\vec{v}$  ভেক্টরের জন্য অপর একটি ভেক্টর  $\vec{b} \in V$  পাওয়া যাবে যাতে

$$\vec{v} + \vec{b} = \vec{O} = \vec{b} + \vec{v}$$

এখানে  $\vec{b}$  ভেক্টরটিকে –  $\vec{v}$  দ্বারা প্রকাশিত করা হয়।

v)  $(m n) \vec{a} = m(n \vec{a}), \forall \vec{a} \in V$  এবং  $\forall m, n \in R$

vi)  $I(\vec{a}) = \vec{a}, \forall \vec{a} \in V$

vii)  $m(\vec{a} + \vec{b}) = m\vec{a} + n\vec{b}, \forall \vec{a}, \vec{b} \in V$  এবং  $\forall m \in R$

viii)  $(m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}, \forall m, n \in R$

এবং  $\forall \vec{a} \in V$

\* ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্ন (Symbol)

$\forall$  – For all, প্রত্যেকের জন্য


$\in$  – Belong to এখানে  $\vec{v} \in V$ -র অর্থে  $\vec{v}$  ভেক্টরটি  $V$  সেটে আছে।

$\exists$  – There exists, অস্তিত্ব থাকবে।


#### 2.4.5 দুটি ভেক্টরের বিয়োগ ফল

দুটি ভেক্টর  $\vec{v}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যে বিয়োগ বলতে আমরা বুঝি  $\vec{v}$  ও  $(-\vec{b})$  ভেক্টরের মধ্যে যোগফল।

অর্থাৎ  $\vec{v} - \vec{b} = \vec{v} + (-\vec{b})$



চিত্র : 2.18 (i)



চিত্র : 2.18(ii)

চিত্র 2.18(i) থেকে আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে  $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{a} - \vec{b}$ ,  
 $\vec{AB} = \vec{a}$ ,  $\vec{BD} = \vec{b}$

অতএব  $\vec{BC} = -\vec{b}$

চিত্র 2.18(ii) থেকে লেখা যায়

$$\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$$

বা  $\vec{b} + \vec{QR} = \vec{r}$  বা  $\vec{QR} = \vec{r} - \vec{b}$

যে কোন ভেক্টর  $\vec{AB}$  কে  $\vec{OB} - \vec{OA}$  দ্বারা লেখা যায়।

#### 2.4.6 ভেক্টর সমীকরণ : (Vector Equation)

$\vec{r}$  ও  $\vec{b}$  দুটি প্রদত্ত ভেক্টর এবং  $\vec{x}$  একটি অজানা ভেক্টর। তা হলে ভেক্টর সমীকরণ  $\vec{r} + \vec{x} = \vec{b}$ , একটি এবং কেবলমাত্র একটি ভেক্টর  $\vec{x}$  দ্বারাই সিদ্ধ হবে। যথা

$$\vec{x} = \vec{b} - \vec{r}$$

এখানে  $\vec{r} + \vec{x} = \vec{b}$

( $- \vec{r}$ ) ভেক্টর উভয় পক্ষে যোগ করে পাই

$$(-\vec{r}) + \vec{b} + \vec{x} = (-\vec{r}) + \vec{b}$$

বা  $(-\vec{r} + \vec{b}) + \vec{x} = \vec{b} + (-\vec{r})$


বা  $\vec{O} + \vec{x} = \vec{b} - \vec{r}$

বা  $\vec{x} = \vec{b} - \vec{r}$

#### 2.4.7 সমরেখ ভেক্টর (Collinear Vectors)

দুই বা ততোধিক ভেক্টর রাশিকে সমরেখ ভেক্টর বলা হয় যদি তাদের অবলম্বন একই সরলরেখা অথবা পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা হয়। সমান্তরাল ভেক্টরগুলিকে সমরেখ ভেক্টর বলা হয়। আপনারা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে সকল ভেক্টর একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট এবং সমরেখ তাদের অবলম্বন একই সরলরেখা হবে।

2.19 নং চিত্র হতে বলা যায়  $\vec{AB}$ ,  $\vec{BC}$ ,  $\vec{CD}$  ও  $\vec{EF}$  ভেক্টরগুলি সমরেখীয়।



চিত্র : 2.19

#### 2.4.8 সমতলীয় ভেক্টর (Coplanar Vectors)

তিনি বা ততোধিক ভেক্টরকে একই তলে অবস্থিত তিনি বা ততোধিক রেখাংশ দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব হলে তাদের সমতলীয় বলা হবে।

## 2.4.9 রৈখিক সমবায় (Linear Combination)

যদি  $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$  ----- সম্ভবটি সিদ্ধ হয় তবে  $\vec{r}$  ভেক্টরকে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  ----- ভেক্টর গুলির রৈখিক সমবায় বলা হবে যেখানে  $x, y, z, \dots$  ক্ষেত্রার রাশি নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ  $2\vec{a} + \vec{b} - 4\vec{c}$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  ভেক্টরের রৈখিক সমবায়।

মন্তব্য : i)  $x\vec{a} + y\vec{b}$  ভেক্টরটি যা  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টরের রৈখিক সমবায়, ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র সঙ্গে সমতলীয় হবে।

ii) দুটি ভেক্টর সমরেখ হলে একটিকে অপরটির রৈখিক সমবায়ে প্রকাশ করা যায়।

iii) যদি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি সমান্তরাল ভেক্টর হয় তবে এদের মধ্যে যে কোন একটিকে অপরটির রৈখিক সমবায়ে প্রকাশ করা যাবে। অর্থাৎ  $\vec{b} = x\vec{a}$  বা  $\vec{a} = \frac{1}{x}\vec{b}$ ।

## 2.4.10 রৈখিক সমন্বযুক্ত ভেক্টর (Linearly Dependent Vectors)

একটি ভেক্টর তত্ত্ব (system of vectors)  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ -কে পরম্পর রৈখিক সমন্বযুক্ত ভেক্টর বলা হবে যদি

$$x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} + \dots = \mathbf{0} \quad (1)$$

সম্ভবটি সিদ্ধ হয় যেখানে  $x, y, z, \dots$  এমন কতগুলো ক্ষেত্রার রাশি যাদের সবার মান শূন্য নহে অর্থাৎ  $(x, y, z, \dots) \neq (0, 0, 0, \dots)$


অপরভাবে যদি সমীকরণ (1) সিদ্ধ হয় এবং

$x = y = z = \dots = 0$  হয় অর্থাৎ সব কটি ক্ষেত্রার রাশির মান শূন্য হয় তবে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$  ভেক্টর গুলি রৈখিক সমন্বযুক্ত হবে না এবং এই ক্ষেত্রে এদের বলা হবে রৈখিক সমন্বযুক্ত (Linearly independent) ভেক্টর। আপনারা নিচয়েই বুঝতে পারবেন যে কোন দুটি সমরেখ ভেক্টর সবসময় রৈখিক সমন্বযুক্ত হবে। তিনটি সমতলীয় ভেক্টর পরম্পর রৈখিক সমন্বযুক্ত হবে বা বিপরীত ক্রমে তিনটি ভেক্টর রৈখিক সমন্বযুক্ত হলে তারা সমতলীয় হবে।

উদাহরণমালা :

উদা : 1 ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ করুন কোন সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরম্পরকে সমন্বিত করে।

প্রমাণ :



চিত্র : 2.20

OABC একটি সামান্তরিক। ধরি  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OC} = \vec{c}$  এখানে  $\vec{OC} = \vec{AB}$  যেহেতু  $AB = OC$  এবং  $AB \parallel OC$  আপনারা লিখতে পারেন

$$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \quad [\text{ত্রিভুজ সূত্রানুসারে } OAB \text{ ত্রিভুজ থেকে}]$$

$$= \vec{a} + \vec{c}$$

এবং  $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} \quad [OAC \text{ ত্রিভুজ থেকে}]$

বা  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \vec{c} - \vec{a} \quad \dots \dots \dots (1)$

ধরি কর্ণ দুটি পরম্পরাকে  $D$  বিন্দুতে ছেদ করে। যেহেতু  $O, B, D$  বিন্দু তিনটি সমরেখীয় অতএব  $\overrightarrow{OD} = m \overrightarrow{OB}$  লেখা যায়।  $m$  একটি ক্ষেত্রাল।  $\therefore \overrightarrow{OD} = m \overrightarrow{OB}$

$$= m(\vec{a} + \vec{c})$$

অনুরূপে  $\overrightarrow{AD} = n \overrightarrow{AC} = n(\vec{c} - \vec{a}) \quad \dots \dots \dots (2)$

এখন ত্রিভুজ  $OAD$  থেকে লেখা যায়

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD}$$

বা  $\vec{a} + n(\vec{c} - \vec{a}) = m(\vec{a} + \vec{c})$

বা  $\vec{a} - n\vec{a} - m\vec{a} + n\vec{c} - m\vec{c} = 0$

বা  $(1-n-m)\vec{a} + \vec{c}(n-m) = 0$

কিন্তু যেহেতু  $\vec{a}$  ও  $\vec{c}$  সমান্তরাল ভেষ্টের নয় অতএব

$n-m=0$  এবং  $1-n-m=0$  হবে। শেষ দুটি সমীকরণের সমাধান হবে  $m=n=\frac{1}{2}$

সূতরাং  $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$

এবং  $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \quad [\text{সমীকরণ (1) ও (2)-এর সাহায্যে}]$

$$\therefore \left| \overrightarrow{OD} \right| = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{OB} \right|, \left| \overrightarrow{AD} \right| = \frac{1}{2} \left| \overrightarrow{AC} \right|$$

অর্থাৎ  $OD = \frac{1}{2} OB$  এবং  $AD = \frac{1}{2} AC$

অতএব প্রমাণিত হল  $OB$  ও  $AC$  কর্ণের পরম্পরাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।


উদাঃ 2.  $ABCD$  সামান্তরিকের  $AC$  ও  $BD$  কর্ণ হলে

- i)  $\overrightarrow{AC}$  ও  $\overrightarrow{BD}$  কে  $\overrightarrow{AB}$  ও  $\overrightarrow{AD}$ -র দ্বারা প্রকাশ করুন।

ii)  $\vec{AB}$  ও  $\vec{AD}$  কে  $\vec{AC}$  ও  $\vec{BD}$ -র দ্বারা প্রকাশ করুন।

iii)  $\vec{AB}$  ও  $\vec{AC}$  কে  $\vec{AD}$  ও  $\vec{BD}$ -র দ্বারা প্রকাশ করুণ।

সমাধান :



চিত্র : 2.21

$$\text{i) } \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} \quad [\text{ABC ত্রিভুজ থেকে}]$$

$$= \vec{AB} + \vec{AD} \quad [\text{যেহেতু } \vec{BC} = \vec{AD}]$$

$$\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AD} \quad [\text{BAD ত্রিভুজ থেকে}]$$

$$= -\vec{AB} + \vec{AD}$$

$$= \vec{AD} - \vec{AB}$$

$$\text{ii) } \vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB} \quad \text{_____ (1)} \quad [\text{ABC ত্রিভুজ থেকে}]$$

$$\vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DB} \quad [\text{ABD ত্রিভুজ থেকে}]$$

$$= \vec{AD} - \vec{BD} \quad \text{_____ (2)}$$

সমীকরণ (1) ও (2) যোগ করে লেখা যায়

$$2 \vec{AB} = \vec{AC} - \vec{BD} \quad [\text{যেহেতু } \vec{AD} = \vec{BC} = -\vec{CB}]$$

$$\therefore \vec{AB} = \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{BD}) \quad \text{_____ (3)}$$

$$\text{আবার } \vec{AD} = \vec{AC} + \vec{CD} \quad [\text{ত্রিভুজ ACD থেকে}]$$

$$= \vec{AC} + \vec{BA}$$

$$\begin{aligned}
 &= \vec{AC} - \vec{AB} \\
 &= AC - \frac{1}{2}(\vec{AC} - \vec{BD}) \quad [\text{সমীকরণ (3) থেকে}] \\
 &= \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BD})
 \end{aligned}$$

iii)  $\vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DB}$  [ ত্রিভুজ ABD থেকে]

$$\begin{aligned}
 &= \vec{AD} - \vec{BD}
 \end{aligned}$$


এবং  $\vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC}$  [ ত্রিভুজ ADC থেকে]

$$\begin{aligned}
 &= \vec{AD} + \vec{AB} \\
 &= \vec{AD} + \vec{AD} - \vec{BD} \quad [\text{সমীকরণ (2) থেকে}] \\
 &= 2\vec{AD} - \vec{BD}
 \end{aligned}$$

উদা : 3. যে কোন ত্রিভুজ ABC-র D, E, F যথাক্রমে BC, CA, AB বাহুগুলির মধ্য বিন্দু হলে

- i)  $\vec{BC}, \vec{AD}, \vec{BE}$  ও  $\vec{CF}$ -র মান  $\vec{AB}$  ও  $\vec{AC}$ -র বৈচিক সমবায়ে নির্ণয় করুন।
- ii)  $\vec{AC}, \vec{BC}, \vec{AD}, \vec{CF}$ -র মান  $\vec{AB}$  ও  $\vec{BE}$ -এর বৈচিক সমবায়ে নির্ণয় করুন।

সমাধান :



চিত্র : 2.22

- i) ABC ত্রিভুজ থেকে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \quad \therefore \vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} \quad \text{--- (1)}$$

ABD ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়

$$\vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$$

$$\therefore \vec{AD} = \vec{AB} + \frac{1}{2} \vec{BC} \quad [\text{যেহেতু } D \text{ বিন্দু } BC \text{ বাহর মধ্য বিন্দু}]$$

$$= \vec{AB} + \frac{1}{2} (\vec{AC} - \vec{AB}) \quad [\text{সমীকরণ (1) থেকে}]$$

ABE ত্রিভুজ থেকে  $\vec{AB} + \vec{BE} = \vec{AE}$

$$\therefore \vec{BE} = \frac{1}{2} \vec{AC} - \vec{AB} \quad [\text{যেহেতু } E, AC \text{ বাহর মধ্য বিন্দু}]$$

ACF ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়

$$\vec{AC} + \vec{CF} = \vec{AF}$$

$$\therefore \vec{CF} = \frac{1}{2} \vec{AB} - \vec{AC} \quad [\text{যেহেতু } F, AB \text{ বাহর মধ্য বিন্দু}]$$

ii) যেহেতু E বিন্দু AC বাহর মধ্যবিন্দু

$$\therefore \vec{AC} = 2\vec{AE} = 2(\vec{AB} + \vec{BE}) \quad \text{--- (2)}$$

ABC ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়

$$\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC}$$

$$= -\vec{AB} + 2\vec{AE}$$

$$= -\vec{AB} + 2(\vec{AB} + \vec{BE})$$

$$= \vec{AB} + 2\vec{BE}$$

$$\begin{aligned} \text{ADC ত্রিভুজ থেকে } \vec{AD} &= \vec{AC} + \vec{CD} \\ &= 2\vec{AE} + \frac{1}{2} \vec{CB} \\ &= 2(\vec{AB} + \vec{BE}) - \frac{1}{2} \vec{BC} \end{aligned}$$

$$= 2(\vec{AB} + \vec{BE}) - \frac{1}{2} \vec{AB} - \frac{1}{2} \vec{BE}$$

$$= \frac{3}{2} \vec{AB} + \vec{BE}$$

ACF ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়

$$\vec{CF} = \vec{CA} + \vec{AF}$$

$$= -\vec{AC} + \frac{1}{2} \vec{AB}$$

$$= -2\vec{AB} - 2\vec{BE} + \frac{1}{2} \vec{AB} \quad [\text{সমীকরণ (2) থেকে}]$$

$$= -\frac{3}{2} \vec{AB} - 2\vec{BE}$$

উদা : 4. প্রমাণ করন  $3\vec{a} - 7\vec{b} - 4\vec{c}$ ,  $3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ ,  $\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}$  ভেক্টরগুলি সমতলীয় যেখানে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  যে কোন তিনটি ভেক্টর।

সমাধান : তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হবে যদি যে কোন একটিকে অপর দুটি ভেক্টরের বৈধিক সমবায়ে প্রকাশ করা যায়। ধরি তিনটি প্রদত্ত ভেক্টর সমতলীয়।

$\therefore 3\vec{a} - 7\vec{b} - 4\vec{c} = x(3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}) + y(\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c}) \dots \dots (1)$  যেখানে x ও y দুটি ক্ষেত্রালীয়। এখানে উভয় পক্ষ থেকে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  ভেক্টরের সহগকে (Co-efficient) তুলনা করে লেখা যায়

$$3 = 3x + y \quad \dots \dots \rightarrow (2)$$

$$-7 = -2x + y \quad \dots \dots \rightarrow (3)$$

$$-4 = x + 2y \quad \dots \dots \rightarrow (4)$$

সমীকরণ (2) ও (3) কে সমাধান করে পাওয়া যায় x = 2, y = -3, x ও y-র এই মানদ্বয় সমীকরণ (4) কে সিদ্ধ করে। সূতরাঃ সমীকরণ (1) কে লেখা যায়  $3\vec{a} - 7\vec{b} - 4\vec{c} = 2(3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}) - 3(\vec{a} + \vec{b} + 2\vec{c})$

অতএব আপনারা বলতে পারেন প্রদত্ত ভেক্টর তিনটি সমতলীয়।

অনুশীলনী :

অনু : 1. একটি সমবাহু ষড়ভুজ (regular hexagon) ABCDEF-র পরপর দুটি খাতকে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টর দ্বারা

প্রকাশ করলে  $\vec{CD}$ ,  $\vec{DE}$ ,  $\vec{EF}$ ,  $\vec{FA}$ ,  $\vec{AC}$ ,  $\vec{AD}$ ,  $\vec{AE}$  ও  $\vec{CE}$  ভেস্টেরগুলিকে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দ্বারা প্রকাশ করুন।

অনু : 2. D, E, F যথাক্রমে ABC ত্রিভুজের BC, CA ও AB-র মধ্য বিন্দু। প্রমাণ করুন  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$ ,  $\vec{OC}$

বলগুলি  $\vec{OD}$ ,  $\vec{OE}$ ,  $\vec{OF}$  বলগুলির সমতুল্য (equivalent), যেখানে O বিন্দুটি ABC ত্রিভুজের তলে অবস্থিত।

অনু : 3. একটি ত্রিভুজের বাহু ভেস্টের গুলি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  হলে প্রমাণ করুন  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$

অনু : 4. ABC ত্রিভুজের BC, CA ও AB বাহুগুলির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F হলে প্রমাণ করুন  
 $\vec{AD} + \vec{BE} + \vec{CF} = 0$

অনু : 5. M বিন্দু AB-র মধ্যবিন্দু এবং O যে কোন বিন্দু হলে  $\vec{OM}$ -র নির্মাণিত কোণ মানটি সঠিক হবে?

- i)  $\vec{OA} + \vec{MA}$ , ii)  $\vec{OA} - \vec{MA}$ , iii)  $\frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OA})$ , iv)  $\frac{1}{2}(\vec{OB} - \vec{OA})$

অনু : 6. নিম্নের ভেস্টেরগুলি সমতলীয় কিনা দেখান


$$5\vec{a} + 6\vec{b} + 7\vec{c}, 7\vec{a} - 8\vec{b} + 9\vec{c}, 3\vec{a} + 20\vec{b} + 5\vec{c}$$

**2.4.11 ভেস্টেরের ত্রিমাত্রিক প্রকাশ :** (Resolution of vectors : To express a given vector in terms of three given non-coplanar vectors)

$\vec{r}$ ,  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  একই সমতলে অবস্থিত নয় এমন তিনটি ভেস্টের। তাহলে দেখানো যেতে পারে যে কোন অপর ভেস্টের  $\vec{r}$  কে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ -র সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাবে নির্মাণিত গঠনে :

$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ , যেখানে x, y, z, তিনটি ক্ষেত্রাল। পুনরায় প্রমাণ করা যেতে পারে যে  $\vec{r}$ -র  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ -র সাপেক্ষে উন্নেতিত প্রকাশটি অনন্য (unique)

প্রমাণ :



চিত্র : 2.23

O যেকোন একটি বিন্দু। ধরি  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$ ,  $\vec{OC} = \vec{c}$ ,  $\vec{OP} = \vec{r}$ । যেহেতু  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$  ভেক্টরগুলি সমতলীয় নয় সূতরাং  $BOC, COA, AOB$  আলাদা তিনটি তল উৎপন্ন করে। P বিন্দু দিয়ে যায় এমন তিনটি তল অঙ্কন করা হল যারা  $BOC, COA$  ও  $AOB$  তলের সমান্তরাল এবং  $OA, OB$  ও  $OC$  রেখাকে যথাক্রমে L, M ও N বিন্দুতে ছেদ করে। আপনারা দেখতে পারছেন এখানে একটা সামান্তরিক ষড়ভূজ (parallellopiped) উৎপন্ন হল, যার একটি কর্ণ (diagonal)  $OP$ .

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \vec{OP} = \vec{OL} + \vec{LP} \quad [\text{এভুজ সূত্রানুসারে}] \\ &= \vec{OL} + \vec{LN'} + \vec{N'P} \\ &= \vec{OL} + \vec{OM} + \vec{ON}\end{aligned}$$

এখন  $\vec{OL}$  ও  $\vec{OA}$  সমরেখ ভেক্টর হওয়ায় আমরা পাই  $\vec{OL} = x\vec{OA} = x\vec{a}$ , অনুরূপে  $\vec{OM} = y\vec{OB} = y\vec{b}$  এবং  $\vec{ON} = z\vec{OC} = z\vec{c}$ , এখানে x, y, z ক্ষেত্রার রাশি। সূতরাং,

$$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$$

এবার দেখাব x, y, z- এই ক্ষেত্রার তিনটি অনন্য। সম্ভব হলে ধরা যাক x, y, z এই তিনটি ক্ষেত্রার ব্যতীত  $x^1, y^1, z^1$  অপর তিনটি ক্ষেত্রার দ্বারাও আমরা লিখতে পারি

$$\vec{r} = x^1\vec{a} + y^1\vec{b} + z^1\vec{c}$$

$$\text{তাহলে, } x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = x^1\vec{a} + y^1\vec{b} + z^1\vec{c}$$

$$\text{বা } (x - x^1)\vec{a} + (y - y^1)\vec{b} + (z - z^1)\vec{c} = 0$$


যেহেতু  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  ভেক্টর তিনটি সমতলীয় নয় সূতরাং ঐগুলি রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত ভেক্টর হবে না। অর্থাৎ  $x - x^1 = y - y^1 = z - z^1 = 0$  হবে।

$$\text{বা } x = x^1, y = y^1, z = z^1$$

অতএব  $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$  প্রকাশটি অনন্য।

#### 2.4.12 উপপাদ্য : (Theorem) 1

সমরেখ নয় এমন যে কোন দুটি ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  এবং  $\vec{r}$  অপর একটি ভেক্টর যা  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যগামী তলে অবস্থিত। তাহলে  $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$  হবে যেখানে x ও y দুটি অনন্য (unique) ক্ষেত্রার রাশি।



চিত্র : 2.24

প্রমাণ : যে কোন একটি বিন্দু  $O$  নেওয়া হল। ধরি  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$  এবং  $\vec{OP} = \vec{r}$ , এমন একটি ভেস্টর যা  $OA$  ও  $OB$  ভেস্টরের সঙ্গে সমতলীয়। অর্থাৎ এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$  ও  $\vec{OP}$  সমতলীয় ভেস্টর।  $P$  বিন্দু হতে  $OB$  ও  $OA$ -র সমান্তরাল করে দুটি সরলরেখা অঙ্কিত হল যারা  $OA$  ও  $OB$  কে যথাক্রমে  $L$  ও  $M$  বিন্দুতে ছেদ করে।

এফেতে  $\vec{OL}$  ও  $\vec{OA}$  ভেস্টর সমরেখ বলে আপনারা লিখতে পারেন  $\vec{OL} = x \vec{OA}$ । অনুরূপে  $\vec{OM} = y \vec{OB}$ ,

$$\text{সুতরাং } \vec{r} = \vec{OP} = \vec{OL} + \vec{LP} \quad [\text{ ত্রিভুজ সূত্রানুসারে }]$$

$$\begin{aligned} &= \vec{OL} + \vec{OM} \\ &= x \vec{OA} + y \vec{OB} \\ &= x \vec{a} + y \vec{b} \end{aligned}$$

এবার দেখানো হবে  $x$  ও  $y$  ক্ষেত্রাল দুটি অনন্য। যদি সম্ভব হয় ধরা যাক

$$\vec{r} = x' \vec{a} + y' \vec{b} \quad \text{যেখানে } x \neq x', y \neq y'$$

$$\text{সুতরাং } x \vec{a} + y \vec{b} = x' \vec{a} + y' \vec{b}$$

$$\text{বা } (x - x') \vec{a} + (y - y') \vec{b} = 0$$

$$\text{যদি } (x - x') \neq 0 \text{ হয় তবে } \vec{a} = \frac{y - y'}{x - x'} \vec{b}$$

এখান থেকে আপনারা দেখতে পারছেন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেস্টর দুটি সমরেখ। কিন্তু প্রথমে ধরা হয়েছিল  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেস্টর সমরেখ নয়। কাজেই এটি শর্তের বিপরীত। সুতরাং  $x = x'$ , এবং  $y = y'$  হবে। অতএব  $\vec{r} = x \vec{a} + y \vec{b}$  প্রকাশে  $x$  ও  $y$  ক্ষেত্রাল দুটি অনন্য।

#### 2.4.13 উপপাদ্য 2 :

শূন্যমান নয় এবং সমরেখ নয় এমন দুটি ভেস্টর রৈখিক সম্বন্ধ যুক্ত ভেস্টর হবে না।

প্রমাণ : ধরি শূন্যমান নয় এবং সমরেখ নয় এমন দুটি ভেস্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যে  $x \vec{a} + y \vec{b} = 0$ , সম্বন্ধটি

सिद्ध हय येथाने  $x$  ओ  $y$  दूटी क्लोर। प्रमाण करते हवे  $x = y = 0$  अर्थां  $\vec{r}$  ओ  $\vec{b}$  रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर। मने करि  $x \neq 0$ , ता हले

$$x \vec{r} + y \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{r} = -\frac{y}{x} \vec{b}$$

सूतरां  $\vec{r}$  ओ  $\vec{b}$  भेट्टर दूटी समरेख येहेतु  $\vec{r}$  भेट्टरके  $\vec{b}$  भेट्टरेर क्लोर गुण घारा प्रकाश करा हयोहे। किञ्च देवया आছे  $\vec{r}$  ओ  $\vec{b}$  भेट्टर समरेख नय। काजेहे एटी शर्तेर विपरीत।

$$\text{सूतरां } x \vec{r} + y \vec{b} = 0 \text{ हले } x = 0, y = 0 \text{ हवे।}$$

अर्थां  $\vec{r}$ ,  $\vec{b}$  भेट्टरद्वय रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर हवे ना।

### उपपाद्य 3 :

शून्यमान नय एवं समतलीय नय एमन तिनाटी भेट्टर रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर हवे।

प्रमाण : धरि शून्यमान नय एवं समतलीय नय एमन तिनाटी भेट्टर  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$ -र मध्ये

$$x \vec{r} + y \vec{b} + z \vec{c} = 0$$

सम्बद्धीति सिद्ध हय येथाने  $x, y, z$  तिनाटी क्लोर। एथन प्रमाण करते हवे  $x = y = z = 0$ । मने करि  $x \neq 0$ , ताहले सेथा याय

$$\vec{r} = -\frac{y}{x} \vec{b} - \frac{z}{x} \vec{c}$$

सूतरां  $\vec{r}$  भेट्टर  $\vec{b}$  ओ  $\vec{c}$  भेट्टरद्वयेर सम्मे समतलीय। किञ्च देवया आছे  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$  तिनाटी असमतलीय भेट्टर। काजेहे एटी शर्तेर विपरीत। सूतरां  $x = 0$  हवे। अनुरापे प्रमाण करा याय  $y = 0, z = 0$

$$\text{अतेह } x \vec{r} + y \vec{b} + z \vec{c} = 0 \text{ हले } x = 0, y = 0, z = 0$$

अर्थां  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$  रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर।

### 2.4.15 उपपाद्य 4 :

ये कोन चाराटी भेट्टर दिये गठित सेट सर्वदा रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर हवे।

प्रमाण :  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  ये कोन चाराटी प्रदत्त भेट्टर। एदेव मध्ये धरि तिनाटी भेट्टर  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$  असमतलीय भेट्टर। सूतरां अपर भेट्टर  $\vec{d}$  के आमरा  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$ -र रैखिक समवाये प्रकाश करते पारि। अर्थां

$$\vec{d} = x \vec{r} + y \vec{b} + z \vec{c}, x, y, z \text{ ये कोन तिनाटी क्लोर } \Rightarrow x \vec{r} + y \vec{b} + z \vec{c} + (-\vec{d}) = 0$$

सूतरां एथाने स्पष्टहे बोधा आछे  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  रैखिक सम्बद्धीन भेट्टर येहेतु  $(x, y, z, -1) \neq (0, 0, 0, 0)$

এখন ধরি চারটি প্রদত্ত ভেক্টরের মধ্যে তিনটি ভেক্টর  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  সমতলীয় ভেক্টর। এবং ধরি এই তিনটির মধ্যে যে কোন দুটি ভেক্টর সমরেখ (Collinear) নয়। সূতরাং আপনারা লিখতে পারেন  $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b}$

$$\Rightarrow x\vec{a} + y\vec{b} + (-1)\vec{c} + 0, \vec{d} = 0$$

অতএব  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ ,  $\vec{d}$  রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত ভেক্টর যেহেতু  $(x, y, -1, d) \neq (0, 0, 0, 0)$

#### 2.4.16 ভেক্টরের নির্ধান, উপাখণ এবং স্থানাঙ্ক : (Bases, Components and Co-ordinates of a vector)

ধরি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  যে কোন অসমতলীয় প্রদত্ত ভেক্টর। তাহলে যে কোন ভেক্টর  $\vec{r}$  কে প্রকাশ করা যায় নিম্নলিখিত গঠন দ্বারা।

$$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}, \text{ যেখানে } x, y, z \text{ স্কেলার।}$$

এখানে  $\vec{r}$  ভেক্টরের উপাখণ হল  $x\vec{a}$ ,  $y\vec{b}$ ,  $z\vec{c}$  এবং  $x, y, z$  স্কেলারগুলিকে  $\vec{r}$  ভেক্টরের স্থানাঙ্ক বলা হয়।

অসমতলীয় রৈখিক সম্বন্ধহীন ভেক্টর-সেট ( $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ) যার সাপেক্ষে কোন প্রদত্ত ভেক্টর  $\vec{r}$  কে প্রকাশ করা যায় তাকে নির্ধান বলে। যে কোন তিনটি অসমতলীয় ভেক্টর তন্মুকে একটি নির্ধান ধরা যেতে পারে।

দুটি ভেক্টরের যোগফলের স্থানাঙ্ক এবং ভেক্টরের স্কেলার ঘারা গুণনের স্থানাঙ্ক নির্ণয় :

ধরি  $\vec{r}$  ও  $\vec{r}'$  দুটি প্রদত্ত ভেক্টর যাদের স্থানাঙ্ক কোন প্রদত্ত নির্ধান  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ -র সাপেক্ষে (relatively) যথাক্রমে  $(x, y, z)$  ও  $(x', y', z')$  অতএব

$$\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$$

$$\vec{r}' = x'\vec{a} + y'\vec{b} + z'\vec{c}$$

$$\text{সূতরাং } \vec{r} + \vec{r}' = (x + x')\vec{a} + (y + y')\vec{b} + (z + z')\vec{c}$$

$$\therefore \vec{r} + \vec{r}' - \text{ভেক্টরের স্থানাঙ্ক প্রদত্ত নির্ধান } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}-\text{র সাপেক্ষে } \{(x + x'), (y + y'), (z + z')\} \text{ হবে।}$$

$$\text{আবার যে কোন স্কেলার } m-\text{র জন্য } m\vec{r} = m(x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c})$$

$$\therefore m\vec{r} \text{ ভেক্টরের স্থানাঙ্ক } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ নির্ধানের সাপেক্ষে } (mx, my, mz) \text{ হবে।}$$

উদাহরণমালা :

উদাহরণ 5 : যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  একটি নির্ধান হয় তবে প্রমাণ করুন  $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$  - ও একটি নির্ধান গঠন করবে।

সমাধান : এখানে দেখাতে হবে  $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$  - রৈখিক সম্বন্ধহীন ভেক্টর।

$$\text{এখন } x(\vec{a}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + z(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 0$$

$$\Rightarrow (x + y + z)\vec{a} + (y + z)\vec{b} + z\vec{c} = 0$$

যেহেতু  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  একটি নির্ধারিত অস্তএব তারা স্বৈরিক সম্পূর্ণহীন ভেক্টর।

$$\text{অস্তএব } x + y + z = 0, y + z = 0, z = 0$$

$$\Rightarrow x = y = z = 0$$

∴  $\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$  স্বৈরিক সম্পূর্ণহীন ভেক্টর হবে। সুতরাং তারা একটি নির্ধারণ গঠন করবে।

অনুশীলনী :

অনু : 7.  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ -র নির্ধারণের সাপেক্ষে কোন ভেক্টর  $\vec{r}$ -র স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  হলে  $\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ -র সাপেক্ষে  $\vec{r}$ -র স্থানাঙ্ক কত হবে?

অনু : 8. যদি  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  একটি নির্ধারণ গঠন করে তবে  $3\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$  ভেক্টরের স্থানাঙ্ক বার করন যেখানে  $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} = \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ .

#### 2.4.17 কোন বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর : (position vector of a point)


একটি যে কোন (arbitrary) বিন্দুকে স্থির বিন্দু ধরে তার সাপেক্ষে অপর যে কোন একটি বিন্দুর অবস্থান একটি ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। অবস্থান নির্দেশক ভেক্টরটিকে অবস্থান ভেক্টর বলে।



চিত্র : 2.25

2.25 নং চিত্রে O স্থির বিন্দুর সাপেক্ষে অপর একটি বিন্দু A-র অবস্থান ভেক্টর  $\vec{OA}$  দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং  $\vec{OA}$  ভেক্টরটিকে O-র সাপেক্ষে A-বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বলা হবে। এখানে  $\vec{OA}$  ভেক্টরের আদি বিন্দু O এবং অস্তিম বিন্দু A।

#### দুটি বিন্দু সংযোজক যেখার অবস্থান ভেক্টর (position vector of a line joining two points)



চিত্র : 2.26

ধরি A ও B যে কোন দুটি বিন্দু এবং O একটি স্থির বিন্দু, উপরের আলোচনা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর O বিন্দুর সাপেক্ষে যথাজম্যে  $\vec{OA}$  ও  $\vec{OB}$  নির্দেশক ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এখানে আমরা লিখতে পারি


$$\begin{aligned}
 \vec{AB} &= \vec{AO} + \vec{OB} \\
 &= -\vec{OA} + \vec{OB} \\
 &= \vec{OB} - \vec{OA} \\
 &= (\text{অঙ্গিম বিন্দু } B\text{-র অবস্থান ভেক্টর}) \\
 &\quad - (\text{আদি বিন্দু } A\text{-র অবস্থান ভেক্টর})
 \end{aligned}$$

### 2.4.18 ছেদ অনুপাত : (Section Ratio)

A ও B বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাকে m : n অনুপাতে বিভাজনকারী P বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় :

i) অঙ্গিমভাজন : কোন হিল বিন্দু O-র সাপেক্ষে দুটি বিন্দু A ও B-র অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  হলে যে কোন বিন্দু যা AB কে m : n অনুপাতে অঙ্গিমভজ্ঞ করে, তার অবস্থান ভেক্টর হবে  $\frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$

প্রমাণ :



চিত্র : 2.27

$$\text{প্রমানসারে দেওয়া আছে } \frac{AC}{CB} = \frac{m}{n} \text{ এবং } \vec{OA} = \vec{m}, \vec{OB} = \vec{b}$$

$$\text{বা } n \vec{AC} = m \vec{CB}$$

$$\text{বা } n \vec{AC} = m \vec{CB} \quad [\text{কারণ } \vec{AC} \text{ ও } \vec{CB} \text{ ভেক্টরের দিক ও অভিদিশা এক}]$$

এবার আপনারা  $\vec{AC}$  ও  $\vec{CB}$  ভেক্টরকে অবস্থান ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারেন। অর্থাৎ


$$n(\vec{OC} - \vec{OA}) = m(\vec{OB} - \vec{OC})$$

$$\text{বা } (n+m)\vec{OC} = m\vec{OB} + n\vec{OA}$$

$$\text{বা } \vec{OC} = \frac{m\vec{OB} + n\vec{OA}}{m+n} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$$

i) বহির্বিভাজন :

কোন হিল বিন্দু O-র সাপেক্ষে দুটি বিন্দু A ও B-র অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  হলে যে কোন বিন্দু C যা AB কে m : n অনুপাতে বহির্বিভাজন করে, তার অবস্থান ভেক্টর হবে  $\frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$



চিত্র : 2.28

প্রমাণ : দেওয়া আছে  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$  এবং

$$\frac{AC}{BC} = \frac{m}{n}$$

$$\text{বা } n \vec{AC} = m \vec{BC}$$

$$\text{বা } n \vec{AC} = m \vec{BC}$$

$$\text{বা } n(\vec{OC} - \vec{OA}) = m(\vec{OC} - \vec{OB})$$

$$\text{বা } \vec{OC} = \frac{m\vec{OB} - n\vec{OA}}{m-n} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$$

মন্তব্য : এখানে C যদি AB-র মধ্য বিন্দু হয় তবে  $AC : CB = 1 : 1$  সূতরাং মধ্য বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের  $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$  যেখানে A ও B-র অবস্থান ভেট্টের যথাক্রমে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ .


#### 2.4.19 উপপাদ্য 5 : তিনটি বিন্দু সমরেখ হবার শর্ত

A, B, C তিনটি বিন্দু, এদের অবস্থান ভেট্টের একটি হিল বিন্দু O-র সাপেক্ষে যথাক্রমে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ । বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থান করবে তার প্রয়োজনীয় (necessary) এবং যথেষ্ট (Sufficient) শর্ত হচ্ছে

$$x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c} = 0 \longrightarrow (1) \text{ এবং}$$

$x + y + z = 0 \longrightarrow (2)$  যেখানে x, y, z প্রত্যেকেই শূন্যমান নয় এমন তিনটি ক্ষেপার অর্থাৎ  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ .

প্রমাণ : প্রয়োজনীয় শর্ত :



চিত্র : 2.29

তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে প্রমাণ করতে হবে সমীকরণ (1) ও (2) সিদ্ধ হয়। ধরি A, B, C বিন্দু তিনটি সমরেখ। অবশ্যই একটি বিন্দু অপর দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশকে অঙ্গীভূত করবে। ধরি C বিন্দু AB কে m : n অনুপাতে অঙ্গীভূত করেছে। অতএব

$$\frac{AC}{CB} = \frac{m}{n}$$

বা  $n \vec{AC} = m \vec{CB}$

বা  $\vec{n} \vec{AC} = \vec{m} \vec{CB}$

বা  $n(\vec{OC} - \vec{OA}) = m(\vec{OB} - \vec{OC})$

বা  $n(\vec{c} - \vec{a}) = m(\vec{b} - \vec{c})$

বা  $-n\vec{a} - m\vec{b} + \vec{c}(n+m) = 0 \longrightarrow (3)$

এখন ধরি  $-n = x, -m = y$  এবং  $n+m = z$ , তাহলে (3) নঁ সমীকরণ থেকে লেখা যায়  $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = 0$ , সূতরাঁ প্রয়োজনীয় শর্ত প্রমাণিত হল।

যথেষ্ট শর্ত :

যদি সমীকরণ (1) ও (2) সিদ্ধ হয় তবে প্রমাণ করতে হবে  $A, B, C$  সমরেখ। এখন যেহেতু  $x, y, z$  প্রত্যেকেই শূন্যমান নয় ধরি  $z \neq 0$ । সূতরাঁ  $x + y + z = 0$  হতে পাই  $x + y = -z \neq 0 \longrightarrow (4)$

আবার  $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = 0$  হতে পাই  $z\vec{c} = -(x\vec{a} + y\vec{b})$

অতএব  $\vec{c} = \frac{-(x\vec{a} + y\vec{b})}{z}$

$$= \frac{x\vec{a} + y\vec{b}}{x+y} \quad [\text{সমীকরণ (4) এর সাহায্যে}]$$

সূতরাঁ  $C$  বিন্দুটি  $A$  ও  $B$  বিন্দু দুটির সংযোগকারী সরলরেখাকে  $y : x$  অনুপাতে অঙ্গীকৃত করেছে। অর্থাৎ  $A, B, C$  সমরেখ। সূতরাঁ যথেষ্ট শর্তটি প্রমাণিত হল।

#### 2.4.20 উপপাদ্য 6 : চারটি বিন্দু সমতলীয় হওয়ার শর্ত

$A, B, C, D$  এমন চারটি বিন্দু যে এদের মধ্যে কোন তিনটি বিন্দু একই সরলরেখার উপর অবস্থিত নয় এবং একটি ছির বিন্দুর সাপেক্ষে এদের অবস্থান ভেক্টর ঘথাক্রমে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ । বিন্দু চারটি একই সমতলে অবস্থান করবে তার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হল

$$x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} + w\vec{d} = 0 \longrightarrow (1)$$

এবং  $x + y + z + w = 0 \longrightarrow (2)$  যেখানে  $x, y, z, w$  প্রত্যেকেই শূন্যমান নয় এমন চারটি ক্ষেত্রের অর্থাৎ  $(x, y, z, w) \neq (0, 0, 0, 0)$

প্রমাণ : প্রয়োজনীয় শর্ত : মনে করি  $A, B, C, D$  এই চারটি বিন্দু একই সমতলে আছে কিন্তু এদের কোন তিনটি বিন্দু একই সরলরেখার উপর অবস্থিত নয়। সূতরাঁ চারটি বিন্দু থেকে দুটি বিন্দু নেওয়া যেতে পারে যাদের সংযোগকারী সরলরেখা অপর দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাকে অঙ্গীকৃত করে।

ধরি AB রেখা CD সরলরেখাকে P বিন্দু  $p : q$  অনুপাতে অস্তর্বিভক্ত করে অর্থাৎ  $\frac{CP}{PD} = \frac{p}{q}$  এবং P বিন্দু AB

রেখাকে  $m : n$  অনুপাতে অস্তর্বিভক্ত করে। অর্থাৎ  $\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$  যদি P বিন্দুর অবস্থান ডেক্টর ট' হয় তবে

$$\vec{r} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n} = \frac{p\vec{d} + q\vec{c}}{p+q}$$

যা  $\frac{n}{m+n}\vec{a} + \frac{m}{m+n}\vec{b} + \left(-\frac{q}{p+q}\right)\vec{c} + \left(-\frac{p}{p+q}\right)\vec{d} = 0 \longrightarrow (3)$

এখন ধরি  $\frac{n}{m+n} = x, \frac{m}{m+n} = y, -\frac{q}{p+q} = z$  এবং  $-\frac{p}{p+q} = \omega$

অতএব সমীকরণ (3) থেকে লেখা যায়

$$x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} + \omega\vec{d} = 0 \text{ এবং } x + y + z + \omega = 0$$

সূতরাং প্রযোজনীয় শর্ত প্রমাণিত হল।

যথেষ্ট শর্ত: যদি সমীকরণ (1) ও (2) সিদ্ধ হয় তবে প্রমাণ করতে হবে A, B, C, D বিন্দু চারটি সমতলীয়। এখানে যেহেতু  $x, y, z, \omega$  ক্ষেত্রের মধ্যে কমপক্ষে একটি শূন্যমান নয়, সূতরাং  $x+y, x+z, x+\omega$ -র মধ্যে কমপক্ষে একটি শূন্যমান নয়। কারণ এরা প্রতিটি শূন্য হলে  $x = y = z = \omega = 0$  হতে পারে।

অতএব ধরা যাক  $x+y \neq 0$  এখানে সমীকরণ (2) থেকে লেখা যায়

$$z+\omega = -(x+y), \neq 0 \longrightarrow (4)$$

এখন সমীকরণ (1) থেকে লেখা যায়

$$x\vec{a} + y\vec{b} = -(z\vec{c} + \omega\vec{d})$$


যা  $\frac{x\vec{a} + y\vec{b}}{x+y} = \frac{-(z\vec{c} + \omega\vec{d})}{x+y} = \frac{-z\vec{c} + \omega\vec{d}}{-z+w} = \frac{-z\vec{c} + \omega\vec{d}}{-z+w} \longrightarrow (5)$

[সমীকরণ (4) এর সাহায্যে]

এখানে লক্ষণীয়  $\frac{x\vec{a} + y\vec{b}}{x+y}$  ডেক্টরটি A ও B বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার উপর অবস্থিত একটি বিন্দুর অবস্থান ডেক্টর এবং  $\frac{z\vec{c} + \omega\vec{d}}{z+\omega}$  ডেক্টরটি C ও D-র সংযোজক সরলরেখার উপর অবস্থিত একটি বিন্দুর অবস্থান ডেক্টর। কিন্তু সমীকরণ (5) থেকে আপনারা নিচয়ই বুঝতে পারছেন বিন্দু দুটি একই বিন্দু নির্দেশ করে। অতএব AB ও CD সরলরেখাদ্বয় একই তলে অবস্থিত। অর্থাৎ A, B, C, D বিন্দু চারটি সমতলীয়। অতএব যথেষ্ট শর্ত প্রমাণিত হল।

#### 2.4.21 একটি ডেক্টরের তিনটি প্রস্তর লম্ব উপাধিশের সাপেক্ষে প্রকাশ (Vectors in terms of its resolved parts along three mutually perpendicular direction)

2.30 নং চিত্রে O বিন্দুগামী তিনটি প্রস্তর লম্ব সরলরেখা ox, oy, oz নেওয়া হল। এবার আপনারা ox,



চিত্র : 2.30

oy, oz রেখা বরাবর একক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যথাক্রমে তিনটি ভেট্টার  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  ধরুন। এই ত্রিমাত্রিক দেশে P যে কোন একটি বিন্দু, যার স্থানাঙ্ক ( $x, y, z$ )। তাহলে P বিন্দুর অবস্থান ভেট্টার মূল বিন্দু O-র সাপেক্ষে  $\vec{OP}$ । এবার P বিন্দু থেকে xoy তলের উপর PM লম্ব অঙ্কন করা হল। M কে পাদ বিন্দু বলা হবে। MN রেখা অঙ্কন করা হল যাতে MN, ox-র সঙ্গে সমান্তরাল হয়। তাহলে  $ON = y$ ,  $NM = x$  এবং  $PM = z$  হবে।

তিচুজ OMP থেকে আপনারা লিখতে পারেন  $\vec{OP} = \vec{OM} + \vec{MP}$

আবার  $\triangle OMN$  থেকে লেখা যায়  $\vec{OM} = \vec{ON} + \vec{NM}$

সূত্রাঃ  $\vec{OP} = \vec{ON} + \vec{NM} + \vec{MP} = \vec{ON} + \vec{OM}' + \vec{OP}' \longrightarrow (1)$

এখন ox রেখায়  $\vec{OM}'$ , ভেট্টার বরাবর  $\vec{i}$  একক ভেট্টার।

$$\text{সূত্রাঃ একক ভেট্টারের সংজ্ঞা অনুযায়ী } \vec{i} = \frac{\vec{OM}'}{|\vec{OM}'|} = \frac{\vec{OM}'}{x} \therefore \vec{OM}' = x \vec{i}$$

$$\text{অনুরূপে } \vec{j} = \frac{\vec{ON}}{|\vec{ON}|} = \frac{\vec{ON}}{y} \therefore \vec{ON} = y \vec{j}$$

$$\text{এবং } \vec{k} = \frac{\vec{OP}'}{|\vec{OP}'|} = \frac{\vec{OP}'}{z} \therefore \vec{OP}' = z \vec{k}$$

সূতরাং  $\vec{OP} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$  এবং  $\vec{OP}$  ভেক্টরের মাপাঙ্ক অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য

$$= \left| \vec{OP} \right| = |x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ হবে}$$

অতএব  $p(x, y, z)$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  $\vec{OP}$  কে লেখা যায়

$$\vec{OP} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}, \text{ যার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে } \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

2.4.22 সূটি বিন্দুর  $P$  ও  $Q$ -র স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x_1, y_1, z_1)$  ও  $(x_2, y_2, z_2)$  হলে

$$\vec{PQ} = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

$$\text{প্রমাণ : এখানে } \vec{OP} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}, \vec{OQ} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

$$\text{আপনাদের জানা আছে } \vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

মন্তব্য : i)  $\vec{OP}$  ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর হবে

$$\frac{\vec{OP}}{\left| \vec{OP} \right|} = \frac{x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

ii)  $\vec{PQ}$  ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর হবে

$$\frac{\vec{PQ}}{\left| \vec{PQ} \right|} = \frac{(x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}$$

iii)  $\vec{OP}$  ভেক্টরকে  $(x, y, z)$  স্থানাঙ্ক ধারাও প্রকাশ করা যায়

iv) এখানে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  যথাক্রমে তিনটি একক ভেক্টর  $ox, oy, oz$  অক্ষ বরাবর অর্থাৎ এরা পরম্পরাগত এবং অসমতলীয় ভেক্টর।

উদাহরণমালা

উদা : 6. ভেক্টর  $\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}, 2\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}, 3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$  রৈখিক সম্ভিযুক্ত হবে কি?

সমাধান : প্রদত্ত ভেক্টর তিনটি রৈখিক সম্ভব্যুক্ত হবে যদি

$$x(\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}) + y(2\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}) + z(3\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}) = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$$

সম্ভব্য সিদ্ধ হয় যেখানে  $x, y, z$  এমন তিনটি ক্ষেত্রের রাশি যাদের সবার মান শূন্য নয়। সমীকরণ (1) থেকে লেখা যায়

$$\vec{i}(x + 2y + 3z) + \vec{j}(-3x - 4y - 2z) + \vec{k}(2x - 4y - z) = 0$$

যেহেতু  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  ভেক্টরগুলি অসমতলীয় অতএব

$$x + 2y + 3z = 0 \quad \dots \dots \dots (2)$$

$$-3x - 4y - 2z = 0 \quad \dots \dots \dots (3)$$

$$2x - 4y - z = 0 \quad \dots \dots \dots (4)$$

এখন (2) ও (3) নঁ সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$\frac{x}{8} = \frac{7}{-7} = \frac{z}{2} = k' \quad (\text{ধরি})$$

(4) নঁ সমীকরণে  $x = 8k', y = -7k', z = 2k'$  বসিয়ে পাই,

$$(16 + 28 - 2)k' = 0$$

$$\therefore k' = 0$$

$$\therefore x = y = z = 0$$

অতএব প্রদত্ত ভেক্টরগুলি রৈখিক সম্ভব্যুক্ত ভেক্টর হবে না।

উদা : 7 অবস্থা কর্মন চারটি বিন্দু  $A, B, C, D$  সমতলীয় যাদের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $-6\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$ ,

$$3\vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}, 5\vec{a} + 7\vec{b} + 3\vec{c}$$
 এবং  $-13\vec{a} + 17\vec{b} - \vec{c}$

সমাধান : O বিন্দুকে হিয়াবিন্দু ধরে লেখা যায়

$$\vec{OA} = -6\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$$

$$\vec{OB} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + 4\vec{c}$$

$$\vec{OC} = 5\vec{a} + 7\vec{b} + 3\vec{c}$$

$$\vec{OD} = -13\vec{a} + 17\vec{b} - \vec{c}$$

$$\text{অতএব } \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 9\vec{a} - 5\vec{b} + 2\vec{c}$$

$$\text{অনুরূপ } \vec{AC} = 11\vec{a} + 4\vec{b} + \vec{c}$$

$$\vec{AD} = -7\vec{a} + 14\vec{b} - 3\vec{c}$$

এখন আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{AB} - 2\vec{AC} = -13\vec{a} - 13\vec{b}$$

$$\vec{AD} + 3\vec{AC} = 26\vec{a} + 26\vec{b} = -2(-13\vec{a} - 13\vec{b})$$

$$\Rightarrow \vec{AD} + 3\vec{AC} = -2(\vec{AB} - 2\vec{AC})$$

$$\text{বা } \vec{AD} = -2\vec{AB} + \vec{AC}$$

অতএব  $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$  ভেক্টরগুলি সমতলীয়। উপরস্থি তিনটি ভেক্টরের আদি বিন্দু A।

$\therefore A, B, C, D$  সমতলীয়।

উদা : 8 নিম্নের ভেক্টরগুলির মডিউলাস এবং তাদের যোগফলের মডিউলাস কত?

$$2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}, 2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k}$$

সমাধান : তিনটি প্রদত্ত ভেক্টরের মডিউলাস যথাক্রমে

$$|2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}|, |\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}| \text{ এবং } |2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k}|$$

$$\text{অর্থাৎ } \sqrt{14}, \sqrt{6} \text{ এবং } \sqrt{29}$$

$$\text{তিনটি ভেক্টরের যোগফল } 5\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\therefore \text{মডিউলাস} = \sqrt{43}$$

উদা : 9 প্রমাণ করুন  $A, B, C$  বিন্দু তিনটি সমরেখীয় যাদের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $-2\vec{a} + 3\vec{b} + 5\vec{c}$ ,  $\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}, 7\vec{a} - \vec{c}$

সমাধান : O বিন্দুকে হিসেবে বিন্দু ধরে লেখা যায়

$$\vec{OA} = -2\vec{a} + 3\vec{b} + 5\vec{c}$$

$$\vec{OB} = \vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c}$$

$$\vec{OC} = 7\vec{a} - \vec{c}$$

$$\therefore \vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 3\vec{a} - \vec{b} - 2\vec{c}, \vec{AC} = 9\vec{a} - 3\vec{b} - 6\vec{c} = 3(3\vec{a} - \vec{b} - 2\vec{c}) = 3\vec{AB}$$

$\therefore \vec{AC}$  ও  $\vec{AB}$  ভেক্টর সমরেখীয়। এখানে  $\vec{AC}$  ও  $\vec{AB}$  ভেক্টর দ্বয়ের আদি বিন্দু A.

$\therefore A, B, C$  সমরেখীয়।

উদা : 10 প্রমাণ করুন তিনটি বিন্দু A, B, C যাদের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $2\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$ ,  $4\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}$  এবং  $3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$ , একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করে।

সমাধান : O বিন্দুকে ছির বিন্দু ধরে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{OA} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{OB} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{OC} = 3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = 2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{BC} = -\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{CA} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে দেখা যাচ্ছে } \vec{BC} + \vec{CA} &= -2\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k} \\ &= -(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})\end{aligned}$$

$$= -\vec{AB} = \vec{BA}$$

অর্থাৎ ত্রিভুজ সূত্র থেকে আপনারা বলতে পারেন A, B, C একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। এখানে  $\vec{AB}$ ,  $\vec{BC}$ , এবং  $\vec{CA}$  ভেক্টরের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে


$$|\vec{AB}| = 3, |\vec{BC}| = 3\sqrt{2}, |\vec{CA}| = 3$$

যেহেতু  $AB = AC$   $\therefore ABC$  ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু

আবার  $BC^2 = AB^2 + CA^2$   $\therefore \angle A = 90^\circ$ .  $\therefore ABC$  সমকোণী ত্রিভুজও হবে।

উদা : 11 প্রমাণ করুন ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটি সমবিন্দুগামী।

সমাধান : ধরি ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B, C-র অবস্থান ভেক্টরে কোন স্থিতির বিন্দু O-র সাপেক্ষে যথাক্রমে  
ঝ, ট, টে, এখন D, E, F যথাক্রমে BC, CA ও AB-র মধ্যবিন্দু হলে



চিত্র : 2.31

$$D\text{-র অবস্থান ভেক্টর} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}$$

$$E\text{-র অবস্থান ভেক্টর} = \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2}$$


$$F\text{-র অবস্থান ভেক্টর} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$$

এখানে প্রমাণ করতে হবে তিনটি মধ্যমা AD, BE ও CF সমবিন্দুগামী। AD-র উপর G একটি বিন্দু নেওয়া হল যা AD-কে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে; অর্থাৎ AG : GD = 2 : 1। অতএব G-র অবস্থান ভেক্টর =

$$\frac{2 \cdot \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} + 1 \cdot \vec{a}}{2+1} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}, \text{ এটি } \text{ঝ, } \text{ট, } \text{টে-র একটি প্রতিসম প্রকাশ (symmetrical form)!}$$

G-র এই প্রতিসম প্রকাশ থেকে বলা যেতে পারে G-র বিন্দুটি অপর দুটি মধ্যমা BE ও CF-র উপরও আছে।  
সূতরাং মধ্যমা তিনটি সমবিন্দুগামী।

উদাঃ 12 প্রমাণ করুন যে কোন ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুবয় সংযোজক সরলরেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও  
এর দৈর্ঘ্য তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান



চিত্র : 2.32

সমাধান :

ABC ত্রিভুজের D ও E যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু। সূতরাং D ও E বিন্দু দুটির অবস্থান ভেক্টর  
O বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে

$$\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}, \frac{\vec{a} + \vec{c}}{2}। \text{ এখানে } \vec{DE} = \vec{OE} - \vec{OD} = \frac{\vec{c} - \vec{b}}{2}$$

$$\text{আবার } \vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB} = \vec{c} - \vec{b}$$

$$\therefore \vec{DE} = \frac{1}{2} \vec{BC} \quad \text{অতএব } \vec{DE} \parallel \vec{BC}$$

$$\text{এবং } |\vec{DE}| = \frac{1}{2} |\vec{BC}| \quad \text{অর্থাৎ } DE = \frac{1}{2} BC$$

উদা : 13 প্রমাণ করুন  $(2, 4, 10)$  ও  $(3, 6, 15)$  ভেক্টর দুটি রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত।

সমাধান : ধরি  $x$  ও  $y$  এমন দুটি স্কেলার যাতে

$$x \vec{a} + y \vec{b} = 0 \text{ হয় } \text{যেখানে } \vec{a} = (2, 4, 10) \text{ ও } \vec{b} = (3, 6, 15)$$

$$\text{বা } x(2, 4, 10) + y(3, 6, 15) = 0$$

$$\text{বা } (2x + 3y, 4x + 6y, 10x + 15y) = \vec{0} = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow 2x + 3y = 0$$

$$4x + 6y = 0$$

$$10x + 15y = 0$$

এই সমীকরণগুলি  $x = 3, 3y = -2$  মানের জন্য সিদ্ধ হয়।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি মান শূন্য নয়।

$$\therefore \text{লেখা যেতে পারে } 3 \vec{a} - 2 \vec{b} = 0$$

অতএব প্রদত্ত ভেক্টর দুটি রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত।

অনুশীলনী :

অনু : 9 i)  $4\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  ভেক্টরের সদিক যুক্ত একক ভেক্টর নির্ণয় করুন।

ii) এমন একটি একক ভেক্টর বার করুন যা  $4\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$  এবং  $2\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}$  ভেক্টরদ্বয়ের যোগফলের সমান্তরাল হয়।

অনু : 10 প্রমাণ করুন  $\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{i} - 7\vec{j} - 8\vec{k}$  ও  $2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$  ভেক্টর তিনটি রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত।

অনু : 11 প্রমাণ করুন  $\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{b} = (2, -1, 4), \vec{c} = (-1, 8, 1)$  পরম্পর রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত ভেক্টর।

অনু : 12 প্রমাণ করুন চারটি বিন্দু যাদের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, 5\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, -\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c}, \vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c}$  সমতলীয়।

অনু : 13 যদি  $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$  হয় তবে  $|\vec{a} + \vec{b}|$ -র মান কত?

অনু : 14 ABCD একটি চতুর্ভুজ এবং P, Q, R, S যথাক্রমে AB, BC, CD, DA বাহুর মধ্য বিন্দু হলে প্রমাণ করুন PQRS একটি সামান্তরিক।

অনু : 15 কোন ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন যার শীর্ষ বিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}, 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}, 4\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ .

## 2.5 সারাংশ :

এই একক পঠনের পর আপনারা যা জানতে পেরেছেন তা নিম্নে সংক্ষেপে লেখা হল :

1. যে রাশির মান ও দিক দুই আছে তাকে ভেট্টর রাশি বলে এবং যার শুধু মান আছে তাকে ক্ষেলার রাশি বলে।
2. ভেট্টরকে আমরা দিষ্ট রেখাংশ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি।
3. দুই বা ততোধিক ভেট্টরকে ত্রিভুজ সূত্র বা সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী যোগ করা যেতে পারে।
4. ভেট্টরের যোগ প্রক্রিয়া ও ক্ষেলার দ্বারা গুণনের ধর্ম।
5. যদি  $\vec{r} = x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c}$  ————— সমন্বিত সিদ্ধ হয় তবে  $\vec{r}$  ভেট্টরকে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  ————— ভেট্টরের রৈখিক সমবায় বলা যেতে পারে যেখানে  $x, y, z$ , ————— ক্ষেলার রাশি।
6. i) দুটি ভেট্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  রৈখিক সম্বন্ধহীন হলে  
 $x \vec{a} + y \vec{b} = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$   
 এবং রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত হলে  $x \vec{a} + y \vec{b} = 0 \Rightarrow (x, y) \neq (0, 0)$
- ii) যদি তিনটি ভেট্টর  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  রৈখিক সম্বন্ধহীন হয় তবে  
 $x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c} = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0, z = 0$   
 এবং রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত হলে  $x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c} = 0 \Rightarrow (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$   
 দুটো সমরেখ ভেট্টর রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত হবে।  
 তিনটি সমতলীয় ভেট্টর পরম্পর রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত হবে।  
 যে কোন চারটি ভেট্টর দিয়ে গঠিত সেট সর্বদা রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত হবে।
7. i) কোন ভেট্টর  $\vec{r}$  যদি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেট্টরের সঙ্গে সমতলীয় হয় তবে  $\vec{r} = x \vec{a} + y \vec{b}$  হবে যেখানে  $x$  ও  $y$  দুটি ক্ষেলার।  
 ii) যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  ভেট্টরগুলি অসমতলীয় হয় তবে যে কোন ভেট্টর  $\vec{r}$  কে লেখা যায়  $\vec{r} = x \vec{a} + y \vec{b} + z \vec{c}$ , যেখানে  $x, y, z$  ক্ষেলার।
8. কোন রৈখিক সম্বন্ধহীন ভেট্টরের সেটকে নির্ধান বলে (base) যদি যে কোন একটি প্রদত্ত ভেট্টরকে এই সেটের ভেট্টরগুলির রৈখিক সমবায়ে প্রকাশ করা যায়।

অর্থাৎ  $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$  হলে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  নির্ধারণের সাপেক্ষে এখানে  $(x, y, z)$   $\vec{r}$ -ভেক্টরের স্থানাঙ্ক নির্দেশ করে।

9. কোন হিল বিন্দু O-র সাপেক্ষে A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  হলে কোন বিন্দু যা AB কে অনুরীভূত (বা বিহিন্নভূত) করে m:n অনুপাতে তার অবস্থান ভেক্টর হবে  $\frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$  বা  $\frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n}$ .
10. তিনটি বিন্দু সমরেখ হবার শর্ত।
11. চারটি বিন্দু সমতলীয় হবার শর্ত।
12. যে কোন ভেক্টর  $\vec{P}$  কে আমরা প্রকাশ করতে পারি  

$$\vec{P} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \text{ যেখানে } \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \text{ একক ভেক্টর যথাক্রমে } ox, oy, oz \text{ অক্ষ বরাবর।}$$

## 2.6 বিবিধ প্রশ্নমালা :

- প্রশ্ন : 1. ABCD সামন্তরিকের কর্ণ দুটি P বিন্দুতে ছেদ করে এবং O-যে কোন একটি বিন্দু হলে প্রমাণ করুন  

$$\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 4\vec{OP}$$
- প্রশ্ন : 2. প্রমাণ করুন যে কোন চতুর্ভুজকের (tetrahedron) শীর্ষবিন্দু এবং তার বিপরীত তলের ভর কেন্দ্র সংযোগকারী সরলরেখাগুলি এক বিন্দুতে মিলিত হয়।
- প্রশ্ন : 3. OAC ত্রিভুজের B বিন্দু AC বাহুর মধ্যবিন্দু হলে  $\vec{OC}$ -র কোন মানটি সঠিক হবে? i)  $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$ , ii)  $2\vec{b} - 2\vec{a}$ , iii)  $2\vec{b} - \vec{a}$ , যেখানে  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$
- প্রশ্ন : 4. ABCD এমন একটি চতুর্ভুজ যার BC বাহু AD বাহুর সমান্তরাল এবং  $BC:AD = 4:7$ । যদি  $\vec{AB} = \vec{a}$  এবং  $\vec{AD} = 7\vec{b}$  হয় তবে  $\vec{BC}, \vec{AC}, \vec{BD}, \vec{DC}$  ও  $\vec{AE}$  ভেক্টরের মান বার করুন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টর দ্বারা যেখানে E বিন্দু BD-র উপর এমন একটি বিন্দু যাতে  $BE = \frac{4}{11}BD$  হয়।
- প্রশ্ন : 5.  $2\vec{P} - 2\vec{V} + 4\vec{G}$  ভেক্টরের স্থানাঙ্ক বার করুন যেখানে ভেক্টর  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  একটি বিধান গঠন করে এবং  $\vec{P} = 2\vec{b} + 3\vec{c}, \vec{V} = -2\vec{a} + \vec{c}, \vec{G} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$  হয়।
- প্রশ্ন : 6.  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  নির্ধারণের সাপেক্ষে দেখান  $\vec{a} + \vec{b}, -\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} + \vec{c} + \vec{b}$  একটি বিধান গঠন করে।
- প্রশ্ন : 7. প্রমাণ করুন  $(-2, 3, 5), (1, 2, 3)$  ও  $(7, 0, -1)$  ভেক্টরগুলি সমরেখ।
- প্রশ্ন : 8. নিম্নের ভেক্টরগুলি সমতলীয় কিনা দেখান :
- i)  $5\vec{a} - 4\vec{b} + 4\vec{c}, 3\vec{a} + 8\vec{b} + 5\vec{c}, -3\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}, \vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$

ii)  $\vec{a} - 4\vec{b} + 4\vec{c}$ ,  $-\vec{a} - 2\vec{b} - 3\vec{c}$ ,  $\vec{a} + 2\vec{b} - 5\vec{c}$ ,  $-\vec{c}$

প্রশ্ন : 9.  $(2, -1, 0), (3, 2, 1), (4, 0, 5)$  ও  $(1, 2, -3)$  ভেক্টর চারটির যোগফল কত ?

প্রশ্ন : 10. প্রমাণ করুন ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু ভেক্টর  $\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{CA}$  যথাক্রমে  $2\vec{i} + 3\vec{j} - 6\vec{k}$ ,  $6\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ ,  $3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}$  হলে তা সমবাহু ত্রিভুজ।

প্রশ্ন : 11. নিম্নলিখিত বিন্দুগুলি যার অবস্থান ভেক্টর দেওয়া আছে তারা সমরেখ হবে কি ?

i)  $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$ ,  $2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$ ,  $-7\vec{b} + 10\vec{c}$

ii)  $5\vec{a} + 4\vec{b} + 2\vec{c}$ ,  $6\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$ ,  $7\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

iii)  $2\vec{a} + 5\vec{b} - 4\vec{c}$ ,  $\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{c}$ ,  $4\vec{a} + 7\vec{b} - 6\vec{c}$

iv)  $\vec{b} - 2\vec{c}$ ,  $\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}$ ,  $2\vec{a} + 5\vec{b} - 4\vec{c}$

প্রশ্ন : 12. প্রমাণ করুন  $2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ ,  $5\vec{i} + \vec{k}$ ,  $11\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$  বিন্দু তিনটি সমরেখীয়।

প্রশ্ন : 13. একটি সামন্তরিকের দুটি বাহু যথাক্রমে  $2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$ ,  $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$  হলে কর্ণের সদিক যুক্ত একক ভেক্টরের মান নির্ণয় করুন।

প্রশ্ন : 14. প্রমাণ করুন  $\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ ,  $\vec{b} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ ,  $\vec{c} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 6\vec{k}$  ভেক্টরগুলি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু এবং এমন একটি মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন যা  $\vec{c}$  ভেক্টরকে সমন্বিতভাবে করে।

প্রশ্ন : 15.  $\vec{i} + \vec{k}$ ,  $-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ ,  $3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  ভেক্টর তিনটি কি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু ভেক্টর হতে পারে ?

প্রশ্ন : 16. চারটি বিন্দু A, B, C, D-র অবস্থান ভেক্টর কোন স্থির বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে  $2\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}$ ,  $\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ ,  $4\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$  ও  $3\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$  হলে প্রমাণ করুন  $AB \parallel CD$  এবং  $ABCD$  একটি সামন্তরিক।


প্রশ্ন : 17. চারটি বিন্দু P, Q, R, S-র অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $2\vec{i} + 4\vec{k}$ ,  $5\vec{i} + 3\sqrt{3}\vec{j} + 4\vec{k}$ ,  $-2\sqrt{3}\vec{j} + \vec{k}$ ,  $2\vec{i} + \vec{k}$  হলে প্রমাণ করুন  $PQ \parallel RS$  এবং  $RS = \frac{2}{3} PQ$ .

প্রশ্ন : 18. ABCD একটি চতুর্ভুলক, E ও F বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে BC ও AD বাহুর মধ্যবিন্দু।  $AB \parallel DC$  হলে প্রমাণ করুন  $FE \parallel AB$  এবং  $FE = \frac{1}{2} (AB + DC)$

## 2.7 সমাধান/উপরমালা

অনুশীলনীর সমাধান :

অনু : 1.



ণিঃ 2.33

$$\text{উপরের চিত্র হতে ধরি } \overrightarrow{AB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{b}$$

সূতরাং  $\overrightarrow{ED} = \vec{a}$  এবং  $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{BC}$  [ যেহেতু  $AB \parallel ED$  এবং উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান এবং  $BC \parallel EF$  এবং উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান। ]

$$\text{এখন } \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\text{আবার } \overrightarrow{AD} = 2 \overrightarrow{BC} = 2 \vec{b} \quad [\text{যেহেতু } AD \parallel BC \text{ এবং } AD\text{-র দৈর্ঘ্য } BC\text{-র দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ}]$$

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$$

$$\therefore \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = 2 \vec{b} - (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{b} - \vec{a}$$

$$\overrightarrow{FA} = -\overrightarrow{CD} = \vec{a} - \vec{b} \quad [\text{যেহেতু } \overrightarrow{FA} \text{ ও } \overrightarrow{CD} \text{ দুটি সমান অথচ বিপরীত দিক যুক্ত ভেক্টর।}]$$

$$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{a}$$

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{b} = \vec{b} - 2\vec{a}$$

$$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{BC} = -\vec{b}$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = 2\vec{b} - \vec{a}$$

$$\text{অনু : 2} \quad \text{এখানে লেখা যায় } \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OD} \quad (\text{যেহেতু } D, BC\text{-র মধ্যবিন্দু})$$

$$\text{অনুরূপে } \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OE}$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OF}$$

এবার উপরের সমীকরণগুলি যোগ করলেই যা প্রমাণ করতে দেওয়া আছে তা পেয়ে যাবেন।

অনু : 3 ABC ত্রিভুজের  $\vec{BC} = \vec{a}$ ,  $\vec{CA} = \vec{b}$ ,  $\vec{AB} = \vec{c}$

ত্রিভুজসূত্র থেকে লেখা যায়  $\vec{BA} = \vec{BC} + \vec{CA}$  বা  $-\vec{AB} = \vec{BC} + \vec{CA}$

$$\therefore \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

অনু : 4 ত্রিভুজ সূত্র থেকে  $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD}$ ,  $\vec{BE} = \vec{BC} + \vec{CE}$ ,  $\vec{CF} = \vec{CA} + \vec{AF}$

এই সমীকরণগুলি যোগ করে অনু : 3 -এর সাহায্যে প্রমাণ করুন।

অনু : 5 উক্তর :  $\vec{OM} = \frac{1}{2} (\vec{OA} + \vec{OB})$

অনু : 6 উক্তর : সমতলীয়, উদা : 4-এর সাহায্য নিন

অনু : 7  $\vec{P} = x\vec{a} + y\vec{b} - z\vec{c}$ , ধরি  $\vec{P}' = x'\vec{a} + y'(\vec{a} + \vec{b}) + z'(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$

$$= (x' + y')\vec{a} + (y' + z')\vec{b} + z'\vec{c}$$

কিন্তু আপনাদের জানা আছে  $\vec{P}'$ -র রৈখিক সমবায় প্রকাশ  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ -র সাপেক্ষে অনন্য। সুতরাং  $x = x' + y' + z'$ ,  $y = y' + z'$ ,  $z = z'$

$$\Rightarrow z = z', y' = y - z, x' = x - y$$

সুতরাং  $x - y$ ,  $y - z$  ও  $z$  হল  $\vec{P}'$ -ভেট্টরের স্থানাঙ্ক নতুন নিখান  $\vec{a}$ ,  $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ -র সাপেক্ষে।

অনু : 8  $3\vec{P} - \vec{V} + \vec{W} = 3(\vec{a} + \vec{c}) - (\vec{b} + \vec{c}) + (\vec{a} - \vec{b}) = 4\vec{a} - 2\vec{b} + 2\vec{c}$

$\therefore$  প্রয়োজনীয় স্থানাঙ্ক  $(4, -2, 2)$

অনু : 9 a) প্রয়োজনীয় একক ভেট্টর  $= \frac{4\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{4^2 + 1^2 (-1)^2}} = \frac{4\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}}{\sqrt{18}}$

b) যোগফল  $6\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$ ,  $\therefore$  প্রয়োজনীয় একক ভেট্টর  $= \frac{6\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{76}}$

অনু : 10 উদাহরণ 6-র মত হবে।

অনু : 11 ধরি  $\vec{a} + \lambda\vec{b} + \mu\vec{c} = 0 \quad \longrightarrow (1)$

$$\therefore (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + \lambda(2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}) + \mu(-\vec{i} + 8\vec{j} + \vec{k}) = 0$$

$$\text{বা } \vec{I} (1 + 2\lambda - \mu) + \vec{J} (2 - \lambda + 8\mu) + \vec{K} (3 + 4\lambda + \mu) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + 2\lambda - \mu = 0 \longrightarrow (2)$$

$$2 - \lambda + 8\mu = 0 \longrightarrow (3)$$

$$3 + 4\lambda + \mu = 0 \longrightarrow (4)$$

$$(2) \text{ ও } (3) \text{ সমীকরণ সমাধান করে পাই } \lambda = -\frac{2}{3}, \mu = -\frac{1}{3}$$

সমীকরণ (4)  $\lambda$  ও  $\mu$ -এর মান দ্বারা সিদ্ধ হয়।

$$\therefore \vec{a} - \frac{2}{3} \vec{b} + \frac{1}{3} \vec{c} = 0 \quad \therefore \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ রেখিক সমতলীয়},$$

যেহেতু সমীকরণ (1) সিদ্ধ হয় যেখানে  $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$

অনু : 12. উদাহরণ 7-র মত হবে। এই অনুশীলনীটি অন্য ভাবেও করা যেতে পারে,

$$\text{ধরি } \vec{OA} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{OB} = 5\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}, \vec{OC} = -\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c}, \vec{OD} = \vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c}$$

এখানে এই চারটি ভেক্টর সমতলীয় হবে যদি যে কোন একটিকে অপর তিনটির রেখিক সমবায়ে লেখা যায়।

$$\text{ধরি } \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = x(5\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}) + y(-\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c}) + z(\vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c}) \longrightarrow (1)$$

উভয় পক্ষ হতে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ -র সহগ তুলনা করে লেখা যায়

$$1 = 5x - y + z \longrightarrow (2)$$

$$1 = -x + 5y - z \longrightarrow (3)$$

$$1 = -x - y + 5z \longrightarrow (4)$$

$$(3) \text{ ও } (4) \text{ থেকে বিয়োগ করে পাওয়া যায় } y = z$$

$$(2) \text{ ও } (3) \text{ থেকে পাওয়া যায় } y = \frac{6}{20}$$

$$(4) \text{ থেকে পাওয়া যায় } x = \frac{4}{20}$$

$\therefore (1)$  নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \frac{4}{20} (5\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}) + \frac{6}{20} (-\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c}) + \frac{6}{20} (\vec{a} - \vec{b} + 5\vec{c})$$

সূতরাং  $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}, \vec{OD}$  ভেক্টরগুলি সমতলীয়। অপর পক্ষে A, B, C, D সমতলীয়।

অনু : 13 উত্তর :  $\sqrt{211}$

অনু : 14 ধরন A, B, C, D বিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ ,  $\vec{d}$

$\therefore$  P, Q, R, S বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}, \quad \overrightarrow{OQ} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}, \quad \overrightarrow{OR} = \frac{\vec{c} + \vec{d}}{2}, \quad \overrightarrow{OS} = \frac{\vec{d} + \vec{a}}{2}$$

$$\therefore \overrightarrow{PQ} = \frac{\vec{c} - \vec{a}}{2}, \quad \overrightarrow{SR} = \frac{\vec{c} - \vec{a}}{2} \quad \therefore \overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{SR} \text{ এবং } |\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{SR}|$$

$$\therefore \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{SR}$$

অনুরূপে প্রমাণ করা যায়  $QR \parallel PS$   $\therefore$  PQRS একটি সামান্তরিক।

অনু : 15 ধরন  $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ ,  $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}$ ,  $\overrightarrow{OC} = 4\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$

তা হলে  $AB = \sqrt{54}$ ,  $BC = \sqrt{27}$ ,  $CA = \sqrt{17}$  হবে

বিবিধ প্রশ্নমালার সমাধান :


প্রশ্ন : 1  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP}$  [ ত্রিভুজ OAP থেকে ]

$\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CP} = \overrightarrow{OP}$  [ ত্রিভুজ OCP থেকে ]

এদের যোগ করে লেখা যায়  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OP}$  [  $\therefore \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{PC}$  সামান্তরিকের কর্ণবয় পরম্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ]

অনুরূপে  $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = 2\overrightarrow{OP}$   $\therefore \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OP}$

প্রশ্ন : 2



চিত্র : 2.34

ABCD একটি চতুর্ভুলক। ধরি A, B, C, D-র অবস্থান যথাক্রমে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ ,  $\vec{d}$ । ত্রিভুজাকৃতি তল

BCD, CDA, DAB, ABC-র ভরকেন্দ্রের অবস্থান ভেঙ্গের যথাক্রমে  $\frac{\vec{b} + \vec{c} + \vec{d}}{3}$ ,  $\frac{\vec{c} + \vec{d} + \vec{a}}{3}$ ,  $\frac{\vec{d} + \vec{a} + \vec{b}}{3}$ ,  $\frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$ . এখানে  $G_1$ ,  $G_2$  যথাক্রমে BCD ও BAD তলের ভরকেন্দ্র। AG<sub>1</sub>-র উপর G এমন একটি বিন্দু যা AG<sub>1</sub> কে 3 : 1 অনুপাতে অঙ্গীর্ভূক্ত করে। সুতরাং G-র অবস্থান ভেঙ্গের  $\frac{3 \cdot \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d}) + 1, \vec{a}}{3+1} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}}{4}$ . এটি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ ,  $\vec{d}$ -র প্রতিসম প্রকাশ। সুতরাং বলা যেতে পারে G বিন্দুটি অপর তিনটি রেখার উপরও থাকবে।

প্রশ্ন : 3 উভয় :  $2\vec{b} - \vec{a}$

প্রশ্ন : 4  $\vec{BC} = \frac{4}{7}\vec{AD} = \frac{4}{7} \cdot 7\vec{b} = 4\vec{b}$

ABC ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

বা  $\vec{AC} = \vec{a} + 4\vec{b}$

ABD ত্রিভুজ থেকে লেখা যায়  $\vec{BA} + \vec{AD} = \vec{BD}$

বা  $\vec{BD} = -\vec{AB} + \vec{AD} = -\vec{a} + 7\vec{b}$

BDC ত্রিভুজ থেকে  $\vec{DB} + \vec{BC} = \vec{DC}$

বা  $\vec{DC} = \vec{a} - 3\vec{b}$

ABE ত্রিভুজ থেকে  $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{a} + \frac{4}{11}\vec{BD} = \frac{28}{11}\vec{b} + \frac{7}{11}\vec{a}$

প্রশ্ন : 5  $2\vec{p} - 2\vec{v} + 4\vec{w} = 2(2\vec{b} + 3\vec{c}) - 3(-2\vec{a} + \vec{c}) + 4(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) = 10\vec{a} + 0\vec{b} + 7\vec{c}$

$\therefore$  নির্ণয় স্থানাঙ্ক = (10, 0, 7)

প্রশ্ন : 6 ধরা যাক  $\ell(\vec{p} + \vec{q}) + m(-\vec{p} + \vec{q}) + n(\vec{p} + \vec{q} + \vec{w}) = 0$

$\Rightarrow \vec{p}(\ell - m + n) + \vec{q}(n) + \vec{q}(\ell + m + n) = 0$

যেহেতু  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$ ,  $\vec{q}$  একটি নির্ধান সুতরাং  $\ell - m + n = 0$ ,  $n = 0$ ,  $\ell + m + n = 0$

$\Rightarrow \ell = m = n = 0 \quad \therefore$  প্রমাণিত হল।

প্রশ্ন : 7 প্রদত্ত বিন্দু তিনটি সমরেখ হবে যদি

$x(-2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}) + y(\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + z(7\vec{i} - \vec{k}) = 0 \longrightarrow (1)$

এবং  $x + y + z = 0$ ,  $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$  সিদ্ধ হয়।

সমীকরণ (1) থেকে লেখা যায়  $\vec{I} (-2x + y + 7z) + \vec{J} (3x + 2y) + \vec{K} (5x + 3y - z) = 0$

যেহেতু  $\vec{I}$ ,  $\vec{J}$ ,  $\vec{K}$  সমতলীয় ভেট্টের নয় অতএব

$$-2x + y + 7z = 0 \quad \longrightarrow \quad (2)$$

$$3x + 2y = 0 \quad \longrightarrow \quad (3)$$

$$5x + 3y - z = 0 \quad \longrightarrow \quad (4)$$

সমীকরণ (3) থেকে  $x = \frac{2y}{3}$ . সমীকরণ (2) থেকে  $x$ -র মান বসিয়ে পাই  $\frac{2y}{3} + y + 7\left(\frac{2y}{3}\right) = -2z$

$$\therefore x = -\frac{2y}{3} = 2z = k' \text{ (ধরি) } k' \neq 0.$$

$\therefore$  এই সমীকরণগুলি উপরের মান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এবং  $x + y + z = 0$  সমীকরণটিও এই মান দ্বারা সিদ্ধ হয়। তিনটি ভেট্টের সমরেখীয়।

প্রশ্ন : 8. a) সমতলীয় b) অসমতলীয়।

প্রশ্ন : 9 উত্তর :  $10\vec{I} + 3\vec{J} + 3\vec{K}$  অথবা  $(10, 3, 3)$

প্রশ্ন : 10 উত্তর : প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 7 একক,

প্রশ্ন : 11 a) ধরি  $\vec{OA} = \vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$ ,  $\vec{OB} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$ ,  $\vec{OC} = 7\vec{b} - 10\vec{c}$

$$\therefore \vec{AB} = \vec{a} + 5\vec{b} - 7\vec{c}, \vec{AC} = -\vec{a} - 5\vec{b} + 7\vec{c}, \vec{BC} = -2\vec{a} - 10\vec{b} + 14\vec{c}$$

এখানে  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ . সুতরাং A, B, C সমরেখীয়

b) সমরেখীয় হবে না, c) সমরেখীয় হবে, d) সমরেখীয় হবে।

প্রশ্ন : 12 প্রশ্ন : 11-র মত করে করুন।

প্রশ্ন : 13 ধরি ABCD সামন্তরিকের  $\vec{AB} = 2\vec{I} + 4\vec{J} - 5\vec{K}$

$$\vec{BC} = \vec{I} + 2\vec{J} + 3\vec{K}$$

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC} = 3\vec{I} + 6\vec{J} - 2\vec{K} \quad \therefore \vec{AC} \text{ কর্ণের সদিক যুক্ত একক ভেট্টের হবে}$$

$$\frac{3\vec{I} + 6\vec{J} - 2\vec{K}}{\sqrt{49}}$$

$$\text{আবার } \vec{BD} = \vec{BA} + \vec{AD} = \vec{I} - 2\vec{J} + 8\vec{K} \quad \therefore \vec{BD} \text{ কর্ণের সদিক যুক্ত একক ভেট্টের}$$

$$\frac{\vec{r} - 2\vec{j} + 8\vec{k}}{\sqrt{69}}$$

প্রশ্ন : 14 এখানে  $\vec{b} + \vec{c} = \vec{r}$ , সূতরাং  $\vec{r}, \vec{b}, \vec{c}$  ভেক্টরগুলি একটি ত্রিভুজ গঠন করে। নির্ণয় ভেক্টরের দৈর্ঘ্য  $\sqrt{6}$

প্রশ্ন : 15 প্রদত্ত ভেক্টর তিনটি ত্রিভুজের বাহু ভেক্টর হবে না।

$$\text{ধরন } \vec{r} = \vec{i} + \vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}, \vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$$

$$\text{এখানে } \vec{r} + \vec{b} \neq \vec{c}, \vec{r} + \vec{c} \neq \vec{b}, \vec{b} + \vec{c} \neq \vec{r}$$

প্রশ্ন : 16  $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = -\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$

$$\vec{CD} = \vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k} \quad \therefore \vec{AB} \parallel \vec{CD} \text{ এবং } |\vec{AB}| = |\vec{CD}|$$

অনুরূপে দেখানো যায় অপর বাহু দুটিও সমান ও সমান্তরাল,

প্রশ্ন : 17 নিজেরা করুন।

প্রশ্ন : 18 ধরা যাক A ছাইর বিন্দুর সাপেক্ষে B ও D বিন্দুদ্বয়ের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{b}$  ও  $\vec{d}$ ।  
 $\therefore \vec{AB} = \vec{b}, \vec{AD} = \vec{d}$ . যেহেতু  $AB \parallel DC$ , সূতরাং  $\vec{DC} = t \vec{AB} = t \vec{b}$ ,  $\longrightarrow$  (1) t  
একটি স্কেলার।

C বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর A বিন্দুর সাপেক্ষে  $\vec{AC}$ , এখানে লেখা যায়  $\vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC} = \vec{d} + t \vec{b}$  E ও F-র অবস্থান ভেক্টর A-র সাপেক্ষে যথাক্রমে  $\frac{\vec{b} + \vec{d} + t\vec{b}}{2}$  ও  $\frac{\vec{d}}{2}$

$$\therefore \vec{FE} = \vec{FA} + \vec{AE}$$

$$= -\vec{AF} + \vec{AE}$$

$$= -\frac{\vec{d}}{2} + \frac{\vec{b} + \vec{d} + t\vec{b}}{2} = \frac{1}{2} (1+t) \vec{AB}$$

$$\therefore \vec{FE} \parallel \vec{AB} \text{ এবং } FE = \frac{1}{2} (1+t) AB$$

$$\text{আবার } DC = t AB$$

$$\therefore AB + DC = AB + t AB = (1+t) AB = 2 FE$$

---

## একক ৩ : ভেষ্টের গুণন

---

### গঠন

- 3.1 প্রস্তাবনা
- 3.2 উদ্দেশ্য
- 3.3 দুটি ভেষ্টের ক্ষেত্রের গুণফল ও আনুষঙ্গিক গুণাবলী, ক্ষেত্রের গুণফলের মৌলিক অসমতা সমূহ
- 3.4 দুটি ভেষ্টের ভেষ্টের গুণফল  
দক্ষিণাবর্ত প্রগালীর ব্যাখ্যা  
ভেষ্টের গুণফলের বিভিন্ন ধর্মাবলী
- 3.5 তিনি বা ততোধিক ভেষ্টের রাশির ক্ষেত্রের গুণফল এবং  
ভেষ্টের গুণফল
- 3.6 সারাংশ
- 3.7 বিবিধ প্রশ্নমালা
- 3.8 সমাধান / উত্তরমালা

### 3.1 প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে ভেট্টরের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তার বিভিন্ন দিক ও ধর্ম এবং যোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি, স্থিতিবিদ্যা ও গণিতের বিভিন্ন বিষয় সহজভাবে ও সংক্ষেপে জানার জন্য আপনাদের দুই বা ততোধিক ভেট্টরের গুণফল সম্বন্ধে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই এককে আমি ভেট্টরের গুণফল সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও প্রয়োগবিধি আলোচনা করব। আপনারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন ভেট্টরের প্রয়োগ বিধির ক্ষেত্রে ভেট্টরের গুণনের ধারণার প্রয়োজন অবশ্যিক্ত।

### 3.2 উদ্দেশ্য

এই এককের পঠনের শেষে আপনি যেগুলি করতে পারবেন সেগুলি হল :—

- দুটি ভেট্টরের ক্ষেলার ও ভেট্টর গুণফলের মান নির্ণয় করতে পারবেন।
- তিন বা ততোধিক ভেট্টরের ক্ষেলার ও ভেট্টর গুণফল নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।
- যে কোন ধরনের সমস্যার জ্যামিতিক সমাধান ভেট্টর গুণনের সাহায্যে করতে পারবেন।

### 3.3 দুটি ভেট্টরের ক্ষেলার গুণফল (Scalar product or Dot product)

এই পরিচেদে দুটি ভেট্টরের মধ্যে ক্ষেলার গুণনের বিভিন্ন নিয়ম, ধর্ম, প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা অবগত হতে পারবেন। প্রথমে দুটি ভেট্টরের মধ্যে ক্ষেলার গুণফলের অর্থ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রকৃতি জগতে ক্ষেলার রাশিগুলির প্রত্যেকটি দুটি ভেট্টর রাশির উপর এমনভাবে নির্ভর করে যে সেই ক্ষেলার রাশিটি দুটি ভেট্টর রাশির মাপাঙ্ক এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইনের (Cosine) সঙ্গে যুক্ত সমানুপাতিক (Jointly proportional).

এবার গাণিতিকভাবে ভেট্টরের ক্ষেলার গুণফলের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।


মনে করি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি ভেট্টর রাশি ও তাদের অন্তর্বর্তী কোণ  $\theta$  চিরি (3.1) লক্ষ্য করুন।  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$ ,  $\angle BOA = \theta$

দুটি ভেট্টর রাশির ক্ষেলার গুণন  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  ( $\vec{a}$  ডট  $\vec{b}$ ) দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং তার মান— ভেট্টর রাশিদুটির মাপাঙ্ক ও কোণের কোসাইনের গুণফলের সমান। অতএব সংজ্ঞা অনুসারে লেখা যায়

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta \quad [\text{যেখানে } \vec{a} \text{ ও } \vec{b} \text{-এর মধ্যবর্তী কোণ } \theta]$$

চিরি 3.1

এখানে  $|\vec{a}|$ ,  $|\vec{b}|$  এবং  $\cos\theta$  প্রতিটি ক্ষেলার রাশি হওয়ায় আপনারা সহজেই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন— দুটি ভেট্টর রাশির ক্ষেলার গুণন ( $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ) একটি ক্ষেলার রাশি (গান্তব সংখ্যা)



সংজ্ঞানুসারে সহজেই লেখা যায়

$$\bar{b} \cdot \bar{a} = |\bar{b}| |\bar{a}| \cos\theta = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta$$


$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$$

সুতরাং দুটি ভেক্টরের ক্ষেলার গুণফল বিনিময় সূত্র (Commutative law) মেনে চলে। আপনারা সহজেই বলতে পারেন যে কোন একটি ভেক্টর রাশি ও শূন্য ভেক্টর ক্ষেলার গুণফল শূন্য হবে অর্থাৎ


$$\bar{a} \cdot \bar{O} = \bar{O}.$$

### 3.3 ক্ষেলার গুণফলের চিহ্ন

যদি  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$  দুটি ভেক্টর রাশি হয়। তবে তাদের ক্ষেলার গুণফল ধনাত্মক, ঋণাত্মক অথবা শূন্য হবে যথাক্রমে  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণটি সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ ও সমকোণ হলে অর্থাৎ



চিত্র 3.2




চিত্র 3.3

i)  $\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta > 0$

ii)  $\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta < 0$

iii)  $\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta = 0$



চিত্র 3.4

## অনুসিদ্ধান্ত :

ক) এই আলোচনার সাহায্যে আপনারা একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন :  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টর রাশি দুটি যদি পরস্পরের উপর লম্ব হয় তবে ভেক্টর রাশি দুটির ক্ষেত্রের গুণফল শূন্য হবে।

খ) আবার  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টর রাশি দুটি সমান্তরাল হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ নিশ্চয়ই শূন্য হবে। অতএব  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 0^\circ = |\vec{a}| |\vec{b}|$  সুতরাং ভেক্টর রাশি দুটি সমান্তরাল ও একই দিক বরাবর হলে ভেক্টর রাশি দুটির ক্ষেত্রের গুণন তাদের দৈর্ঘ্যের গুণফলের সমান হবে।

গ) আবার  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেক্টর দুটি সমরেখ হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ  $0^\circ$  অথবা  $180^\circ$  হবে।

অর্থাৎ  $\cos \theta = 1$  অথবা  $-1$  হবে।

$$\text{সুতরাং } \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \text{ যখন } \theta = 0^\circ$$

$$= -|\vec{a}| |\vec{b}| \text{ যখন } \theta = 180^\circ$$

পূর্ব এককে আলোচিত হয়েছে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  তিনটি একক ভেক্টর যারা পরস্পরের উপর লম্বভাবে অবস্থিত এবং যথাক্রমে  $x$ -অক্ষ,  $y$ -অক্ষ ও  $z$ -অক্ষ বরাবর আছে।

যা চিত্র (3.5) থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

সুতরাং আপনারা সহজেই লিখতে পারেন

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = |\vec{i}| |\vec{j}| \cos 90^\circ = (1) (1) (0) = 0 = \vec{j} \cdot \vec{i}$$

অনুরূপে লেখা যায় [ক্ষেত্রের গুণফল বিনিময় সূত্র মেনে চলে ]

$$\vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

চিত্র 3.5

$$\text{আবার আপনারা লক্ষ্য করুন } \vec{i} \cdot \vec{i} = |\vec{i}| |\vec{i}| \cos 0^\circ = (1) (1) (1) = 1$$

$\vec{i}$  একটি একক ভেক্টর যার মাপাক্ষ এক (1) এবং  $\vec{i}$  ভেক্টর  $\vec{i}$  সঙ্গে শূন্য ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে। অতএব অনুরূপে লিখতে পারেন

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$


$\vec{a}$  যদি একটি ভেক্টর রাশি হয় তবে

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0^\circ = |\vec{a}|^2 = a^2$$

$a^2$  একটি ক্ষেত্রের রাশি যা  $\vec{a}$  ভেক্টর রাশির দৈর্ঘ্যের বর্গক্ষেত্রের সমান।

আপনারা পূর্বের একক থেকে জানতে পেরেছেন যে ভেক্টর  $\vec{a}$ -এর দিক্যুক্ত একক ভেক্টর

হল  $= \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ , যদি  $|\vec{a}| > 0$  হয়।



দুটি ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে গুণফলের সংজ্ঞা থেকে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta$$


$$\therefore \cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad \therefore \theta = \cos^{-1} \left[ \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \right]$$

অতএব দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যবর্তী কোণ ক্ষেত্রে গুণফলের সংজ্ঞা থেকে সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।


### 3.3.2 একটি ভেক্টরের উপাংশ (Component) ও উপাংশ ভেক্টর (Projected vector or component vector)

ধরি  $\vec{a}$  একটি ভেক্টর রাশি যার উপাংশ ও উপাংশ ভেক্টর নির্ণয় করতে হবে। ধরি  $\vec{OA} = \vec{a}$

$\vec{\gamma} = \vec{OM}$  ( $|\vec{\gamma}| = 1$ ) একক ভেক্টরটি  $\vec{a}$ -এর সঙ্গে  $\theta$  কোণ উৎপন্ন করেছে।



চিত্র 3.6 (1)



চিত্র 3.6 (2)

AP সরলরেখা OM-এর উপর লম্ব করে টানা হলো। সূতরাং  $\pm OP$ -কে বলা হবে  $\vec{a}$ -এর উপাংশ এবং  $\vec{\gamma}$ -এর দিক্ বরাবর। চিত্র 3.6 (1) লক্ষ্য করুন।  $\vec{OM}$  ও  $\vec{OP}$  একই দিকে অবস্থিত। সূতরাং  $\vec{OP}$  ধনাত্মক চিহ্ন যুক্ত হবে যখন  $\vec{OP}$  ও  $\vec{OM}$  একই দিকে অবস্থিত হবে। চিত্র 3.6(2) লক্ষ্য করুন।  $\vec{OP}$  ও  $\vec{OM}$  বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতএব  $\vec{OP}$ -কে ঋণাত্মক চিহ্ন যুক্ত ধরা হবে যখন  $\vec{OM}$  ও  $\vec{OP}$  পরম্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত হয়।

চিত্র 3.6 (1) অনুসারে

$$\vec{\gamma}-\text{র দিক্ বরাবর } \vec{a}-\text{এর উপাংশ} = + \vec{OP} = OA \cos\theta = |\vec{a}| \cos\theta$$

চিত্র 3.6(2) অনুসারে

$$\vec{a} - \text{র দিক বরাবর } \vec{a} - \text{এর উপাংশ} = -\overrightarrow{OP} = -OA \cos\theta (\pi - \theta) = OA \cos\theta = |\vec{a}| \cos\theta$$

অতএব উভয় ক্ষেত্রে প্রমাণিত হল  $\vec{a}$ -এর উপাংশ  $\vec{v}$  একক ভেস্টেরের দিক বরাবর হবে  $|\vec{a}| \cos\theta$ । এখন  $|\vec{a}| \cos\theta \vec{v}$  ভেস্টেরটিকে বলা হবে  $|\vec{a}|$ -এর উপাংশ ভেস্টের (Projected vector or component vector)  $\vec{v}$  একক ভেস্টেরের দিক বরাবর।

অনুসিদ্ধান্ত :

$\vec{a}$  ভেস্টেরটিকে ত্রিমাত্রিকভাবে  $\vec{a} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$  রূপে প্রকাশ করা যায়। যেখানে  $a_1, a_2, a_3$  যথাক্রমে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  দিক বরাবর উপাংশ।

$\vec{a}$ -এর উপাংশ  $\vec{i}$ -এর দিক বরাবর

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{i} &= (\vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3) \cdot \vec{i} \\ &= \vec{i} \cdot \vec{i}a_1 + \vec{j} \cdot \vec{i}a_2 + \vec{k} \cdot \vec{i}a_3 \\ &= a_1 \quad [\because \vec{i} \cdot \vec{i} = 1, \vec{j} \cdot \vec{i} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0]\end{aligned}$$

অতএব অনুরূপে আপনারা লিখতে পারেন

$\vec{a}$ -এর উপাংশ  $\vec{j}$ -এর দিক বরাবর  $= a_2$

$\vec{a}$  " "  $\vec{k}$  " "  $= a_3$

অন্তব্য :  $a_1, a_2, a_3$ -কে  $\vec{a}$ -এর পরম্পর লম্ব উপাংশও বলে।

### 3.3.3 স্কেলার গুণফল

মনে করি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দ্বারা গঠিত সেটটি V এবং বাস্তব সংখ্যা দ্বারা গঠিত সেটটি R হলে আমরা লক্ষ্য করছি স্কেলার গুণফল একটি চিত্রণ (mapping) সৃষ্টি করেছে যার ফলে

$$V \times V \xrightarrow{f} \text{স্কেলার গুণফল } R$$

হয়। অতএব স্কেলার গুণফল প্রক্রিয়াটি দ্বিপদ (Binary) প্রক্রিয়া নয়।

### 3.3.4 উপাংশের সাপেক্ষে স্কেলার গুণফল নির্ণয়

মনে করি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি ভেস্টের রাশি। অতএব ধরি  $\vec{a} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$  যেখানে  $a_1, a_2, a_3$  তিনটি স্কেলার যথাক্রমে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ -এর দিক বরাবর উপাংশ।  $\vec{b} = \vec{i}b_1 + \vec{j}b_2 + \vec{k}b_3$  যেখানে  $b_1, b_2, b_3$  তিনটি স্কেলার যথাক্রমে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ -এর দিক বরাবর উপাংশ। এখন আমরা উপাংশের সাপেক্ষে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  ভেস্টের দুটির স্কেলার গুণফল নির্ণয় করি।

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3) \cdot (\vec{i}b_1 + \vec{j}b_2 + \vec{k}b_3)$$

$$= \bar{i} \cdot \bar{i} a_1 b_1 + \bar{i} \cdot \bar{j} a_1 b_2 + \bar{i} \cdot \bar{k} a_1 b_3 + \bar{j} \cdot \bar{i} a_2 b_1 + \bar{j} \cdot \bar{j} a_2 b_2 + \bar{j} \cdot \bar{k} a_2 b_3 + \bar{k} \cdot \bar{i} a_3 b_1 + \bar{k} \cdot \bar{j} a_3 b_2 + \bar{k} \cdot \bar{k} a_3 b_3$$

যেহেতু  $\bar{i} \cdot \bar{i} = \bar{j} \cdot \bar{j} = \bar{k} \cdot \bar{k} = 1$  এবং  $\bar{i} \cdot \bar{j} = \bar{k} \cdot \bar{j} = \bar{j} \cdot \bar{k} = \bar{j} \cdot \bar{i} = \bar{i} \cdot \bar{k} = \bar{k} \cdot \bar{i} = 0$

অতএব সমীকরণ (1) হতে আপনারা লিখতে পারেন  $\bar{a} \cdot \bar{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$  ----- (2)  
সুতরাং দুটি ভেক্টরের ক্ষেত্রের গুণফল উপাংশে সাপেক্ষে নির্ণয় হল।

অনুসিদ্ধান্ত a) আপনারা জানেন  $|\bar{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$  এবং  $|\bar{b}| = \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$

সুতরাং দুটি ভেক্টরের ক্ষেত্রের গুণফলের সংজ্ঞা থেকে লিখতে পারেন

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| \cdot |\bar{b}| \cos\theta$$

( $\bar{a} \cdot \bar{b}$ ),  $|\bar{a}|$ ,  $|\bar{b}|$ -এর মান বসিয়ে পাই

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} \cos\theta$$

$$\therefore \cos\theta = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} ----- (3)$$

সমীকরণ (3) এর সাহায্যে দুটি ভেক্টরের অন্তর্গত কোণের মান নির্ণয় করা যায়।

b) অতএব  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর অন্তর্গত কোণ যদি  $\theta = \frac{\pi}{2}$  হয় অর্থাৎ  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$  পরস্পরের উপর লম্ব হয় তবে  
 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$  হবে।

### 3.3.5 ক্ষেত্রের গুণফলের বিভিন্ন ধর্মাবলী

ক) দুটি ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রের গুণফল বিনিয়য় সূত্র মেনে চলে সেটা আপনারা ক্ষেত্রের গুণফলের সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$  সিদ্ধ হবে যে কোন দুটি ভেক্টর রাশি  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর ক্ষেত্রে।

খ) ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ নিয়ম (Associativity with scalars)

$\bar{a}$  ও  $\bar{b}$  যদি ভেক্টর রাশি হয় এবং  $m$  ও  $n$  যে কোন ক্ষেত্রের রাশি হয় তবে  $m\bar{a} \cdot n\bar{b} = mn(\bar{a} \cdot \bar{b})$  হবে।

প্রমাণ :

i)  $m$  ও  $n$  যে কোন ধনাত্মক ক্ষেত্রের রাশি হয় তবে  $\bar{a}$  ও  $m\bar{a}$  একই দিক নির্দেশ করে। অনুরূপে  $\bar{b}$  ও  $n\bar{b}$ -এর দিক ও একই। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব এককে পেয়েছেন। সুতরাং  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ  $m\bar{a}$  ও  $n\bar{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ একই হবে।


সুতরাং ক্ষেত্রের গুণনের সংজ্ঞানুসারে আপনারা লিখতে পারেন

$$m\bar{a} \cdot n\bar{b} = |m\bar{a}| |n\bar{b}| \cos\theta$$

$$[ \theta \text{ যদি } m\bar{a} \text{ ও } n\bar{b} \text{-এর মধ্যবর্তী কোণ হয় ]$$

$$= |m| |n| |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta$$

$$= mn (\bar{a} \cdot \bar{b}) \text{ [সংজ্ঞানুসারে]}$$



চিত্র 3.7

চিত্র 3.7 থেকে আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে করি  $= \bar{a}$ ,  $\vec{OP} = m\bar{a}$ ,  $\vec{OM} = \bar{b}$

$\vec{OR} = n\bar{b}$  এবং  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$  মধ্যবর্তী কোণ  $\theta$ । সুতরাং  $m\bar{a}$  ও  $n\bar{b}$  এর মধ্যবর্তী কোণ  $\theta$  হবে।

ii) এখন মনে করুন  $m$  খণ্ডাত্মক রাশি ও  $n$  ঝণ্ডাত্মক রাশি হয় তবে  $m\bar{a}$  ও  $n\bar{b}$  এর মধ্যবর্তী কোণ  $(\pi-\theta)$  হবে। চিত্র 3.7 লক্ষ করুন  $n$  ঝণ্ডাত্মক হলে এর দিক বিপরীত হয়ে যাবে। অর্থাৎ  $n\bar{b} = \vec{OR}'$  হবে। অতএব  $\vec{OP}$  ও  $\vec{OR}'$  এর মধ্যবর্তী কোণ  $\pi-\theta$  হবে।

$$m\bar{a} \cdot n\bar{b} = |\bar{m}\bar{a}| |n\bar{b}| \cos(\pi-\theta)$$

$$= |m| |n| |\bar{a}| |\bar{b}| (-\cos\theta)$$

$$= -mn |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta$$

যেহেতু  $n$  ঝণ্ডাত্মক অতএব

$$m\bar{a} \cdot n\bar{b} = mn |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta$$

$$= mn (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

iii) যদি  $m$  ঝণ্ডাত্মক ও  $n$  ঝণ্ডাত্মক রাশি হয় তবে  $m\bar{a}$  ও  $n\bar{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণও  $\theta$  হবে। চিত্র (3.7)


লক্ষ্য করুন  $m$  ও ঝণ্ডাত্মক হলে  $\vec{OR}' = n\bar{b}$  ও  $\vec{OP}' = m\bar{a}$  ধরি। সুতরাং  $\vec{OR}'$  ও  $\vec{OP}'$  এর মধ্যবর্তী কোণ  $\theta$  হবে।

অতএব

$$m \bar{a} \cdot n \bar{b} = |m| |n| |\bar{a}| |\bar{b}| \cos\theta$$

$$= mn (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

অনুসন্ধান : i) চিত্র 3.8 লক্ষ্য করুন।



চিত্র 3.8

যেকোন দুটি ভেক্টর  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর ক্ষেত্রে সহজেই প্রমাণ করা যায়।

$$\bar{a} \cdot (-\bar{b}) = -(\bar{a} \cdot \bar{b})$$


$$(-\bar{a}) \cdot (-\bar{b}) = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

গ) যে কোন তিনটি অসমতলীয় ভেক্টর রাশির প্রতিটির সঙ্গে অন্য একটি ভেক্টর রাশির ( $\bar{r}$ ) ক্ষেত্রের গুণফল শূন্য হবে একমাত্র  $\bar{r}$  ভেক্টরটি যদি শূন্য ভেক্টর রাশি হয়।

উপরের ক্ষেত্রের গুণফলের ধর্ম থেকে সহজেই আপনারা একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন কোন অশূন্য ভেক্টর রাশি কখনও তিনটি অসমতলীয় ভেক্টরের প্রতিটির সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত হবে না।

অতএব  $\bar{r}$  ভেক্টরটি প্রতিটি ভেক্টরের উপর লম্বভাবে অবস্থিত হবে যদি ভেক্টর রাশিটি শূন্য ভেক্টর হয়।

ঘ) চিত্র 3.9 লক্ষ্য করুন। মনে করুন  $\vec{PQ} = \bar{b}, \bar{a}$  ভেক্টরটির অবলম্বন  $\vec{AB}$ ,  $PL$  ও  $QM$  দুটি লম্ব  $\vec{AB}$  উপর টানা হলো। অতএব  $\bar{b}$  এর প্রক্ষেপ  $\vec{AB}$ -এর উপর  $= LM = |\bar{b}| \cos\theta$



চিত্র 3.9

সুতরাং আপনারা সহজেই বলতে পারেন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি ভেক্টর ক্ষেত্রের গুণফল  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ -এর দৈর্ঘ্য ও  $\vec{b} \cdot \vec{a}$ -এর প্রক্ষেপ বা লম্ব অভিক্ষেপ ( $\vec{a} \cdot \vec{b}$ -এর উপর) এর গুণফলের সমান। ধনাত্মক হবে বা ঋণাত্মক হবে তা নির্ভর করবে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর দিকের উপর।

### ৫) বন্টন সূত্র (Distributive Law)

ক্ষেত্রের গুণফল বন্টন সূত্র মেনে চলে। অর্থাৎ  $\vec{a}, \vec{b}$  ও  $\vec{c}$  তিনটি ভেক্টর রাশি হয় তবে

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

প্রমাণ :

চিত্র 3.10 দেখুন। মনে করি  $\vec{AB} = \vec{b}$ ,  $\vec{BC} = \vec{c}$  অতএব  $\vec{AC} = \vec{b} + \vec{c}$  হবে।

$\vec{a}$  ভেক্টরের অবলম্বন RK রেখাংশের উপর AL, BM ও CN লম্ব টানা হলো।

$\vec{AB}$ -এর উপাংশ ভেক্টর  $\vec{RK}$ -এর দিক বরাবর হল  $\vec{LM}$

$\vec{BC}$  " " " " " MN

$\vec{AC}$  " " " " " LN


অতএব  $(\vec{b} + \vec{c})$ -এর উপাংশ = উপাংশ  $\vec{b}$  + উপাংশ  $\vec{c}$

সুতরাং  $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}| (\vec{b} + \vec{c})$ -এর উপাংশ

$$= |\vec{a}| (\vec{b}-এর উপাংশ + \vec{c}-এর উপাংশ)$$

$$= |\vec{a}| \vec{b}-এর উপাংশ + |\vec{a}| \vec{c}-এর উপাংশ$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$



অনুরূপে দেখানো যায়

চিত্র 3.10

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} + (-\vec{c}))$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} + [-(\vec{a} \cdot \vec{c})]$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c}$$

উপরের ক্ষেত্রের গুণফলের বণ্টনসূত্রের ধর্ম অনুযায়ী লেখা যায়

$$i) (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{b} = a^2 - b^2$$

$$ii) (\vec{a} + \vec{b})^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = a^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + b^2$$

$$iii) (\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + b^2$$

উপরের (ii) ও (iii) থেকে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4} \{(\vec{a} + \vec{b})^2 - (\vec{a} - \vec{b})^2\}$$

$$= \frac{1}{4} \{ |\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2 \}$$

অর্থাৎ দুটো ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রের গুণন ভেক্টর রাশি দুটির যোগফল ও বিয়োগফলের দৈর্ঘ্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায়।

### 3.3.6 ক্ষেত্রের গুণফলের মৌলিক অসমতা সমূহ (Inequalities for dot or Scalar product)

#### i) (Cauchy – Schwarz)-এর মৌলিক অসমতা

যদি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি ভেক্টর রাশি হয় তবে  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

প্রমাণ : মনে করুন  $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0, t$  যে কোন ক্ষেত্রের রাশি হয়। অতএব

$$\begin{aligned} |\vec{t}\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{t}\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{t}\vec{a} + \vec{b}) \\ &= t^2 \vec{a} \cdot \vec{a} + 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= t^2 |\vec{a}|^2 + 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

যেহেতু  $|\vec{t}\vec{a} + \vec{b}|^2 \geq 0$  অতএব

$$t^2 |\vec{a}|^2 + 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + |\vec{b}|^2 \geq 0$$

$$\text{অথবা } t^2 |\vec{a}|^2 + 2t |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} + \left( \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right)^2 + |\vec{b}|^2 - \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{|\vec{a}|^2} \geq 0$$

$$\text{অথবা } \left( t |\vec{a}| + \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right)^2 + \frac{1}{|\vec{a}|^2} [|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2] \geq 0 \quad \dots\dots(1)$$

$$\text{যেহেতু } \left( t |\vec{a}| + \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} \right)^2 \geq 0 \text{ এবং } |\vec{a}|^2 \geq 0$$

সুতরাং সমীকরণ (1) হতে আপনারা লিখতে পারেন

$$|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 \geq 0$$

$$|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \geq |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2$$

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \geq |\vec{a} \cdot \vec{b}| \quad \dots\dots(2)$$

অতএব Cauchy Schwarz's-এর মৌলিক অসমতা প্রমাণিত হল।

সমীকরণ (2) থেকে লিখতে পারেন

$$\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \leq 1$$

$$\text{ii) } |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

প্রমাণ : আপনারা জানেন

$$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b})^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\&= \vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2\end{aligned}$$

Cauchy Schwarz's এর মৌলিক অসমতা থেকে আপনারা জানেন  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

$$\begin{aligned}\text{অতএব } |\vec{a} + \vec{b}|^2 &\leq |\vec{a}|^2 + 2|\vec{a}| |\vec{b}| + |\vec{b}|^2 \\&\leq (|\vec{a}| + |\vec{b}|)^2 \\&\therefore |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|\end{aligned}$$

অনুসিদ্ধান্ত :  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$  হবে যদি  $\vec{a}$  এবং  $\vec{b}$  পরস্পর উপর লম্ব হয়।

প্রমাণ :  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$


সূতরাং  $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$  হবে যদি  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  হয় অর্থাৎ  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ  $\frac{\pi}{2}$  হয়।

সূতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর উপর লম্ব হলে

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \text{ হবে।}$$

উদাহরণ : ABC ত্রিভুজের A, B এবং C শীর্ষ বিন্দু কোণ ত্রয়ের পরিমাপ যথাক্রমে A, B এবং C দ্বারা সূচিত করা হল। A, B এবং C কোণের বিপরীত বাহু তিনটির পরিমাপকে অর্থাৎ BC, CA ও AB এর বাহুর দৈর্ঘ্যকে যথাক্রমে a, b ও c দ্বারা প্রকাশ করা হল। আপনাদের জানা আছে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে ত্রিভুজের নিম্নলিখিত ধর্মগুলি প্রমাণ করা যায়। আপনারা এই ধর্মগুলি ভেষ্টেরের ক্ষেত্রের গুণনের সাহায্যে প্রমাণ করতে পারবেন।

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- $a = b \cos C + c \cos B$
- $b = c \cos A + a \cos C$
- $c = a \cos B + b \cos A$
- এর প্রমাণ



চিত্র 3.11

চিত্র 3.11 লক্ষ্য করুন। ধরা যাক  $\vec{BC} = \vec{a}$ ,  $\vec{CA} = \vec{b}$  ও  $\vec{AB} = \vec{c}$

ভেষ্টেরের যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আপনারা লিখতে পারেন

$$\begin{aligned}\vec{BA} &= \vec{BC} + \vec{CA} \\-\vec{AB} &= \vec{BC} + \vec{CA} \quad \dots \dots \quad (1)\end{aligned}$$

সূতরাং সমীকরণ (1) এর উভয় পার্শ্বে ক্ষেত্রার গুণফল লিখে লিখতে পারেন

$$(-\vec{AB}) \cdot (-\vec{AB}) = (\vec{BC} + \vec{CA}) \cdot (\vec{BC} + \vec{CA})$$

$$\text{অথবা } \vec{AB} \cdot \vec{AB} = \vec{BC} \cdot \vec{BC} + 2 \vec{BC} \cdot \vec{CA} + \vec{CA} \cdot \vec{CA}$$

$$\vec{c} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{a} + 2 \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}$$

$$|\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos(\pi - c) + |\vec{b}|^2 \quad \dots \dots (2)$$

$|\vec{a}| = a, |\vec{b}| = b, |\vec{c}| = c$  লেখা হয় তবে সমীকরণ (2) থেকে পাই

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos c$$

প্রমাণিত হল।

অনুরূপে আপনারা ত্রিভুজের (ii) ও (iii) ধর্ম দুটি প্রমাণ করুন।

উদাহরণ :

2. (vi)-এর প্রমাণ

চিত্র (3.11) লক্ষ্য করুন।

সমীকরণ (1) এর উভয় পার্শ্বে  $\vec{AB}$ -এর সঙ্গে ক্ষেত্রার গুণফল নিলে আমরা লিখতে পারি

$$-\vec{AB} \cdot \vec{AB} = (\vec{BC} + \vec{CA}) \cdot \vec{AB}$$

$$= \vec{BC} \cdot \vec{AB} + \vec{CA} \cdot \vec{AB}$$

(বণ্টনসূত্রানুসারে)

$$= |\vec{BC}| |\vec{AB}| \cos(\pi - B)$$

$$+ |\vec{CA}| |\vec{AB}| \cos(\pi - A)$$

$$- |\vec{AB}|^2 = - |\vec{BC}| |\vec{AB}| \cos B$$

$$- |\vec{CA}| |\vec{AB}| \cos A$$

এখনে  $|\vec{AB}|, |\vec{BC}|, |\vec{CA}|$  হলো

ABC ত্রিভুজের বাহ্যগুলির দৈর্ঘ্য। অতএব  
এরা সব ক্ষেত্রার রাশি। সূতরাং


$|\vec{AB}| = c, |\vec{BC}| = a$  এবং  $|\vec{CA}| = b$   
লিখলে আপনারা লিখতে পারেন।

$$-c^2 = -ca \cos B - cb \cos A$$

$$\text{অথবা } c = a \cos B + b \cos A$$

চিত্র 3.12

অনুরূপ ভাবে ত্রিভুজের অন্য দুটি ধর্ম (iv) ও (v) আপনারা করে দেখবেন।



### উদাহরণ 3. প্রমাণ করুন

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

সমাধান : চিত্র 3.12 লক্ষ্য করুন।  $OX, OY$  দুটি পরস্পর  $O$  বিন্দুতে লম্ব রেখা।  $\vec{i}, \vec{j}$  যথাক্রমে  $OX$  ও  $OY$  বরাবর একক ভেক্টর।  $XY$ —সমতলের  $X$ -অক্ষের উভয় পার্শ্বে দুটি ভেক্টর  $\vec{OP}$  ও  $\vec{OQ}$  নেওয়া হল যারা  $OX$ -এর সঙ্গে যথাক্রমে  $A$  ও  $B$  কোণে নত।

$X$ -অক্ষের উপর  $PM$  ও  $QN$  লম্ব টানা হল। এখন ত্রিভুজের যোগসূত্রানুসারে লেখা যায়

$$\vec{OP} = \vec{OM} + \vec{MP} = OP \cos A \vec{i} + OP \sin A \vec{j}$$

$$\text{এবং } \vec{OQ} = \vec{ON} + \vec{NQ} = OQ \cos B \vec{i} - OQ \sin B \vec{j}$$

$$\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = (OP \cos A \vec{i} + OP \sin A \vec{j}) \cdot (OQ \cos B \vec{i} - OQ \sin B \vec{j})$$

$$[\because \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1, \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0]$$


$$|OP| |OQ| \cos(A+B) = (OP)(OQ) [\cos A \cos B - \sin A \sin B]$$

$$\therefore \cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$


প্রমাণিত হল।

উদাহরণ 4.  $ABC$  ত্রিভুজের  $BC$  বাহুর মধ্যবিন্দু  $D$  হলে ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ করুন

$$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2)$$



চিত্র 3.13



চিত্র 3.14

প্রমাণ : ত্রিভুজের যোগ সূত্রানুযায়ী লেখা যায়

$$\vec{AB} = \vec{AD} + \vec{DB}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AB} = (\vec{AD} + \vec{DB}) \cdot (\vec{AD} + \vec{DB})$$

$$= \vec{AD} \cdot \vec{AD} + \vec{DB} \cdot \vec{DB} + 2 \vec{AD} \cdot \vec{DB}$$

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{AD}|^2 + |\vec{DB}|^2 + 2 \vec{AD} \cdot \vec{DB} \quad \dots \dots (1)$$

অনুরাগভাবে আমরা লিখতে পারি

$$\vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC}$$

$$\therefore \vec{AC}, \vec{AC} = (\vec{AD} + \vec{DC}) . (\vec{AD} + \vec{DC})$$

$$|\vec{AC}|^2 = |\vec{AD}|^2 + |\vec{DC}|^2 + 2 \vec{AD} \cdot \vec{DC} \quad \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) এবং (2) যোগ করে পাওয়া যায়

$$|\vec{AB}|^2 + |\vec{AC}|^2 = 2|\vec{AD}|^2 + |\vec{DB}|^2 + |\vec{DC}|^2 + 2 \vec{AD} \cdot (\vec{DB} + \vec{DC}) \quad \dots \dots (3)$$

যেহেতু D, BC বাহুর মধ্যবিন্দু

$$\therefore \vec{BD} = \vec{DC} \therefore |\vec{DB}| = |\vec{DC}| \quad \dots \dots (4)$$

$$\text{বা } -\vec{DB} = \vec{DC}$$

$$\vec{DC} + \vec{DB} = 0 \quad \dots \dots (5)$$

অতএব এখন সমীকরণ (3) এ সমীকরণ (4) ও (5) বসিয়ে পাই

$$|\vec{AB}|^2 + |\vec{AC}|^2 = 2(|\vec{AD}|^2 + |\vec{DB}|^2) \quad \dots \dots (6)$$

যেহেতু  $|\vec{AB}|, |\vec{AC}|$  ও  $|\vec{AD}|, |\vec{DB}|$  বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সূচিত করে। অতএব সমীকরণ (6)-কে লেখা যায়

$$AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + DB^2)$$

**উদাহরণ 5.** একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির সমদ্বিখণ্ডকগুলি (Perpendicular bisectors) সম বিন্দুগামী।

**সমাধান**

ABC ত্রিভুজের BC ও AC বাহু উপর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক দ্বয়

বিন্দু মিলিত হয়েছে। O বিন্দুকে মূলবিন্দু ধরি।

চিত্র 3.15

ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু A, B, C-এর অবস্থান ভেটার O-এর সাপেক্ষে বিন্দু মান হল  $\vec{a}, \vec{b}$  ও  $\vec{c}$ । AB বাহুর মধ্য F, OF যোগ করি। OF যদি AB-এর উপর লম্ব হয় তবেই OE, OD, OF লম্ব সমদ্বিখণ্ডকগুলি O বিন্দুগামী হবে, প্রমাণ হয়ে যাবে।


$$\text{ধরি } \vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$$

$$\therefore \vec{OD} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}, \vec{CA} = \vec{a} - \vec{c}, \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}, \vec{BC} = \vec{c} - \vec{b}$$

যেহেতু OD সরলরেখা BC-র উপর লম্ব অতএব ক্ষেত্রের গুণনের সাহায্যে আপনারা লিখতে পারেন

$$\vec{OD} \cdot \vec{BC} = 0$$

$$\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = 0$$



$$\text{বা } |\vec{b}|^2 - |\vec{c}|^2 = 0$$

$$|\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 \quad \dots \quad (1)$$

অনুরূপে আমরা লিখতে পারি

$$\frac{1}{2} (\vec{c} + \vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = 0$$

$$|\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 \quad \dots \quad (2)$$

সমীকরণ (1) এবং (2) হতে পাই

$$|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2$$

$$|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0$$

$$\text{বা } \vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\text{বা } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{2} (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \text{ হবে।}$$

$$\therefore \vec{O}F \cdot \vec{BA} = 0$$

সুতরাং  $\vec{OF}, \vec{AB}$ -এর উপর লম্ব।

অতএব ত্রিভুজের বাহ্যগুলির লম্বসমানিকগুলি ( $OE, OF, OD$ ) O বিন্দুগামী প্রমাণ হলো।

### অনুশীলনী —A

1.  $\vec{a} = \vec{j} + \vec{k}$  ভেক্টর বরাবর  $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j}$  ভেক্টরের উপাংশ (Component) ও উপাংশ ভেক্টরটি (Component vector or Projected vector) নির্ণয় করুন।
2. মান নির্ণয় করুন।
  - a)  $\vec{j} \cdot (2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$
  - b)  $(2\vec{i} - \vec{j}) \cdot (3\vec{j} + \vec{k})$
3. যদি  $\vec{A} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$  এবং  $\vec{B} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$  হয় তবে  $\vec{A}$  ও  $\vec{B}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করুন।
4.  $\alpha$ -এর মান নির্ণয় করুন যাতে  $\vec{A} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$  এবং  $\vec{B} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$  পরস্পর লম্ব হয়।
5. দেখান যে ভেক্টর  $\vec{A} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ ,  $\vec{B} = \vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$  এবং  $\vec{C} = 2\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$  একটি ত্রিভুজের বাহ্য নির্দেশ করলে প্রমাণ করুন ত্রিভুজটি সমকোণী হবে।
6. প্রমাণ করুন যে একটি ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব রেখাগুলি সম বিন্দুগামী হবে।
7. প্রমাণ করুন যে রম্পসের কর্ণদ্বয় পরস্পরে সমকোণে ছেদ করে।
8. ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B, C-এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $(2\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k})$ ,  $(4\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k})$  এবং  $(3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k})$  হলে প্রমাণ করুন যে ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে।

দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞা দেওয়ার আগে দক্ষিণাবর্ত প্রণালী সম্বন্ধে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য প্রথমে দক্ষিণাবর্ত প্রণালীর বর্ণনা দেওয়া হল।


### 3.4.1 দক্ষিণাবর্ত প্রণালী (Right handed system)

দুটি বা ততোধিক ভেক্টরের ভেক্টর গুণনের বিভিন্ন পদ্ধতি বোঝার আগে আপনাদের দক্ষিণাবর্ত প্রণালী এবং বামাবর্ত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আশা করি এর সম্বন্ধে আপনাদের কিছু জ্ঞান আছে। তাও আমি কিছু বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

মনে করি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  এবং  $\vec{c}$  তিনটি ভেক্টর রাশি  $\vec{c}$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যগামী সমতলের উপর লম্ব অর্থাৎ  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  উভয়ের উপর লম্ব। এখন যদি দেখা যায়  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যগামী সমতলের উপর লম্বভাবে রেখে একটি দক্ষিণাবর্ত স্ক্রুকে (Right handed screw)  $\vec{a}$  হতে  $\vec{b}$ -র দিকে  $\theta$  কোণ ঘোরালে স্ক্রুটি  $\vec{c}$ -এর সমদিকে অগ্রসর হয় তবে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  এই ক্রমটিকে (order) বলা হয় দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে। এটি সহজে বোঝা যাবে একটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ঘূর্ণন চিহ্ন।

উপরে বর্ণিত উপায়ে ঘূরিয়ে স্ক্রুটি যদি  $\vec{c}$ -র বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় তবে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  এই ক্রমটিকে বামাবর্ত প্রণালী (Left handed system) আছে বলা হয়।

যদি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র মধ্যে অন্তর্গত  $\theta = \frac{\pi}{2}$  কোণ হয় তবে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  পরস্পর লম্ব হবে। এই তিনটি ভেক্টর  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  চক্রাকারে (cyclic order) দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ থাকবে। অতএব এক্ষেত্রে বলা যায় OX, OY ও OZ পরস্পর লম্ব অক্ষ তিনটি চক্রাকারে দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে। সূতরাং OX, OY, OZ-অক্ষ বরাবর যথাক্রমে  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  এই তিনটি একক ভেক্টর দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে বলা হয়।




চিত্র 3.16

### 3.4.2 দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল (Vector product or cross product between two vectors)


দুটি ভেক্টর রাশির ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞা প্রথমে ভাষ্য দেওয়া হল। ভেক্টর রাশিগুলির প্রত্যেকটি দুটি ভেক্টর রাশির উপর এমনভাবে নির্ভর করে যে সেই ভেক্টর রাশিটি অন্য দুটি ভেক্টর রাশির মাপাঙ্ক এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণের সাইন (sine) এর সঙ্গে যুক্ত সমানুপাতিক এবং রাশিটির একটি নির্দিষ্ট দিক আছে। সেই রাশিটি ভেক্টর রাশি দুটির প্রত্যেকটির উপর লম্বভাবে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের দুটি ভেস্টের রাশির ভেস্টের গুণফল গাণিতিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনারা মনে করুন  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি ভেস্টের রাশি যাদের অঙ্গৰ্হত কোণ  $\theta$  ( $0 < \theta < \pi$ ) একটি একক ভেস্টের যা  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  এর মধ্যগামী সমতলের উপর লম্ব এবং  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{\gamma}$  এই ত্রিমিতি দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে। অতএব গাণিতিকভাবে দুটি ভেস্টের রাশির ভেস্টের গুণফল হল  $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma}$  ভেস্টের গুণফল  $\vec{a} \times \vec{b}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

$$\therefore \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma} \quad \text{---(1)}$$



চিত্র 3.17



চিত্র 3.18

উপরের চিত্র 3.17 এবং চিত্র 3.18 থেকে আপনাদের দুটি ভেস্টের রাশির ভেস্টের গুণফলের সমন্বে ধারণা পরিষ্কার হবে। এখানে  $\vec{\gamma}$  হল একক ভেস্টের যেটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  সমতলের উপর লম্বভাবে আছে। তার ঘূর্ণন  $\vec{a}$  থেকে  $\vec{b}$ -র দিকে হবে। বৃকাস্ফূলীটি  $c$ -এর দিক নির্দেশ করে।

সমীকরণ (1) থেকে সহজেই বলা যায় দুটি ভেস্টের রাশির ভেস্টের গুণফল একটি ভেস্টের রাশি। অর্থাৎ  $c$  একটি ভেস্টের রাশি। সূতরাং এর দিক আছে। চিত্র থেকে দিকটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে যাবে।  $|\vec{a}|, |\vec{b}|, \sin\theta$  ক্ষেত্রালোর রাশি। কিন্তু  $\vec{\gamma}$  একটি একক ভেস্টের রাশি।

সূতরাং  $\vec{b} \times \vec{a}$ -এর দিক  $\vec{a} \times \vec{b}$ -এর বিপরীত দিকে হবে। চিত্র 3.17 লক্ষ্য করুন। কিন্তু এই দুটি ভেস্টেরের মান সমান হবে। অর্থাৎ  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

সূতরাং আপনারা সহজেই বলতে পারেন ভেস্টেরের গুণন বিনিয়য় সূত্র মেনে চলে না।

$$\begin{aligned} \text{আবার } |\vec{a} \times \vec{b}| &= |\vec{a}| |\vec{b}| |\sin\theta| |\vec{\gamma}| \\ &= |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \end{aligned}$$

মন্তব্য :

- দুটি ভেস্টেরের ( $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ ) ভেস্টের গুণন  $\vec{a} \times \vec{b}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

$$\text{ii) } \vec{c} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma}$$

$\theta$  হলো  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ এবং  $0 \leq \theta \leq 180^\circ$

iii)  $\vec{c}$ -র অবলম্বন  $\vec{a}$  এবং  $\vec{b}$  ভেক্টরের অবলম্বনের উপর লম্ব।

iv)  $\vec{c}$ -এর অভিদিশা এমন যে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে।

v) ভেক্টর গুণফল এক প্রকার চিত্রণ (mapping) সৃষ্টি করেছে যার ফলে

vix  $f : \xrightarrow{\text{ভেক্টর গুণফল } v, \text{ অর্থাৎ } vxv \text{ সেটটি } v \text{ সেটেই চিত্রিত হচ্ছে ভেক্টর গুণফল দ্বারা।}$

[ভেক্টরগুলি দ্বারা গঠিত সেটটি  $v$  ধরা হয়েছে]

vi) যেহেতু  $0 < \theta < 180^\circ$  সূতরাং  $\sin\theta$  কখনও ঋণাত্মক হবে না। অতএব  $|\vec{a} \times \vec{b}|$  বা  $|\vec{c}|$  কখনও ঋণাত্মক হবে না।

ভেক্টর গুণনের সংজ্ঞা থেকে সহজেই আমরা বলতে পারি যে কোন ভেক্টরের শূন্য ভেক্টরের সঙ্গে ভেক্টর গুণনের মান শূন্য ভেক্টর হবে।

$$\therefore \vec{a} \times \vec{0} = \vec{0}$$

$(\vec{a} \times \vec{b})$  ভেক্টরটি নিশ্চয়ই  $\vec{a}$  এবং  $\vec{b}$  ভেক্টরের প্রতিটির সঙ্গে লম্ব ভাবে অবস্থিত।

অনুসিদ্ধান্তঃ প্রমাণ করুন  $(\vec{a} \times \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$

প্রমাণঃ ধরি  $|\vec{c}|^2 = \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = |\vec{a} \times \vec{b}|^2$$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2\theta$$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 (1 - \cos^2\theta)$$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \cos^2\theta$$

$$= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

সূতরাং ভেক্টরের গুণনের ক্ষেত্রে গুণন দ্বারাও প্রকাশ করা যায়।

$$\text{i) } |\vec{c}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

$$\text{ii) } \vec{c} \cdot \vec{a} = 0, \vec{c} \cdot \vec{b} = 0 \text{ হবে।}$$

iii)  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে থাকবে।

### 3.4.3 ভেক্টর গুণনের বিভিন্ন ধর্মাবলী

ক) দুটি অশূন্য ভেক্টর পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত

দুটি অশূন্য ভেক্টরের ( $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$ ) ভেক্টর গুণফল  $= \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma}$

সুতরাং  $\vec{a} \times \vec{b} = 0$  হবে যদি  $\sin\theta = 0$  হয় অর্থাৎ  $\theta = 0^\circ$  বা  $180^\circ$  হয়।

অতএব ডেক্টর দুটি সমান্তরাল বা সমরেখ হবে যদি  $\vec{a} \times \vec{b} = 0$  হয়।

অর্থাৎ  $\vec{c} = 0$  হবে।

সুতরাং দুটি সমান্তরাল ডেক্টর রাশির ডেক্টর গুণফল একটি শূন্য ডেক্টর হবে।

খ) দুটি ডেক্টর রাশির ডেক্টর গুণফল বিনিময় সূত্র মেনে চলে না। অর্থাৎ

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

এখান থেকে সহজেই বলা যায়  $\vec{a} \times \vec{b}$  ও  $\vec{b} \times \vec{a}$  অবলম্বন ও মাপাঙ্ক একই। কিন্তু অভিদিশা আলাদা।

গ) ক্ষেপণের সাথে সংযোগ সূত্র (Associativity with Scalars)

$m$  যদি যে কোন ক্ষেপণ রাশি হয় তবে প্রমাণ করা যায়  $(m\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (m\vec{b}) = m(\vec{a} \times \vec{b})$

প্রমাণ : i)  $m$  যদি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়

চিত্র 3.7 লক্ষ্য করুন। ধরা যাক  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর অন্তর্গত কোণ  $\theta$  এবং  $m$  একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা। অতএব  $m\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  এর অন্তর্গত কোণ  $\theta$  হবে কারণ  $m\vec{a}$  ও  $\vec{a}$  সমদিক্যুক্ত। অনুরূপে  $\vec{b}$  ও  $m\vec{b}$  সমদিক্যুক্ত। সুতরাং  $m\vec{b}$  ও  $\vec{b}$ -এর অন্তর্গত  $\theta$ -ই হবে।

$$\begin{aligned}\therefore (\vec{a} \times \vec{b}) &= |m\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma} \\ &= m|\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma} \\ &= m(\vec{a} \times \vec{b}) \quad \text{-----(1)}\end{aligned}$$

অনুরূপে প্রমাণ করা যায়

$$\vec{a} \times (m\vec{b}) = m(\vec{a} \times \vec{b}) \quad \text{-----(2)}$$

সুতরাং সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে লিখতে পারি

$$(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (m\vec{b}) = m(\vec{a} \times \vec{b}) \text{ হবে যদি } m \text{ ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়।$$

ii)  $m$  যদি ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়

$m$  ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হওয়ায়  $m\vec{a}$  ও  $\vec{a}$  বিপরীত দিক্যুক্ত হবে। সুতরাং  $m\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -র অন্তর্গত কোণ  $\theta$ -র পরিবর্তে  $(\pi - \theta)$  হবে। চিত্র 3.7 লক্ষ্য করুন।

$$(m\vec{a}) \times \vec{b} = |m\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\pi - \theta) (-\vec{\gamma})$$

[ $m$  ঋণাত্মক হওয়ায়  $m\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $-\vec{\gamma}$  ক্রমটি দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে এবং  $|m| = -m$ ]

$$\begin{aligned}\therefore (\vec{a} \times \vec{b}) &= m|\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{\gamma} \\ &= m(\vec{a} \times \vec{b})\end{aligned}$$

অনুরূপে প্রমাণ করা যায়

$$\vec{a} \times (m\vec{b}) = m(\vec{a} \times \vec{b})$$

$(m\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (m\vec{b}) = m(\vec{a} \times \vec{b})$  যখন  $m$  একটি বাস্তব ঋণাত্মক সংখ্যা।

সূতরাং সাধারণভাবে বলতে পারেন

$m\vec{a} \times n\vec{b} = mn(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times mn\vec{b}$  হবে, যখন  $m$  ও  $n$  যে কোন ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়।

অনুসিদ্ধান্ত : i)  $-\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{a} \times \vec{b})$

ii)  $\vec{a} \times (-\vec{b}) = -(\vec{a} \times \vec{b})$

iii)  $(-\vec{a}) \times (-\vec{b}) = (\vec{a} \times \vec{b})$  হবে

য) বণ্টন সূত্র বা বিভাগক সূত্র (Distributive law)

ভেক্টরের গুণফল বণ্টনসূত্র মেনে চলে  $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$  হবে।

### 3.4.4 ভেক্টরের ভেক্টর গুণনের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

আপনারা যদি দুটি ভেক্টর রাশির ভেক্টর গুণন জ্যামিতিক উপায়ে বোঝার চেষ্টা করেন তবে আমার মনে হয় আপনাদের ভেক্টর গুণনের সংজ্ঞা ও পারিপার্শ্বিক ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

OACB একটি সামান্তরিক আঁকা হল। যার বাহু  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$  দ্বারা চিহ্নিত করা যেহেতু OACB একটি সামান্তরিক সূতরাং  $\vec{AC} = \vec{b}$  এবং  $\vec{BC} = \vec{a}$  হবে। বর্ধিত CB-র উপর OM লম্ব টানা হল। V এমন একটি ভেক্টর  $\vec{OA}$  ও  $\vec{OB}$  ভেক্টর দুটির সমতলের উপর লম্ব হবে।  $\vec{OA}$  ও  $\vec{OB}$ -এর অন্তর্গত কোণ  $\theta$  ধরি। এখানে OM সামান্তরিকের উচ্চতা হবে।

OACB সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি  $\times$  উচ্চতা।


$$= |\vec{OA}| |OM|$$

$$= |\vec{a}| h = |\vec{a}| |\vec{OB}| \sin\theta$$

$$= |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$$

আমরা দুটি ভেক্টর রাশির ভেক্টর গুণনের সংজ্ঞা থেকে লিখতে পারি

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$$



চিত্র 3.19

C

$\therefore |\vec{a} \times \vec{b}|$  = সামান্তরিক OACB এর ক্ষেত্রফল। আপনারা জানেন সামান্তরিককের কর্ণ সামান্তরিক দুটি ত্রিভুজে বিভক্ত করে এবং ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান হবে।

$$\text{অর্থাৎ } m \Delta OBC = m \Delta OAC, m \Delta OBA = m \Delta ABC$$

$$\therefore \Delta OAB \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

সুতরাং ত্রিভুজের সমিহিত বাছ দুটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  হয় তবে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল  $= \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$  হবে।

### 3.4.5 তিনটি লম্ব একক ভেক্টরের মধ্যে সম্পর্ক

দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্তে আসা যায়। পরম্পর লম্ব তিনটি অক্ষ OX, OY ও OZ-এর দিক বরাবর যথাক্রমে  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  আছে।  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  চতুর্কাবে দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে।

আপনারা চির 3.5 লক্ষ্য করুন। সুতরাং,

$$\begin{aligned} \vec{i} \times \vec{j} &= |\vec{i}| |\vec{j}| \sin \frac{\pi}{2} \vec{k} && [\vec{k} \text{ একক ভেক্টর টি } \vec{i} \text{ ও } \vec{j} \\ &= (1)(1)(1) \vec{k} && \text{প্রত্যেকটির উপর লম্বভাবে} \\ &= \vec{k} && \text{আছে এবং } \vec{i} \text{ ও } \vec{j}-\text{এর} \\ \vec{j} \times \vec{i} &= -\vec{k} && \text{মধ্যবর্তী কোণ } \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

$$\text{অনুরূপ লিখতে পারেন } \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

$$\begin{aligned} \text{আবার } \vec{i} \times \vec{i} &= |\vec{i}| |\vec{i}| \sin 0^\circ && [\vec{i} \text{ ও } \vec{i}-\text{এর অন্তর্গত কোণ } 0^\circ] \\ &= (1)(1)(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{অনুরূপে লিখতে পারেন } \vec{k} \times \vec{k} = \vec{j} \times \vec{j} = 0 \text{ হবে।}$$

এই একক ভেক্টরগুলির গুণফলের ফল আপনাদের মনে রাখতে হবে। কারণ দুই বা ততোধিক ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল বার করতে হলে এই সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ পরম্পর লম্ব উপাংশের সাপেক্ষে দুটি বা ততোধিক ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল বার করতে এই সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ প্রয়োজন হবে।

### 3.4.6 পরম্পর লম্ব উপাংশের সাপেক্ষে দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল

$$\text{ধরা যাক } \vec{a} = \vec{i} a_1 + \vec{j} a_2 + \vec{k} a_3,$$

$$\vec{b} = \vec{j} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3$$

এখানে  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  পরম্পর লম্ব তিনটি অক্ষ বরাবর একক ভেস্টেরের  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবক্ষ।  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  যথাক্রমে  $\vec{a}$ -র  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$ -র দিক বরাবর লম্ব উপাংশ এবং  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  যথাক্রমে  $\vec{b}$ -র  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$ -এর দিক বরাবর লম্ব উপাংশ

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= (\vec{i} a_1 + \vec{j} a_2 + \vec{k} a_3) \times (\vec{i} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3) \\&= \vec{i} a_1 \times (\vec{i} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3) + \vec{j} a_2 \times (\vec{i} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3) + \vec{k} a_3 \times (\vec{i} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3) \\(\text{বর্ণন সূত্রানুসারে}) \\&= a_1 b_1 (\vec{i} \times \vec{i}) + a_1 b_2 (\vec{i} \times \vec{j}) + a_1 b_3 (\vec{i} \times \vec{k}) \\&\quad + a_2 b_1 (\vec{j} \times \vec{i}) + a_2 b_2 (\vec{j} \times \vec{j}) + a_2 b_3 (\vec{j} \times \vec{k}) \\&\quad + a_3 b_1 (\vec{k} \times \vec{i}) + a_3 b_2 (\vec{k} \times \vec{j}) + (\vec{k} \times \vec{k}) a_3 b_3\end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু } \vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$$

$$\text{এবং } \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

অতএব

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= a_1 b_2 \vec{k} - a_1 b_3 \vec{j} - a_2 b_1 \vec{k} + a_2 b_3 \vec{i} + a_3 b_1 \vec{j} - a_3 b_2 \vec{i} \\&= \vec{i} (a_2 b_3 - a_3 b_2) + \vec{j} (a_3 b_1 - a_1 b_3) + \vec{k} (a_1 b_2 - a_2 b_1)\end{aligned}$$

আপনারা উপরের গঠনকে অনুরূপভাবে নির্ণয়ক গঠন (Determinant form)-এ প্রকাশ করতে পারেন।

$$\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{সূতরাং } |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2}$$

আপনারা জানেন

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$$

$$\sin\theta = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$= \frac{\sqrt{\{(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2\}}}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

এই সম্পর্ক ব্যবহার করে আপনারা দুটি ভেক্টরের অঙ্গৰ্ত কোণ নির্ণয় করতে পারেন।

**3.4.7** যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  তিনটি অশূন্য ভেক্টর হয় তবে প্রমাণ করুন

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

প্রমাণ : মনে করুন  $\vec{a} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$ ,  $\vec{b} = \vec{i}b_1 + \vec{j}b_2 + \vec{k}b_3$  এবং  $\vec{c} = \vec{i}c_1 + \vec{j}c_2 + \vec{k}c_3$ ,

$$\text{অতএব } \vec{b} + \vec{c} = \vec{i}(b_1 + c_1) + \vec{j}(b_2 + c_2) + \vec{k}(b_3 + c_3)$$

সুতরাং  $(\vec{b} + \vec{c})$  একটি ভেক্টর রাশি। অতএব  $\vec{a}$  ও  $(\vec{b} + \vec{c})$  দুটি ভেক্টর রাশি। দুটি ভেক্টর রাশির ভেক্টর গুণফল নিম্নে দেওয়া হল।

$$\begin{aligned}\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \vec{a} + \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}\end{aligned}$$

সুতরাং ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল বর্ণন সূত্র মেনে চলে। অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়

$$(\vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{b} + \vec{a} + \vec{c} \times \vec{a}$$

অনুসিদ্ধান্ত :

$$1) (\vec{b} + \vec{c}) \times \vec{a} = -\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c})$$

$$= -[\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}]$$

$$= -\vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}$$

$$= \vec{b} \times \vec{a} + \vec{c} \times \vec{a}$$

$$2) \vec{a} \times (\vec{b} - \vec{c}) = \vec{a} \times [\vec{b} + (-\vec{c})]$$

$$= \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times (-\vec{c})$$

$$= \vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \times \vec{c}$$

অনুরূপভাবে

$$(\bar{b} - \bar{c}) \times \bar{a} = \bar{b} \times \bar{a} - \bar{c} \times \bar{a}$$

$$3) (\bar{a} + \bar{b}) \times (\bar{c} + \bar{d}) = \bar{a} \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{d} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{b} \times \bar{d}$$

### 3.4.8 ভেক্টর গুণফল ভেক্টর ক্ষেত্রফল রাপে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞা থেকে আপনাদের সামান্যরিক ও ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমন্বে ধারণা হয়েছে। এখন আমি ভেক্টর ক্ষেত্রফল সমন্বে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

এমন একটি তল বিশিষ্ট ক্ষেত্রফল  $S$  কল্পনা করা হল যা একটি সীমাবদ্ধ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ যাতে বক্ররেখাটি কখনও কোন জায়গায় নিজেকে ছেদ না করে। তাহলে উক্ত সীমাবদ্ধ বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফলকে ভেক্টর  $c$  দ্বারা প্রকাশ করা যাবে এবং  $c$  এমন একটি ভেক্টর যাতে।

i)  $c$ -এর দৈর্ঘ্যের একক সংখ্যা প্রদত্ত ক্ষেত্রফল  $S$ -র একক সংখ্যার সমান হবে।

ii)  $c$ -এর অবলম্বন ক্ষেত্রফলের সমতলের উপর লম্ব হবে।

iii) একটি দক্ষিণাবর্ত স্ফুরকে  $s$  তলের উপর লম্বভাবে রেখে পরিসীমা  $c$ -এর উপর [চিত্র 3.20] চিহ্নিত দিক বরাবর ঘোরালে স্ফুটি যেদিকে অগ্রসর হবে সেই দিকটি হবে ভেক্টরের দিক।

এইভাবে যে ভেক্টরটি উৎপন্ন হবে তাকে বলা হবে  $c$ -বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ভেক্টর ক্ষেত্রফল।

চিত্র 3.20

মন্তব্য : চিত্রে বর্ণিত দিক বরাবর পরিসীমা  $c$ -কে অতিক্রম না করে বিপরীতভাবে অতিক্রম করলে ভেক্টর ক্ষেত্রফল বিপরীত দিক যুক্ত হবে।

এই ভেক্টরের মান ক্ষেত্রফল  $S$ -সমমান বিশিষ্ট এবং এর অভিলম্ব  $S$ -তলের উপর লম্ব।


### 3.4.9 ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ভেক্টর গুণফলের সাহায্যে নির্ণয়

চিত্র (3.23) লক্ষ্য করুন।

ধরাযাক  $\vec{OA} = \bar{a}$ ,  $\vec{OB} = \bar{b}$ ,  $OAB$  ত্রিভুজ নিলাম। দেখানো যেতে পারে  $OAB$  ত্রিভুজের ভেক্টর ক্ষেত্রফল  $\Delta \overrightarrow{OAB}$ .

$$\Delta \overrightarrow{OAB} = \frac{1}{2} \bar{a} \times \bar{b} = \text{হবে} \quad \dots \dots \quad (1)$$


সমীকরণ (1) এর বাঁদিকের ও ডানদিকের মান সমান অর্থাৎ  $\frac{1}{2} |\bar{a}| |\bar{b}| \sin\theta$  এবং তাদের অভিলম্ব ও অভিদিশাও এক।




সূতরাং আপনারা লিখতে পারেন

$$\Delta OAB = \frac{1}{2} \vec{a} \times \vec{b} = \frac{1}{2} \vec{OA} \times \vec{OB}$$

মন্তব্য : কোন সামান্তরিকের যার সমিহিত বাহুটি  $\vec{OA}$  ও  $\vec{OB}$  ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেক্ষেত্রে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে  $(\vec{OA} \times \vec{OB})$  চিত্র 3.22 লক্ষ্য করুন।



চিত্র 3.21



চিত্র 3.22

উদাহরণ—6 : যদি  $\vec{A} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$  এবং

$$\vec{B} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k} \text{ হয় তবে নির্ণয় করুন}$$

$$a) \vec{A} \times \vec{B} \quad b) \vec{B} \times \vec{A} \quad c) (\vec{A} + \vec{B}) \times (\vec{A} - \vec{B})$$

$$\text{সমাধান : } \vec{A} \times \vec{B} = (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) \times (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k})$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 10\vec{i} + 3\vec{j} + 11\vec{k}$$

$$\vec{B} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -10\vec{i} - 3\vec{j} - 11\vec{k}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) + (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) = 3\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) - (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) = \vec{i} - 7\vec{j} + \vec{k}$$

$$\text{সূতরাং } (\vec{A} + \vec{B}) \times (\vec{A} - \vec{B})$$

$$= (3\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}) \times (\vec{i} - 7\vec{j} + \vec{k})$$


$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -3 \\ 1 & -7 & 1 \end{vmatrix} = -20\vec{i} - 6\vec{j} - 22\vec{k}$$

**উদাহরণ—৭ :** PQR ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করন  
যদি ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  
P (1, 3, 2) Q(2, -1, 1) এবং R(-1, 2, 3) হয়।

সমাধান :

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\vec{i} + (-1-3)\vec{j} + (1-2)\vec{k} \\ &= \vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{PR} &= (-1-1)\vec{i} + (2-3)\vec{j} + (3-2)\vec{k} \\ &= -2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}\end{aligned}$$



$$\Delta PQR\text{-এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| \quad \dots\dots(1)$$

চিত্র 3.23

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-5\vec{i} + \vec{j} - 9\vec{k})$$

$$\begin{aligned}\Delta PQR\text{-এর ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \sqrt{(-5)^2 + (1)^2 + (-9)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{107} \text{ বর্গএকক।}\end{aligned}$$

**উদাহরণ—৮ :** একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করুন যা  $\vec{A} = 2\vec{i} - 6\vec{j} - 3\vec{k}$  এবং  $\vec{B} = 4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$  ভেক্টর দুটির সমতলের উপর লম্ব।

সমাধান :  $\vec{A} \times \vec{B}$  একটি ভেক্টর রাশিটি  $\vec{A}$  এবং  $\vec{B}$  ভেক্টর দুটির সমতলের উপর লম্ব। অতএব  
একক ভেক্টর =  $\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -6 & -3 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 15\vec{i} - 10\vec{j} + 30\vec{k}$$

$$\text{একক ভেক্টর} = \frac{15\vec{i} - 10\vec{j} + 30\vec{k}}{\sqrt{15^2 + (-10)^2 + (30)^2}}$$

$$= \frac{1}{7}(3\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k})$$

উদাহরণ—9 : কোন ত্রিভুজের বাহ্যগুলি যথাক্রমে  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  ভেক্টর দ্বারা চিহ্নিত হয় তবে প্রমাণ করুন যে

$$|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{c} \times \vec{a}| = |\vec{a} \times \vec{b}| \text{ এবং } \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

সমাধান :

ভেক্টরের যোগ সূত্রানুসারে লেখা যায়

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

$$\vec{a} \times (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 0$$

বর্ণন সূত্রানুসারে

$$\vec{a} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} = 0 \quad [\because \vec{a} \times \vec{a} = 0]$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{a} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a} \quad \dots \dots (1)$$

$$\text{অনুরূপে } \vec{b} \times (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = 0$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (1) ও (2) হতে লিখতে পারেন

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$$

$$\therefore \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$$

দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের সংজ্ঞানুসারে লেখা যায়

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\pi - C) = |\vec{b}| |\vec{c}| \sin(\pi - A) = |\vec{c}| |\vec{a}| \sin(\pi - B) \quad \dots \dots (3)$$

যেহেতু  $|\vec{a}|, |\vec{b}|, |\vec{c}|$  ত্রিভুজের বাহ্যগুলির দৈর্ঘ্য। সূতরাং এগুলি ক্ষেত্রের রাশি। আমরা বাহ্যগুলির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে  $a, b, c$  দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। সমীকরণ (3) থেকে লিখতে পারি


$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$$

$abc$  দ্বারা ভাগ করে পাই

$$\frac{\sin C}{c} = \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \text{ প্রমাণিত হল।}$$

উদাহরণ—10 : ABCD ট্রাপিজিয়ামের অসমান্তরাল বাল দুটি BC এবং AD এর মধ্য বিন্দু P ও Q হয় তবে প্রমাণ করুন যে  $\triangle APD = \triangle CQB$

সমাধান :  $\vec{AB} = \vec{b}$  এবং  $\vec{AD} = \vec{d}$ , A-কে মূল বিন্দু ধরি তবে B ও D বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর A বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে  $\vec{b}$  ও  $\vec{d}$  হবে।



চিত্র 3.24

এখানে  $\vec{DC}$ ,  $\vec{AB}$ -এর সঙ্গে সমান্তরাল।

$$\text{সূতরাং } \vec{DC} = t \vec{AB} = t \vec{b} \quad [t \text{ যে কোন ক্ষেত্রাল সংখ্যা}]$$

$$\therefore \vec{AC} = \vec{AD} + \vec{DC} = \vec{d} + t \vec{b}$$

$\therefore C$  বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের A বিন্দুর সাপেক্ষে  $\vec{d} + t \vec{b}$

সূতরাং P ও Q যেহেতু  $\vec{BC}$  ও  $\vec{AD}$ -এর মধ্যবিন্দু।

অতএব P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের A বিন্দুর


সাপেক্ষে যথাক্রমে  $\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d} + t\vec{b})$  এবং  $\frac{1}{2}\vec{d}$  হবে।

$$\text{এখন } \Delta \overrightarrow{APD} = \vec{AP} \times \vec{AD}$$

$$= \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d} + t\vec{b}) \times \vec{d}$$

$$= \frac{1}{2}(\vec{b} \times \vec{d} + \vec{d} \times \vec{d} + t\vec{b} \times \vec{d})$$

$$= \frac{1}{2}(1+t) \vec{b} \times \vec{d} \quad [\because \vec{d} \times \vec{d} = 0]$$



চিত্র 3.25

$$2 \Delta \overrightarrow{CQB} = \vec{CQ} \times \vec{CB}$$

$$= \left[ \frac{1}{2} \vec{d} - (\vec{d} + t\vec{b}) \right] \times \left[ \vec{b} - (\vec{d} + t\vec{b}) \right]$$

$$= -\frac{1}{2}(1-t) \vec{d} \times \vec{b} + t(\vec{b} \times \vec{d})$$

$$= \frac{1}{2}(1-t) \vec{b} \times \vec{d} + t(\vec{b} \times \vec{d})$$

$$= \frac{1}{2}(1+t) \vec{b} \times \vec{d}$$

$$= 2 \Delta \overrightarrow{APD}$$

$$\therefore \Delta APD = \Delta CQB$$

### অনুশীলন-B

9. যদি  $\vec{\alpha}$  এবং  $\vec{\beta}$  দুটি ভেট্টের রাশি হয় এবং  $|\vec{\alpha}| = 8$ ,  $|\vec{\beta}| = 6$  এবং  $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$  তবে  $|\vec{\alpha} \times \vec{\beta}|$  এর মান নির্ণয় করুন।

10. যদি  $\vec{A} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ ,  $\vec{B} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  হয় তবে  $\vec{A} \times \vec{B}$  নির্ণয় করুন।
11. যদি  $\vec{\alpha} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  এবং  $\vec{\beta} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$  হয় তবে উভয় ভেক্টরের উপর লম্ব একক ভেক্টরটি নির্ণয় করুন এবং ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোণ নির্ণয় করুন।
12. দেওয়া আছে  $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$ ,  $\vec{b} = 3\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}$  এবং  $\vec{c} = 6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$  হয় তবে দেখান যে  $\vec{a} \times \vec{b} = 7\vec{c}$
13. যদি D, E, F যথাক্রমে ABC ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দু হয় তবে প্রমাণ করুন যে
- $$\Delta DEF = \frac{1}{4} \Delta ABC$$
14. প্রমাণ করুন যে  $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
15. O বিন্দুর সাপেক্ষে A, B, C, ও D বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ ,  $(2\vec{i} + 3\vec{j})$ ,  $(3\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k})$  এবং  $\vec{k} - \vec{j}$  হলে  $\vec{AB} \times \vec{CD}$  বের করুন এবং দেখান যে  $\vec{AB}$  ও  $\vec{CD}$  সরলরেখা দুটি সমান্তরাল।
16. কোন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $A \rightarrow (\vec{a})$ ,  $B \rightarrow (\vec{b})$  এবং  $C \rightarrow (\vec{c})$  হয় তবে দেখান যে ABC ত্রিভুজের ভেক্টর ক্ষেত্রফল =  $\frac{1}{2}(\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$  হবে।

### 3.5 তিনি ও ততোধিক ভেক্টরের স্কেলার ও ভেক্টর গুণফল (Scalar triple product and cross product)

দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল ও ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল সমস্ক্রে আপনাদের ধারণা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকে সহজেই বলা যায় দুটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল একটি স্কেলার রাশি এবং দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল একটি ভেক্টর রাশি।

অতএব  $\bar{a}, \bar{b}$  একটি স্কেলার রাশি। সুতরাং অপর যে কোন একটি ভেক্টর রাশি  $\bar{c}$  ও  $(\bar{a} \times \bar{b})$  এর মধ্যে স্কেলার ও ভেক্টর গুণফল কোনটাই সম্ভব নয়। অর্থাৎ স্কেলার ও ভেক্টর গুণফল দুটি ভেক্টর রাশির মধ্যে হবে। অতএব  $\bar{a} \times \bar{b}$  একটি ভেক্টর রাশি সুতরাং  $\bar{c}$  ও  $\bar{a} \times \bar{b}$  এর মধ্যে উভয় গুণফল (অর্থাৎ স্কেলার ও ভেক্টর গুণফল) সম্ভব। আপনারা বুঝতে পারছেন  $\bar{a} \times \bar{b}, \bar{c}$  এবং  $(\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{c}$  গুণফল দুটি যথাক্রমে একটি স্কেলার ও ভেক্টর রাশি হবে। সুতরাং  $(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c}$  কে তিনটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল (scalar triple product) এবং  $(\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{c}$ -কে তিনটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল (vector triple product) বলা হয়।

#### 3.5.1 তিনটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফল

এই এককের প্রথম ভাগে তিনটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফলের সংজ্ঞা, জ্যামিতিক ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন ধর্মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

মনে করি  $\bar{a}, \bar{b}$  ও  $\bar{c}$  তিনটি ভেক্টর একই আদি বিন্দু বিশিষ্ট এবং ভেক্টর তিনটি সাধারণভাবে পরস্পরের উপর লম্ব নয়। এমতাবস্থায় মনে করি  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  চক্রকারে দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ আছে অর্থাৎ  $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}); (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}); (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b})$

এই ক্রম তিনটি যে কোন একটি ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল—ভেক্টরটি ও তৃতীয় ভেক্টরটি প্রথম দুটি ভেক্টরের মধ্যগামী সমতলের একই পার্শ্বে অবস্থিত হয়। অপরপক্ষে বলা যায়  $(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c}$  ও  $\bar{c}$  ভেক্টর দুটি  $\bar{a}$  ও  $\bar{b}$ -এর মধ্যগামী সমতলের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত হলে  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  বামাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ হবে।

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  ভেক্টর তিনটি দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ হলে  $\bar{a} \times \bar{b}$  ও  $\bar{c}$ -র অস্তর্গত কোণ ( $\bar{b} \times \bar{c}$ ) ও  $\bar{a}$ -এর অস্তর্গত কোণ এবং  $(\bar{c} \times \bar{a})$  ও  $\bar{b}$ -র অস্তর্গত কোণের প্রতিটি সূক্ষ্মকোণ হবে।

#### 3.5.2 তিনটি ভেক্টরের স্কেলার গুণফলকে নির্ণয়কে (Determinant form) প্রকাশ

ধরি  $\bar{a}, \bar{b}$  ও  $\bar{c}$  তিনটি ভেক্টর রাশি।

$$\text{ধরা যাক } \bar{a} = \bar{i}a_1 + \bar{j}a_2 + \bar{k}a_3,$$

$$\vec{b} = \vec{i} b_1 + \vec{j} b_2 + \vec{k} b_3$$

$$\vec{c} = \vec{i} c_1 + \vec{j} c_2 + \vec{k} c_3$$

যেখানে  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ ,  $\vec{k}$  তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষ-বরাবর একক ভেট্টের এবং চতুর্কারে দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আছে।

$a_1, a_2, a_3$  যথাক্রমে  $\vec{a}$ -র  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ -র দিক বরাবর লম্ব উপাংশ

$$b_1, b_2, b_3 \quad " \quad \vec{b} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \text{লম্ব উপাংশ}$$

$$c_1, c_2, c_3 \quad " \quad \vec{c} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \text{লম্ব উপাংশ}$$

(3.4) অধ্যায়ে আপনারা দেখেছেন

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}(b_2c_3 - b_3c_2) - \vec{j}(b_1c_3 - b_3c_1) + \vec{k}(b_1c_2 - b_2c_1)$$

সূতরাং  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

$$= (\vec{i} a_1 + \vec{j} a_2 + \vec{k} a_3) \cdot [\vec{i}(b_2c_3 - b_3c_2) - \vec{j}(b_1c_3 - b_3c_1) + \vec{k}(b_1c_2 - b_2c_1)] --- (1)$$

$$\text{যেহেতু } \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{k} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

সূতরাং সমীকরণ (1) থেকে পাই

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(-b_1c_3 + b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

অতএব আপনারা সহজেই তিনটি ভেট্টেরের ক্ষেলার গুণফলকে নির্ণয়কে (Determinant) প্রকাশ করতে পারেন।

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} ----- (2)$$

অনুসিদ্ধান্ত : সূতরাং নির্ণয়কের (Determinant) ধর্ম অনুযায়ী তিনটি ভেট্টেরের ক্ষেলার গুণফলকে অনুরূপভাবে লেখা যায়।

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

নির্ণয়কের যে কোন দুটি সারির (Row) পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তন হলে নির্ণয়কের চিহ্ন (sign) ও মান অপরিবর্তনীয় থাকে। অতএব আপনারা লিখতে পারেন

i)  $V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

ii) ক্ষেত্রের গুণফলে বিনিময় সূত্র প্রযোজ্য

$$V = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

iii) আপনারা জানেন দুটি ভেস্টেরের ভেস্টের গুণফলে বিনিময় সূত্র প্রযোজ্য নয়।

অর্থাৎ  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$  (দিক পরিবর্তনের জন্য ঝণাঞ্চক হল)

অতএব অনুবর্তী সূত্র (consequent) অনুযায়ী লেখা যায়।

$$V = -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = -\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = -\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a})$$

$$= -(\vec{c} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a}) \cdot \vec{c}$$

এই গুচ্ছ সম্বন্ধকে Heaviside সূত্র অথবা সামান্তরিক ষড়ক্ষেত্রক সূত্র বলা হয়।

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} \text{ কে সংক্ষেপে } [a \ b \ c] \text{ লেখা হয়।}$$

প্রয়োজনীয় আলোচনা (Important discussion) তিনটি ভেস্টেরের ক্ষেত্রের গুণফলের (V) উপরোক্ত বারটি সম্পর্ক থেকে আপনারা তিনটি সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারেন।

i)  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ হলে অথবা চক্রকারে পরিবর্তিত হলে তাদের ক্ষেত্রের গুণফলের মান একই থাকে।

ii) তিনটি ভেস্টেরের ক্ষেত্রের গুণফল (.) এবং (x) চিহ্ন পরম্পর স্থান বিনিময় করলে ক্ষেত্রের গুণফলের মান অপরিবর্তিত থাকে।

$$\therefore (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c})$$

iii) তিনটি ক্ষেত্রের গুণফলের যে কোন দুটি ভেস্টের পরম্পর স্থান বিনিময় করলে ক্ষেত্রের গুণফলের চিহ্ন পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ ধনাঞ্চক থেকে ঝণাঞ্চক কিংবা ঝণাঞ্চক থেকে ধনাঞ্চক হবে।


$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b})$$

$$\text{বা } [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = -[\vec{a} \ \vec{c} \ \vec{b}]$$

### 3.4.3 তিনটি ভেস্টেরের ক্ষেত্রের গুণফলের ( $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$ ) জ্যামিতিক ব্যাখ্যা (Geometrical interpretation of scalar triple products)

আপনাদের তিনটি ভেস্টেরের ভেস্টের গুণফলের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য একটি OBDCFAGE সামান্তরিক ষড়ক্ষেত্রক আঁকা হল। চিত্র 3.26 লক্ষ্য করুন। ধরা যাক  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$  এবং  $\vec{OC} = \vec{c}$

$\vec{OS}$  অভিলম্ব OBDC তলের উপর আঁকা হল। যে তলটি ভেস্টের  $\vec{b}$



চিত্র 3.26

এবং ভেক্টর  $\vec{c}$  দ্বারা সীমাবদ্ধ। অতএব  $\vec{b} \times \vec{c}$  ভেক্টরটি OBDC তলের উপর লম্ব এবং  $\vec{OS}$  দিক্‌বরাবর। সুতরাং পূর্ব অধ্যায় থেকে আপনারা সহজেই বলতে পারেন  $|\vec{b} \times \vec{c}|$  হল OBDC সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল।

ভেক্টর  $\vec{a}$ -এর প্রক্ষেপ (Projection)  $\vec{OS}$  উপর নিলে তা সামান্তরিকের ষড়তলকের উচ্চতার সমান হবে। অর্থাৎ  $OR = h$  হবে শৈর্ঘবিন্দু A থেকে OBDC সামান্তরিক তলের উচ্চতা। যা সামান্তরিক ষড়তলকের উচ্চতা হিসাবে গণ্য হবে।

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = |\vec{a}| |\vec{b} \times \vec{c}| \cos\theta$$

[দুটি ভেক্টর  $\vec{a}$  ও  $\vec{b} \times \vec{c}$ -এর ক্ষেত্রার গুণফলের সংজ্ঞানুসারে]

এখানে  $\vec{OA}$  এবং  $\vec{b} \times \vec{c}$ -এর ( $\vec{OS}$  দিক্‌বরাবর) মধ্যবর্তী কোণ মনেকরি  $\theta$

$$\begin{aligned} \text{অতএব } \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= h |\vec{b} \times \vec{c}| \\ &= (h) (\text{OBDC সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল}) \end{aligned}$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \text{OBDCFAGE সামান্তরিক ষড়তলকের ঘনফল}$$

যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  এবং  $\vec{c}$  ভেক্টর তিনটি দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ থাকে।

### 3.5.4 উপগাদ্য তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হওয়ার শর্ত

তিনটি অশূন্য ভেক্টর সমতলীয় হবে তার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট (necessary and sufficient) শর্ত হল ভেক্টর তিনটির ক্ষেত্রার গুণফল শূন্যমান হওয়া।

**প্রমাণ :** প্রয়োজনীয় শর্ত

$\vec{a}, \vec{b}$  ও  $\vec{c}$  যে কোন তিনটি অশূন্য ভেক্টর [অর্থাৎ  $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0, \vec{c} \neq 0$ ] ধরা যাক একই তলে অবস্থিত।

সংজ্ঞানুসারে বলা যায়  $\vec{a} \times \vec{b}$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর মধ্যগামী সমতলের উপর লম্ব ভেক্টর। সুতরাং  $\vec{a} \times \vec{b}$  ভেক্টরটি  $\vec{c}$ -এর উপর লম্ব হবে কারণ  $\vec{c}$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর মধ্যগামী সমতলে অবস্থিত। সুতরাং ক্ষেত্রার গুণফলের সংজ্ঞা অনুসারে আপনারা লিখতে পারেন।

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$$

**যথেষ্ট শর্ত**

$\vec{a}, \vec{b}$  ও  $\vec{c}$  তিনটি অশূন্য ভেক্টর। ভেক্টরগুলি এমন যে তাদের ক্ষেত্রার গুণফল শূন্যমান বিশিষ্ট অর্থাৎ

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

অর্থাৎ  $\vec{a} \times \vec{b}$  ভেক্টরটি  $\vec{c}$  ভেক্টরের উপর লম্ব।

এখন  $\vec{a} \times \vec{b}$  ভেক্টরটি সংজ্ঞানুসারে  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  উভয়ের উপর লম্ব হওয়ায় প্রমাণিত হয়  $\vec{a} \times \vec{b}$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  প্রত্যেকের উপর লম্ব। অতএব একই ভেক্টরের উপর লম্ব হওয়ায়  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  একই সমতলে অবস্থিত অর্থাৎ  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  সমতলীয়।

### 3.5.5 $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0$ হওয়ার বিভিন্ন শর্ত।

i) যদি  $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0$  হয় অর্থাৎ সামান্তরিক ঘড়তলকের ঘনফল শূন্য হবে। সুতরাং আপনারা সহজে বলতে পারেন  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  সমতলীয় হবে।

ii) ধরি  $\vec{a} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$ ,  $\vec{b} = \vec{i}b_1 + \vec{j}b_2 + \vec{k}b_3$  ও  $\vec{c} = \vec{i}c_1 + \vec{j}c_2 + \vec{k}c_3$

সুতরাং  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  সমতলীয় হওয়ার শর্ত হল

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots \dots (1)$$

iii) যদি  $\vec{a} = \vec{b}$  হয় তবে  $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0$  হবে।

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \vec{a} \cdot \vec{a} \times \vec{c}$$

এখান থেকে বলতে পারেন  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  ভেক্টর তিনটির মধ্যে যে কোন দুটি ভেক্টর সমান হলে উপরের নির্ণয়কের দুটি সারি (row) পরস্পর সদৃশ (identical) হবে। নির্ণয়কের ধর্ম অনুযায়ী বলা যায় নির্ণয়কের মান শূন্য হবে। অর্থাৎ

$$\vec{a} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{c} = 0 \text{ হবে।}$$

(দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের ধর্ম অনুযায়ীও বলা যায় অর্থাৎ  $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{c} = 0$ )

iv)  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  মধ্যে যে কোন একটি শূন্য ভেক্টর হলে উপরের নির্ণয়কের (1) একটি সারির (row) সরকাটি সংখ্যা শূন্য হবে। অতএব সেক্ষেত্রেও  $\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} = 0$  হবে।

v) যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  ও  $\vec{c}$  ভেক্টর তিনটির মধ্যে যে কোন দুটি সমান্তরাল হয় সেক্ষেত্রেও  $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0$  হবে।

প্রমাণ : মনে করি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  সমান্তরাল অর্থাৎ  $\vec{a} = n\vec{b}$  ( $n$  যে কোন স্কেলার সংখ্যা)

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = n\vec{b} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$$

$$= n(\bar{b} \times \bar{b}) \cdot \bar{c} \quad [\bar{b} \times \bar{b} = 0] \\ = 0$$

সুতরাং আপনারা বলতে পারেন যে কোন তিনটি ভেক্টরের ক্ষেলার গুণফল শূন্য হবে যদি যে কোন দুটি ভেক্টর সমান ও সমান্তরাল হয়।

vi) যদি  $\theta = 0$  হয় অর্থাৎ  $\bar{a}$  ভেক্টর এবং  $\bar{b} \times \bar{c}$  ভেক্টর দুটোর অঙ্গরত কোণটি শূন্য হবে। অন্যভাবে বলা যায়  $\bar{a}$  ভেক্টরটি  $\bar{b} \times \bar{c}$  তলের উপর লম্ব হবে। অর্থাৎ  $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = 0$  হবে।

### 3.5.6 তিনটি ভেক্টরের ক্ষেলার গুণফলের মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হওয়ার শর্ত।

i)  $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$  ধনাত্মক হবে যদি  $\theta < \frac{\pi}{2}$  হয় অর্থাৎ  $\bar{a}$  এবং  $(\bar{b} \times \bar{c})$  ভেক্টর দুটো  $\bar{b}$  ও  $\bar{c}$  দিয়ে যে তল হবে তার একই পার্শ্বে থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়  $\bar{a}$  এবং  $(\bar{b} \times \bar{c})$  ভেক্টর দুটোর অঙ্গরত কোণ সূক্ষ্মকোণ হবে।  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$  ও  $\bar{c}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ হলে  $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$  (যে কোন তিনটি ভেক্টরের ক্ষেলার গুণফল) ধনাত্মক হবে।

ii)  $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$  ঋণাত্মক হবে যদি  $\bar{a}$  এবং  $(\bar{b} \times \bar{c})$  ভেক্টর দুটো  $\bar{b}$  ও  $\bar{c}$  দিয়ে যে তল গঠিত হবে তার বিপরীত পার্শ্বে থাকবে। অন্যভাবে বলা যায়  $\bar{a}$  ও  $(\bar{b} \times \bar{c})$  এর অঙ্গরত কোণ ( $\theta$ ) স্থূল কোণ হবে অর্থাৎ ( $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ).  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$ ,  $\bar{c}$  দক্ষিণাবর্ত প্রণালীতে আবদ্ধ না থাকলেও ঋণাত্মক হবে।

### 3.5.7 তিনটি ভেক্টরের রাশির ভেক্টর গুণফল

$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c})$  একটি ভেক্টর রাশি। প্রমাণ করতে হবে

$$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = (\bar{a} \cdot \bar{c}) \bar{b} = -(\bar{a} \cdot \bar{b}) \bar{c}$$

প্রমাণ : ধরা যাক  $\bar{a} = \bar{i}a_1 + \bar{j}a_2 + \bar{k}a_3$

$$\bar{b} = \bar{i}b_1 + \bar{j}b_2 + \bar{k}b_3$$

$$\bar{c} = \bar{i}c_1 + \bar{j}c_2 + \bar{k}c_3$$

আপনারা জানেন

$$\bar{b} \times \bar{c} = (b_2c_3 - b_3c_2)\bar{i} + (b_3c_1 - b_1c_3)\bar{j} + (b_1c_2 - b_2c_1)\bar{k} \quad \dots(1)$$

$$\therefore \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = (a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}) \times (\bar{b} \times \bar{c})$$

$$\therefore \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = a_1\bar{i} \times (\bar{b} \times \bar{c}) + a_2\bar{j} \times (\bar{b} \times \bar{c}) + a_3\bar{k} \times (\bar{b} \times \bar{c}) \quad \dots(2)$$

সূতরাং সমীকরণ (2) থেকে পাই,

$$\begin{aligned}
 a_1 \vec{i} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= a_1 \vec{i} \times [(b_2 c_3 - b_3 c_2) \vec{i} + (b_3 c_1 - b_1 c_3) \vec{j} + (b_1 c_2 - b_2 c_1) \vec{k}] \\
 &= a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) \vec{i} \times \vec{i} + a_1 (b_3 c_1 - b_1 c_3) \vec{i} \times \vec{j} + a_1 (b_1 c_2 - b_2 c_1) \vec{i} \times \vec{k} \\
 &= a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) (0) + a_1 (b_3 c_1 - b_1 c_3) (\vec{k}) + a_1 (b_1 c_2 - b_2 c_1) (-\vec{j}) \\
 &\quad \vec{i} \times \vec{i} = 0; \quad \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}
 \end{aligned}$$

যেহেতু

$$\begin{aligned}
 &= a_1 c_1 (b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}) - a_1 b_1 (c_2 \vec{j} + c_3 \vec{k}) \\
 &= a_1 c_1 (b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}) + a_1 c_1 b_1 \vec{i} - [a_1 b_1 (c_2 \vec{j} + c_3 \vec{k}) + a_1 b_1 c_1 \vec{i}] \\
 &= a_1 c_1 (b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}) - a_1 b_1 (c_1 \vec{i} + c_2 \vec{j} + c_3 \vec{k}) \\
 &= a_1 c_1 \vec{b} - a_1 b_1 \vec{c} \quad \text{--- (3)}
 \end{aligned}$$

$$\text{অনুরূপভাবে আপনারা লিখতে পারেন } a_2 \vec{j} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = a_2 c_2 \vec{b} - a_2 b_2 \vec{c} \quad \text{---(4)}$$

$$\text{এবং } a_3 \vec{k} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = a_3 c_3 \vec{b} - a_3 b_3 \vec{c} \quad \text{---(5)}$$

সমীকরণ (3), (4) ও (5)-এর মান সমীকরণ (2)-এ বসিয়ে পাই

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \vec{b} - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \vec{c} \\
 &= (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} \quad \text{--- (6)}
 \end{aligned}$$

$(\vec{a} \cdot \vec{c})$  এবং  $(\vec{a} \cdot \vec{b})$  দুটো ক্ষেলার রাশি। কিন্তু  $(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b}$  এবং  $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$  দুটো ভেষ্টের রাশি।

অতএব সমীকরণ (6) থেকে সহজেই বলা যায়  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$  একটি ভেষ্টের রাশি।

অনুসিদ্ধান্ত :  $\vec{a}, \vec{b} \times \vec{c}$  দুটো ভেষ্টের ভেষ্টের গুণফল বিনিময় সূত্র মেনে চলে না। অতএব

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= -(\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a} \\
 &= -[(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}] \\
 &= (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b}
 \end{aligned}$$

সূতরাং আপনারা সহজেই একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন যে সংযোগ সূত্র (Associative law) তিনটি ভেষ্টের ভেষ্টের গুণফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ଆଲୋଚନା :

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$\vec{a}, \vec{c}$  ଏବଂ  $\vec{a}, \vec{b}$  ଉଭୟେই କ୍ଷେଳାର ରାଶି । ଅତଏବ  $\{(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}\}$  ଭେଟ୍ରଟି  $\vec{b}$  ଓ  $\vec{c}$ -ଏର ମଧ୍ୟଗମୀ ତଳେ ଅବହିତ । ସୁତରାଂ  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$  ଭେଟ୍ରଟି  $\vec{b}$  ଓ  $\vec{c}$  ଏର ମଧ୍ୟଗମୀ ତଳେ ଅବହିତ ଭେଟ୍ର । ଅନୁରାପଭାବେ ବଲା ଯାଯ  $\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a})$  ଭେଟ୍ରଟି  $\vec{c}$  ଓ  $\vec{a}$ -ଏର ମଧ୍ୟଗମୀ ତଳେ ଏବଂ  $\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b})$  ଭେଟ୍ରଟି  $\vec{a}$  ଓ  $\vec{b}$ -ର ମଧ୍ୟଗମୀ ତଳେ ଅବହିତ ।

### 3.5.8 ଚାରଟି ଭେଟ୍ରରେ କ୍ଷେଳାର ଗୁଣ (scalar product of four vectors)

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  ଚାରଟି ଭେଟ୍ରରେ  $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d})$  -କେ ଚାରଟି ଭେଟ୍ରରେ କ୍ଷେଳାର ଗୁଣଫଳ ବଲେ । ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

$$\text{ପ୍ରମାଣ : } \text{ମନେ କରି } \vec{v} = \vec{c} \times \vec{d}$$

$$\text{ଅତଏବ } (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{v}$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{v} \quad [\text{Heaviside ସୂତ୍ର ବା ସାମଞ୍ଜରିକ ସଡ଼କ୍ଷଳକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ}]$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{d})$$

$$= \vec{a} \cdot [(\vec{b} \cdot \vec{d})] \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{d}$$

$$\therefore (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$$

ଯେହେତୁ  $(\vec{b} \cdot \vec{d})$  ଓ  $(\vec{b} \cdot \vec{c})$  କ୍ଷେଳାର ରାଶି ଏବଂ  $\vec{a}, \vec{c}$  ଓ  $\vec{d}$  ଭେଟ୍ରର ରାଶି । ସେଇଜନ୍ୟ  $\vec{a}$  ଭେଟ୍ରରେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷେଳାର ଗୁଣ  $\vec{c}$  ଓ  $\vec{d}$ -ଏର ସଙ୍ଗେ ହେବେ ।

$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d})$  ଏର କ୍ଷେଳାର ଗୁଣକେ ନିୟାମକେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଯ ।

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍ } (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{c} & \vec{a} \cdot \vec{d} \\ \vec{b} \cdot \vec{c} & \vec{b} \cdot \vec{d} \end{vmatrix}$$

$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{d}$  ଏକଟି କ୍ଷେଳାର ରାଶି ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ : i)  $\vec{a} \times \vec{b}$  ଏକଟି ଭେଟ୍ରର ରାଶି ଏବଂ  $\vec{c} \times \vec{d}$  କେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଭେଟ୍ରର ରାଶି ବଲା ଯାଯ । ଅତଏବ ଦୁଟୋ ଭେଟ୍ରରେ କ୍ଷେଳାର ଗୁଣଫଳର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବଲା ଯାଯ  $[\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \times \vec{d}]$  ଏକଟି କ୍ଷେଳାର ରାଶି ।

ii) ଅନ୍ୟଭାବେ ବଲା ଯାଯ  $\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c} \times \vec{d}$  ଏକଟି କ୍ଷେଳାର ରାଶି କାରଣ  $(\vec{a} \cdot \vec{c}), (\vec{a} \cdot \vec{d}), (\vec{b} \cdot \vec{c})$  ଓ  $(\vec{b} \cdot \vec{d})$  ଅନ୍ୟେକଟିଇ କ୍ଷେଳାର ରାଶି ।

### 3.5.9 চারটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণন (Vector product of four vectors)

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  ভেক্টরের জন্য  $(\vec{a} \times \vec{b})(\vec{c} \times \vec{d})$  কে চারটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল বলে।  
 প্রমাণ করুন যে  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a} \vec{b} \vec{d}] \vec{c} - [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \vec{d}$   
 $= [\vec{a} \vec{c} \vec{d}] \vec{b} - [\vec{b} \vec{c} \vec{d}] \vec{a}$

যেখানে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  ও  $\vec{d}$  চারটি ভেক্টর রাশি।

প্রমাণঃ  $\vec{a} \times \vec{b}$  ও  $\vec{c} \times \vec{d}$  দুটি ভেক্টর রাশি হিসাবে চিহ্ন করতে পারেন। অতএব  
 $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})$ -কে আবার একটি ভেক্টর রাশি বলতে পারেন।

মনে করুন  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{p}$

অতএব  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{p} \times (\vec{c} \times \vec{d})$   
 $= (\vec{p} \cdot \vec{d}) \vec{c} - (\vec{p} \cdot \vec{c}) \vec{d}$

[ডিনটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের নিয়ম অনুসারে]

$$= (\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{d}) \vec{c} - (\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{d}$$

$$= (\vec{a} \vec{b} \vec{d}) \vec{c} - (\vec{a} \vec{b} \vec{c}) \vec{d} \quad \dots\dots(1)$$

আবার ধরি  $\vec{c} \times \vec{d} = \vec{r}$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{r}$$

$$= - \vec{r} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{r} \cdot \vec{a}) \vec{b} - (\vec{r} \cdot \vec{b}) \vec{a}$$

$$= (\vec{c} \times \vec{d} \cdot \vec{a}) \vec{b} - (\vec{c} \times \vec{d} \cdot \vec{b}) \vec{a}$$

$$= (\vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{d}) \vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{d}) \vec{a}$$

[ক্ষেপার গুণন বিনিময় সূত্র মেনে চলে]

$$\therefore (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = [\vec{a} \vec{c} \vec{d}] \vec{b} - [\vec{b} \vec{c} \vec{d}] \vec{a} \quad \dots\dots(2)$$

মন্তব্যঃ  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})$  ভেক্টরটি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর মধ্যগামী তলে কিংবা  $\vec{c}$  ও  $\vec{d}$ -এর মধ্যগামী তলে অবস্থিত।

### 3.5.10 চতুর্ভুক্তকের ঘনফল (Volume of tetrahedron)

প্রমাণ করুন যে

ABCD চতুর্ভুক্তকের আয়তন বা ঘনফল


$$= \frac{1}{6} [\vec{AB} \cdot \vec{AC} \times \vec{AD}]$$

প্রমাণ :

আপনারা জানেন ABCD চতুর্ভুজকের ঘনফল  
 $= \frac{1}{3} (\text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল}) (\text{ABC তল থেকে D বিন্দুর  
 উচ্চতা})$

যদি  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$  ও  $\vec{AD}$  তিনটি সরলরেখা A বিন্দুগামী  
 এবং সামান্তরিক ষড়ভুজকের বাহু হয় তবে সামান্তরিক  
 ষড়ভুজকের ঘনফল =  $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD})$  হবে।

অতএব ABCD চতুর্ভুজকের ঘনফল



চিত্র 3.27

$$= \frac{1}{3} (\text{ত্রিভুজাকৃতি প্রিজমের ঘনফল যার ভূমি ABC তল এবং শীর্ষবিন্দু D})$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) (\text{ABCD সামান্তরিক ষড়ভুজকের ঘনফল যার } \vec{AB}, \vec{AC} \text{ ও } \vec{AD} \text{ সমিহিত বাহু})$$

$$= \frac{1}{6} (\vec{AB} \cdot \vec{AC} \times \vec{AD}) [\text{তিনটি ভেসের ক্ষেত্রের গুণফলের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা থেকে}]$$

উদাহরণ : 11. মান নির্ণয় করুন

$$(\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) \times (2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}) \cdot (\vec{j} + \vec{k})$$

$$\text{সমাধান : } (\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) \times (2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}) \cdot (\vec{j} + \vec{k})$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(1+1) + 2(3+2) + 0(2-3)$$

$$= 2 + 10 = 12$$

উদাহরণ 12. তিনটি ভেসের ভেসের গুণফল নির্ণয় করুন। যদি  $\vec{a} = (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$ ,  $\vec{b} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$   
 এবং  $\vec{c} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$

সমাধান : আমরা জানি

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$\begin{aligned}
&= \{(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\vec{j} + \vec{k})\} (2\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}) - \{(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k})\} (2\vec{j} + \vec{k}) \\
&= (-2+1)(2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) - (2+3-1)(2\vec{j} + \vec{k}) \\
&= -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} - 8\vec{j} - 4\vec{k} \\
&= -2\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k} \\
&= -(2\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k})
\end{aligned}$$

**উদাহরণ 13.** দেখান যে তিনটি ভেক্টর  $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ ,  $\vec{b} = 4\vec{i} + \vec{j}$ ,  $\vec{c} = 3\vec{i} + \vec{k}$  সমতলীয় হবে।

সমাধান : আপনারা জানেন তিনটি ভেক্টর সমতলীয় হওয়ার শর্ত হল

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0 \text{ হবে।}$$

$$\text{অতএব } (2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (4\vec{i} + \vec{j}) \times (3\vec{i} + \vec{k}) = 0 \text{ হবে।}$$

$$\text{সূতরাং } (2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (4\vec{i} + \vec{j} + 0\vec{k}) \times (3\vec{i} + 0\vec{j} + \vec{k})$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(1-0) - 1(3.0 - 4) + 2(4.0 - 1.3)$$

$$= 2 + 4 - 6 = 0 \text{ অতএব } \vec{a}, \vec{b} \text{ ও } \vec{c} \text{ ভেক্টর তিনটি সমতলীয়।}$$

**উদাহরণ 14.** O বিন্দুর সাপেক্ষে A, B, C বিন্দু তিনটির অবস্থান ভেক্টর যদি  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  হয় তবে দেখান যে  $\{\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b}\}$ , ABC তলের উপর লম্ব হবে।

সমাধান : মনে করি  $\vec{d} = \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b}$

O কে মূলবিন্দু ধরি।

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{b} - \vec{a}$$

$$\text{অতএব } \vec{AB} \cdot \vec{d} = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$$

$$= \vec{b} \cdot \vec{b} \times \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{a} \times \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\text{যেহেতু } \vec{b} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} \times \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{a} \times \vec{b} = 0$$

$$\text{অতএব } \vec{AB} \cdot \vec{d} = \vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$$

$$= \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = 0$$

অতএব ক্ষেত্রের শুণফলের সংজ্ঞার শর্ত অনুসারে বলা যায়

ভেক্টর  $\vec{d}$ ,  $\vec{AB}$  ভেক্টরের উপর লম্ব অর্থাৎ  $\vec{d}$  ভেক্টরটি ABC ত্রিভুজের  $\vec{AB}$  বাহর উপর লম্ব।

অনুরূপে প্রমাণ করা যায়  $\vec{c}$  ভেক্টরটি ABC ত্রিভুজের  $\vec{CA}$  ও  $\vec{BC}$  বাহর উপর লম্ব। অতএব খুব সহজেই আপনারা বলতে পারেন  $\vec{a}$  ভেক্টরটি ABC তলের উপর লম্ব। অর্থাৎ  $(\vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} + \vec{a} \times \vec{b})$  ভেক্টরটি ABC তলের উপর লম্ব প্রমাণিত হল।

**উদাহরণ :** 15. যদি  $\vec{\alpha} = (2, -10, 2)$ ,  $\vec{\beta} = (3, 1, 2)$  এবং  $\vec{\gamma} = (2, 1, 3)$  হয় তবে  $\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma})$  নির্ণয় করুন।  $\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma})$ -এর মান থেকে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিন।

$$\text{সমাধান : } \vec{\alpha} = 2\vec{i} - 10\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{\beta} = 3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k} \text{ এবং } \vec{\gamma} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\therefore \vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma} &= (2\vec{i} - 10\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}) \\ &= (2)(2) - (10)(1) + (2)(3) \\ &= 4 - 10 + 6 = 0 \quad \dots \dots (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} &= (2\vec{i} - 10\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= (2)(3) - (10)(1) + (2)(2) \\ &= 6 - 10 + 4 \\ &= 0 \quad \dots \dots (2)\end{aligned}$$

আপনারা জানেন

$$\begin{aligned}\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) &= (\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma})\vec{\beta} - (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma} \\ &= (0)\vec{\beta} - (0)\vec{\gamma} = 0\end{aligned}$$

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

যেহেতু  $\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma} = 0$  এখান থেকে আপনারা বলতে পারেন ভেক্টর  $\vec{\alpha}$ , ভেক্টর  $\vec{\gamma}$ -এর উপর লম্ব।

$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$  অনুরূপে বলা যায়  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$  উপর লম্ব।

সুতরাং  $\vec{\alpha}$  ভেক্টর  $\vec{\beta}$  ও  $\vec{\gamma}$  উভয়ের উপর লম্ব। সুতরাং  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$  ও  $\vec{\gamma}$  সমতলীয় ভেক্টর।

**উদাহরণ :** 15. প্রমাণ করুন যে

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \text{ সম্বন্ধটির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কি?}$$

**সমাধান :** আপনারা তিনটি ভেক্টরের ভেক্টর শুণফলের যে সূত্র পেয়েছেন সেই অনুসারে লিখতে পারেন

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \quad \dots \dots (1)$$

$$\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{b} \cdot \vec{a})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$$

$$= (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} \quad \dots \dots (2)$$

[বিনিময় সূত্র অনুযায়ী]

$$\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{c} \cdot \vec{b})\vec{a} - (\vec{c} \cdot \vec{a})\vec{b}$$

$$= (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} \quad \dots \dots (3)$$

এখন সমীকরণ (1), (2) এবং (3) যোগ করে পাই

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$= (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} + (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} + (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}$$

$$= 0$$

অতএব এই সম্পর্কটি থেকে সহজেই বলা যায়  $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ ,  $\vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a})$ ,  $\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b})$

ভেক্টর তিনটি পরস্পর রৈখিক সম্বন্ধযুক্ত (linearly dependent) অতএব ভেক্টর তিনটি সমতলীয়।

### অনুশীলনী- C

17. যদি  $\vec{\alpha} = (-2, -2, 4)$ ,  $\vec{\beta} = (-2, 4, -2)$  এবং  $\vec{\gamma} = (4, 2, -2)$  হয় তবে  $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} \times \vec{\gamma}$  নির্ণয় করুন এবং জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিন।

18. যদি  $\vec{A} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ ,  $\vec{B} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$  এবং  $\vec{C} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$  হয় তবে

a)  $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$ , b)  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$  নির্ণয় করুন।

19. চারটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল নির্ণয় করুন

$$[(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}) \times (\vec{i} - \vec{k})] \times [(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \times (\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k})]$$

20. ABCD চতুর্ভুক্তের ঘনফল নির্ণয় করুন যার শীর্ষবিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $(0, 1, 2)$ ,  $(3, 0, 1)$ ,  $(4, 3, 6)$  এবং  $(2, 3, 2)$

21. প্রমাণ করুন যে

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) = (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c})^2$$

22.  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})$  এর বিস্তার থেকে  $[\vec{b} \vec{c} \vec{d}] \vec{a} + [\vec{c} \vec{a} \vec{d}] \vec{b} + [\vec{a} \vec{b} \vec{d}] \vec{c} + [\vec{b} \vec{a} \vec{c}] \vec{d} = 0$  সম্পর্কটি নির্ণয় করুন।

এই এককের সমস্ত আলোচনা সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করি তবে আপনাদের পক্ষে অক্ষ সমাধান করা ও ভেট্টের শুণনের বিভিন্ন ধর্ম মনে রাখা সহজ হবে।

i.  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  যদি দুটি ভেট্টের রাশি হয় তবে  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos\theta \dots\dots (1)$  যেখানে  $\theta$  হল  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$ -এর অঙ্গীকৃত কোণ।

সমীকরণ (1) থেকে লেখা যায়

$$(1) \theta = \cos^{-1} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \text{ যেখানে } \vec{a}-\text{এর মাপাঙ্ক } |\vec{a}|$$

$$\vec{b} \quad " \quad |\vec{b}|$$

ii)  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  হয়  $\vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0$

অতএব  $\vec{a}, \vec{b}$ -এর উপর লম্ব হবে।  $\theta = \frac{\pi}{2}$  হবে।

iii)  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$  হয়।  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  একটি ক্ষেলার রাশি।

iv)  $\vec{a}, \vec{b}$  ও  $\vec{c}$  তিনটি ভেট্টের রাশি হয় তবে  $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$  হবে।

v)  $\vec{i}, \vec{j}$  ও  $\vec{k}$  তিনটি পরম্পরাগত ভেট্টের হয় তবে

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \text{ হবে।}$$

যদি  $\vec{a} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$

$$\vec{b} = \vec{i}b_1 + \vec{j}b_2 + \vec{k}b_3 \text{ হয়}$$

তবে  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$  হবে।

ভেট্টের  $\vec{a}$ -এর মাপাঙ্ক  $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

ভেট্টের  $\vec{b}$       "       $\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

$\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  পরম্পরাগত হয় অর্থাৎ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  হয় তবে

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0 \text{ হবে।}$$

$$2. i) \text{ দুটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফল} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta \vec{n}$$

$\vec{n}$  এমন একটি একক ভেক্টর যা  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  মধ্যগামী সমতলের উপর লম্ব।  $\vec{a} \times \vec{b}$  একটি ভেক্টর রাশি।

$$ii) \vec{a} \text{ ও } \vec{b} \text{ পরস্পর সমান্তরাল ও সমরেখ হলে } \vec{a} \times \vec{b} = 0 \text{ হবে, অর্থাৎ } \theta = 0 \text{ বা } \pi \text{ হবে।}$$

$$iii) \vec{a} \text{ ও } \vec{b} \text{ যদি কোন ত্রিভুজের দুটি বাহু নির্দেশ করে। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

আবার  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  যদি কোন সামান্তরিকের দুটি বাহু নির্দেশ করে তবে

$$\text{সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$iv) \text{ ভেক্টর গুণনে বিনিময় সূত্র ও সংযোগসূত্র প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ } |\vec{a} \times \vec{b}| = -\vec{b} \times \vec{a}.$$

ভেক্টর গুণন দক্ষিণাবর্ত প্রণালী মেনে চলে।

$$v) \vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0,$$

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}.$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$3. i) \vec{a}, \vec{b} \text{ ও } \vec{c} \text{ তিনটি ভেক্টর হলে } \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} \text{ তিনটি ভেক্টরের ক্ষেত্রফল গুণন চিহ্নিত করে।}$$

ii) তিনটি ভেক্টরের ক্ষেত্রফল গুণনে চক্র বিন্যাসে কোন মানের পরিবর্তন হয় না। যদি বিপরীত চক্রবিন্যাস করা যায় তবে মানের কোন পরিবর্তন না কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়।

$$iii) \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} \text{ সামান্তরিক ঘড়তলকের ঘনফল সূচিত করে।}$$

$$iv) \vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$v) \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$$

### 3.7 বিবিধ প্রশ্নমালা

- O বিন্দুর সাপেক্ষে P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $3\vec{i} + 7\vec{j} - 4\vec{k}$  এবং  $6\vec{i} - 2\vec{j} + 12\vec{k}$  হলে  $\vec{OP}$  ও  $\vec{OQ}$  ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোণ নির্ণয় করুন।

- প্রমাণ করুন :  $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
- এমন একটি ভেস্টর দির্ঘ্য করুন যেটা  $= 4\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$  এবং  $\vec{B} = \vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$   
প্রত্যেকের উপর লম্ব এবং  $\vec{c} \cdot \vec{v} = 21$  যেখানে  $\vec{v} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - 4\vec{k}$  হবে।
- প্রমাণ করুন  

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$
- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{v}, \text{ ও } \vec{d}$  এই চারটি ভেস্টর এমনভাবে আছে যে  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{v} \times \vec{d}$  এবং  $\vec{a} \times \vec{v} = \vec{b} \times \vec{d}$  হয় তবে প্রমাণ করুন যে  $(\vec{a} - \vec{d})$  এবং  $(\vec{b} - \vec{v})$  ভেস্টর দুটি সমরেখ হবে।
- ভেস্টর পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করুন যে কোন দুটি সামান্যরিক একই ভূমি এবং একই সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে অবস্থিত হলে সামান্যরিক দুটির ক্ষেত্রফল একই হবে।
- $P$  ও  $Q$ -এর অবস্থান ভেস্টর যথাক্রমে  $\vec{i} + 3\vec{j} - 7\vec{k}$  এবং  $5\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$  হলে  $\vec{PQ}$  নির্ণয় করুন এবং  $\vec{PQ}$ -এর কোসাইন দিগন্ত গোষ্ঠী নির্ণয় করুন।
- একটি একক ভেস্টর নির্ণয় করুন যা  $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$  এবং  $\vec{b} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$  প্রতিটির উপর লম্ব এবং  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  অস্তর্গত কোণের মান নির্ণয় করুন।
- প্রমাণ করুন  

$$(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{a} \times \vec{d}) + (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot (\vec{b} \times \vec{d}) + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = 0$$
- প্রমাণ করুন  

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) \vec{a}$$

### 3.8 সমাধান/উত্তরমালা

অনুশীলনী – A

- সংকেত :  $\vec{a}$ -এর সমদিক বরাবর একক ভেস্টর  $= \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$   
 $\vec{b}$ -এর উপাংশ -র দিক বরাবর  $= \vec{b} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$   
 $\therefore \vec{b}$ -এর উপাংশ ভেস্টর  $\vec{a}$ -এর দিক বরাবর  
 $= (\vec{b}$ -এর উপাংশ  $\vec{a}$ -এর দিক বরাবর)  $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
- উত্তর  $-\sqrt{2}$   
 $-(\vec{j} + \vec{k})$
- উত্তর a) -3, b) 6

3. সংকেত  $\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos\theta$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

উত্তর  $\cos^{-1} \frac{4}{21}$

4. সংকেত :  $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$  হবে যদি  $\vec{A} \perp \vec{B}$  হয়।

উত্তর  $\alpha = 3$

5. সংকেত : প্রথমে দেখাতে হবে ভেষ্টের তিনটি একটি ত্রিভুজ গঠন করে।


i) যে কোন দুটি ভেষ্টের যোগফল তৃতীয় ভেষ্টেরটির সমান হবে।

ii) তিনটি ভেষ্টের যোগফল শূন্য হবে। তারপর  $\vec{A} \cdot \vec{B}$ ,  $\vec{B} \cdot \vec{C}$  ও  $\vec{A} \cdot \vec{C}$  নির্ণয় করলেই দেখা যাবে যে কোন একটি ক্ষেলার গুণফলের মান শূন্য হয়েছে। অর্থাৎ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  হবে।

### 7. সমাধান

$ABCD$  একটি রম্বাস সূতরাং

$$\begin{aligned}\vec{AC} \cdot \vec{BD} &= (\vec{AB} + \vec{BC}) \cdot (\vec{AD} - \vec{AB}) \\ &= (\vec{AB} + \vec{AD}) \cdot (\vec{AD} - \vec{AB}) \\ [\because \vec{AD} &= \vec{BC}] \\ &= \vec{AD} \cdot \vec{AD} - \vec{AB} \cdot \vec{AB} \\ &= |\vec{AD}|^2 - |\vec{AB}|^2 \\ &= |\vec{AD}|^2 - |\vec{AD}|^2 \\ &= 0\end{aligned}$$



চিত্র 3.30

সূতরাং  $\vec{AC}, \vec{BD}$

উপর লম্ব অর্থাৎ রম্বাসের কর্ণদ্বয়  $\vec{AC}$  ও  $\vec{BD}$  পরস্পরে সমকোণে ছেদ করবে।

### 8. সমাধান

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (4\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}) - (2\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}) \\ &= (2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})\end{aligned}$$

$$\vec{BC} = (3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}) - (4\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}) \\ = -\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{CA} = (2\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}) - (3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}) \\ = -\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = (2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}) + (-\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) \\ \therefore A, B, C \text{ শীর্ষবিন্দু তিনটি } ABC \text{ ত্রিভুজ গঠন করে।}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = (2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (-\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}) \\ = -2 + 1 - 8 = -9$$

14.  $\vec{OP} = \vec{i} OP \cos A + \vec{j} OP \sin A$

$$\vec{OQ} = \vec{i} OQ \cos B - \vec{j} OQ \sin B$$

$\vec{OQ} \times \vec{OP}$  বার করুন। তারপর

$|\vec{OP} \times \vec{OQ}|$  নির্ণয় করুন।

15.  $\vec{AB} = (2\vec{i} + 3\vec{j}) - (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

$$= \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{CD} = (\vec{k} - \vec{j}) - (3\vec{i} + 5\vec{j} - 2\vec{k})$$

$$= -3\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k} = -3(\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$$

$$= (-3)\vec{AB}$$


অতএব  $\vec{AB}$  ও  $\vec{CD}$  সরলরেখা দুটি সমান্তরাল।

16.  $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}, \vec{AC} = \vec{c} - \vec{a}$

অতএব  $ABC$  ত্রিভুজের ভেক্টর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} (\vec{AB} \times \vec{AC})$$

$$= \frac{1}{2} [(\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a})]$$



চিত্র 3.12

$$= \frac{1}{2} [\vec{b} \times \vec{c} - \vec{b} \times \vec{a} - \vec{a} \times \vec{c} + \vec{a} \times \vec{a}]$$

$$= \frac{1}{2} [\vec{b} \times \vec{c} + \vec{a} \times \vec{b} + \vec{c} \times \vec{a}]$$

যেহেতু  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

$$\vec{c} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{c}$$

$$\vec{a} \times \vec{a} = 0$$

$$\vec{BC} \cdot \vec{CA} = -9$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{CA} = (2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (-\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) \\ = -2 - 2 + 4 = 0$$

চিত্র 3.30

সূতরাং ABC ত্রিভুজের  $\angle BAC$  কোণ সমকোণ অতএব ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

### অনুশীলনী -B

9.  $\vec{\alpha}, \vec{\beta} = 0$  সূতরাং  $\vec{\alpha}$  ও  $\vec{\beta}$ -এর অঙ্গৰ্হণ কোণ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  হবে, অতএব  $|\vec{\alpha} \times \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| |\vec{\beta}| \sin \theta$   
 $= (8)(6)(1) = 48$

10.  $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$   
 $= -\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}$



11. একক ভেক্টর  $= \frac{\vec{\alpha} \times \vec{\beta}}{|\vec{\alpha} \times \vec{\beta}|} = \frac{1}{\sqrt{155}} (5\vec{j} + 11\vec{k} - 3\vec{i})$

$$\theta = \sin^{-1} \left( \frac{155}{156} \right)^{\frac{1}{2}} \quad [|\vec{\alpha} \times \vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| |\vec{\beta}| \sin \theta]$$

12.  $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & -6 & 2 \end{vmatrix}, 7\vec{c} = 7(6\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k})$

13. ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B, C-এর অবস্থান  
 ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  সূতরাং  $\vec{AB}$  ও  $\vec{BC}$   
 বার করুন।

ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন। এখন D,



চিত্র 3.29

E ও F-এর অবস্থান ভেট্টের নির্ণয় করুন। একই পদ্ধতিতে DEF ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

### অনুশীলনী-C

17. উভয়  $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \times \vec{\gamma} = 0$  ভেট্টের তিনটি সমতলীয় হবে।

18. উভয়  $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = 24\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k}$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = 15\vec{i} + 15\vec{j} - 15\vec{k}$$

সমাধান  $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}$

$$\therefore (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = (-\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}) \times (\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 7 & 5 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 24\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k}$$

অনুরাগে প্রথমে  $\vec{B} \times \vec{C}$  নির্ণয় করুন তারপর  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$  নির্ণয় করুন।

19. উভয়  $\vec{i} + 16\vec{j} - 7\vec{k}$

সংকেত : প্রথমে 1)  $(3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}) \times (\vec{i} - \vec{k})$  নির্ণয় করুন

2)  $(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \times (\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k})$  নির্ণয় করুন

এখন এই দুটো ফলের ভেট্টের গুণফল নির্ণয় করলেই হয়ে যাবে।

20. ABCD চতুর্ভুক্তকের ঘনফল = 6 একক। সংকেত : ABCD চতুর্ভুক্তকের ঘনফল।

$$= \frac{1}{6} |\vec{AB} \times \vec{AC} \cdot \vec{AD}|$$

$\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AC}$ , নির্ণয় করুন।

$$\vec{AB} = (3\vec{i} + \vec{k}) - (\vec{j} + 2\vec{k})$$

21. সমাধান

মনে করুন  $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{m}$

$$\begin{aligned}
& \text{সূতরাঃ } \vec{a} \times \vec{b}, \vec{m} \times (\vec{c} \times \vec{a}) \\
&= \vec{m} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b}) \\
&= \vec{m} \left[ \{(\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}\} \vec{a} - \{(\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{a}\} \vec{b} \right] \\
&= (\vec{m} \cdot \vec{a}) (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} - (\vec{m} \cdot \vec{b}) (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{a} \\
&= (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} - (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{b} (0) \quad [:: \vec{c} \times \vec{a} \cdot \vec{a} = 0] \\
&= (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} \\
&= (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}) \\
&= (\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c})^2 \text{ প্রমাণিত হল।}
\end{aligned}$$

## 22. সমাধান

$$\begin{aligned}
& \text{মনে করুন } (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{m} \\
& (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) = \vec{m} \times (\vec{c} \times \vec{d}) \\
&= (\vec{m} \cdot \vec{d}) \vec{c} - (\vec{m} \cdot \vec{c}) \vec{d} \\
&= (\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{d}) \vec{c} - (\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}) \vec{d} \\
&= (\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{d}) \vec{c} + (\vec{b} \cdot \vec{a} \times \vec{c}) \vec{d} \quad [:: \vec{c} \times \vec{a} = - \vec{a} \times \vec{c}] \\
&= [\vec{a} \vec{b} \vec{d}] \vec{c} + [\vec{b} \vec{a} \vec{c}] \vec{d}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{আবার মনে করুন } \vec{c} \times \vec{d} = \vec{n} \text{ হয় তবে } (\vec{a} \times \vec{b}) \vec{n} = - \vec{n} \times (\vec{a} \times \vec{b}) \\
&= (\vec{n} \cdot \vec{a}) \vec{b} - (\vec{n} \cdot \vec{b}) \vec{a} \\
&= (\vec{c} \times \vec{d} \cdot \vec{a}) \vec{b} - (\vec{c} \times \vec{d} \cdot \vec{b}) \vec{a} \\
&= (\vec{c} \cdot \vec{d} \times \vec{a}) \vec{b} - [\vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{d}] \vec{a} \\
&= - [\vec{c} \cdot \vec{a} \times \vec{d}] \vec{b} - [\vec{b} \cdot \vec{c} \times \vec{d}] \vec{a} \\
&= - [\vec{c} \vec{a} \vec{d}] \vec{b} - [\vec{b} \vec{c} \vec{d}] \vec{a} \quad \text{-----(2)}
\end{aligned}$$

সমীকরণ (1) ও (2) থেকে লিখতে পারি

$$[\bar{a} \bar{b} \bar{d}] \bar{c} + [\bar{b} \bar{a} \bar{c}] \bar{d} = -[\bar{c} \bar{a} \bar{d}] \bar{b} - [\bar{b} \bar{c} \bar{d}] \bar{a}$$

$$\text{বা } [\bar{a} \bar{b} \bar{d}] \bar{c} + [\bar{b} \bar{a} \bar{c}] \bar{d} + [\bar{c} \bar{a} \bar{d}] \bar{b} + [\bar{b} \bar{c} \bar{d}] \bar{a} = 0 \text{ প্রমাণিত হল।}$$

### বিবিধ প্রশ্নালার সমাধান

$$1. \vec{OP} = 3\vec{i} + 7\vec{j} - 4\vec{k}, \vec{OQ} = 6\vec{i} - 2\vec{j} + 12\vec{k},$$

$$\therefore \vec{OP} \cdot \vec{OQ} = |\vec{OP}| |\vec{OQ}| \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{(3)(6) + 7(-2) + (-4)(12)}{\sqrt{3^2 + 7^2 + (-4)^2} \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 12^2}}$$

$$= \frac{-44}{\sqrt{74}} \frac{1}{\sqrt{184}}$$

### 2. সমাধান

মনে করি  $\vec{i}, \vec{j}$  একক ভেট্টের দুটি যথাক্রমে x অক্ষ এবং y অক্ষ দিক বরাবর। মনে করি xy তলে  $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$  ভেট্টের দুটি x অক্ষের সঙ্গে যথাক্রমে  $\alpha$  ও  $\beta$  কোণে নত।

$$\text{সূতরাং } \angle AOB = \alpha - \beta$$

মনে করি  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  দুটি একক ভেট্টের xy তলে অবস্থিত।

$$\text{সূতরাং } \vec{a} = \vec{i} \cos\alpha + \vec{j} \sin\alpha$$

$$\vec{b} = \vec{i} \cos\beta + \vec{j} \sin\beta$$

দুটি একক ভেট্টেরের ক্ষেত্রের শৃণফলের সংজ্ঞানুসারে

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\angle AOB)$$


$$= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\alpha - \beta)$$

$$= \cos(\alpha - \beta)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{i} \cos\alpha + \vec{j} \sin\alpha) \cdot (\vec{i} \cos\beta + \vec{j} \sin\beta)$$

$$= \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$

$$\therefore \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$



চিত্র 3.31

3. সংকেত : মনে করি  $\vec{d} = \vec{i}a_1 + \vec{j}a_2 + \vec{k}a_3$

প্রশ্নানুসারে  $\vec{\alpha} \cdot \vec{d} = \vec{\beta} \cdot \vec{d} = 0$  হবে।

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{d} = 0, \vec{\beta} \cdot \vec{d} = 0, \vec{d} \cdot \vec{\gamma} = 21$$

নির্ণয় করুন। অতএব তিনটি সমীকরণ গঠন হবে।  $a_1, a_2, a_3$ -এর মান নির্ণয় করুন।

উত্তর  $\vec{d} = 7\vec{i} - 7\vec{j} - 7\vec{k}$

4. সংকেত : চির 3.33 লক্ষ্য করুন। অক্টি (2) এর অনুরূপে করা যাবে। এক্ষেত্রে  $|\vec{a} \times \vec{b}|$  নির্ণয় করতে হবে।

5. সমাধান

$$\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\gamma} \times \vec{d} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$\vec{\alpha} \times \vec{\gamma} = \vec{\beta} \times \vec{d} \quad \dots \dots \dots (2)$$

সমীকরণ (2) থেকে সমীকরণ (1) বিয়োগ করলে পাই,

$$\vec{\alpha} \times \vec{\gamma} - \vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\beta} \times \vec{d} - \vec{\gamma} \times \vec{d}$$

$$\vec{\alpha} \times (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) = (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) \times \vec{d} = -\vec{d} \times (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) = \vec{d} \times (\vec{\gamma} - \vec{\beta})$$

$$\therefore \vec{\alpha} \times (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) - \vec{d} \times (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) = 0$$

$$\text{বা } (\vec{\alpha} - \vec{d}) \times (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) = 0$$

অতএব  $(\vec{\alpha} - \vec{d})$  এবং  $(\vec{\gamma} - \vec{\beta})$  ভেষ্টের দুটির ভেষ্টের গুণফল শূন্য। সুতরাং  $(\vec{\alpha} - \vec{d})$  এবং  $(\vec{\gamma} - \vec{\beta})$  ভেষ্টের দুটি সমরেখ হবে।

6. সংকেত :  $\vec{a}$  ও  $\vec{b}$  একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু।  $\vec{a}$  ও  $\vec{c}$  অপর সামান্তরিকের দুটি বাহু। প্রমাণ করুন  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$

7. O বিন্দুকে মূলবিন্দু ধরি। সুতরাং  $\vec{OP} = \vec{i} + 3\vec{j} - 7\vec{k}$  এবং  $\vec{OQ} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$  হয়

$$\begin{aligned} \text{তবে } \vec{PQ} &= \vec{OQ} - \vec{OP} = (5\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}) - (\vec{i} + 3\vec{j} - 7\vec{k}) \\ &= 4\vec{i} - 5\vec{j} + 11\vec{k} \end{aligned}$$

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{4^2 + 5^2 + 11^2} = \sqrt{162}$$

অতএব  $\vec{PQ}$  সরলরেখার কোসাইন দিগন্তগোষ্ঠী

$$\left[ \frac{4}{9\sqrt{2}}, \frac{-5}{9\sqrt{2}}, \frac{11}{9\sqrt{2}} \right]$$

8. সংকেত :

$$\text{একক ডেস্ট্র } = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

প্রথমে  $\vec{a} \times \vec{b}$  নির্ণয় করুন। তারপর ডেস্ট্রটির মাপাঙ্ক নির্ণয় করুন। এখন একক ডেস্ট্রটি নির্ণয় করুন।

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin\theta$$

$$\sin\theta = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \text{ নির্ণয় করুন।}$$

উভয় :  $\frac{1}{\sqrt{155}} (5\vec{j} + 11\vec{j} - 3\vec{i})$ ,  $\sin^{-1} \left( \frac{155}{156} \right)^{\frac{1}{2}}$

## একক ৪ : ভেষ্টরের জ্যামিতিক প্রয়োগ

### গঠন

- 4.1 প্রস্তাবনা
- 4.2 উদ্দেশ্য
- 4.3 জ্যামিতিতে ভেষ্টরের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ এবং সরলরেখা ও সমতলের ভেষ্টের সমীকরণ নির্ণয় ও বিভিন্ন উপপাদ্যের প্রয়োগ।
- 4.4 জ্যামিতিতে দুই বা ততোধিক ভেষ্টরের ক্ষেত্রার শৃঙ্খলা ও ভেষ্টের শৃঙ্খলের প্রয়োগ।
- 4.5 জ্যামিতিতে ভেষ্টরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সম্বন্ধীয় বিস্তারিত উদাহরণ।
- 4.6 সারাংশ
- 4.7 সর্বশেষ পঞ্চাবলী

## 4.1 প্রস্তাবনা

পূর্বের এককগুলিতে [EMT-04, Block-I, Unit-01, 02, 03] ভেষ্টরের প্রক্রিয়া, দুটি ভেষ্টরের ক্ষেত্রের গুণন ও ভেষ্টর গুণন আলোচিত হয়েছে। তিনি বা ততোধিক ভেষ্টরের ক্ষেত্রের গুণন ও ভেষ্টর গুণনও আলোচিত হয়েছে।

এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সমীকরণগুলি কিভাবে সহজে লেখা যায় তা এই বর্তমান এককে আলোচনা করা হয়েছে।

## 4.2 উদ্দেশ্য


এই এককটি পড়লে আপনি ভেষ্টরের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সরলরেখার ভেষ্টর সমীকরণ এবং দুটি সরলরেখার অন্তর্গত কোণের সমন্বিতগুক সংক্রান্ত উপপাদ্যগুলির প্রমাণ করতে পারবেন।

## 4.3 জ্যামিতিতে ভেষ্টরের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োগ

### 4.3.1 সরলরেখার ভেষ্টর সমীকরণ নির্ণয় :

(ক) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং একটি প্রদত্ত ভেষ্টরের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় (গ্রচল আকার)

মনে করি A একটি প্রদত্ত বিন্দু যার মূলবিন্দু O-এর সাপেক্ষে অবস্থান ভেষ্টর  $\bar{a}$  এবং  $\bar{b}$  প্রদত্ত ভেষ্টর। মনে করি P নির্ণেয় সরলরেখাটির উপর যে কোনও একটি বিন্দু। O-এর সাপেক্ষে P-এর অবস্থান ভেষ্টর হল  $\bar{r}$ । যেহেতু ভেষ্টর  $\vec{AP}$  ভেষ্টর  $\bar{b}$ -এর সমান্তরাল সূতরাং  $\vec{AP} = t\bar{b}$ , যেখানে  $t$  একটি ক্ষেত্রের সংখ্যা।



চিত্র-1

$$\text{নঃ চিত্র হতে } \vec{OA} = \bar{a}, \vec{OP} = \bar{r}$$

$$\therefore \vec{AP} = \vec{OP} - \vec{OA} = \bar{r} - \bar{a}$$

$$\therefore \bar{r} - \bar{a} = t\bar{b} \quad \therefore \bar{r} = \bar{a} + t\bar{b} \quad \text{-----(1)}$$

এই সমীকরণটি হতে  $t$ -এর বিভিন্ন মানের জন্য সরলরেখাটির উপর গতিশীল বিন্দু  $P$ -এর অবস্থান ডেক্টর পাওয়া যায়। সূতরাং এই সমীকরণটি হল নির্ণয় সরলরেখাটির ডেক্টর সমীকরণ।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : নির্ণয় সরলরেখাটি মূলবিন্দুগামী হলে তার ডেক্টর সমীকরণ হবে  $\bar{r} = t\bar{b}$ .

$$[\bar{a} = 0]$$

বিঃ স্বঃ 1নং সমীকরণকে  $\bar{r} \times \bar{b} = \bar{a} \times \bar{b}$  এই আকারেও লেখা যায়।

অনুসিদ্ধান্ত (2) : O বিন্দুগামী কোন সমকোণীক অক্ষগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে P এবং A-এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(x, y, z)$  ও  $(a_1, a_2, a_3)$  এবং  $\bar{b} = (b_1, b_2, b_3)$  হলে (1) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়।

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + t(b_1, b_2, b_3)$$

$$\text{অথবা } (x - a_1, y - a_2, z - a_3) = t(b_1, b_2, b_3) = (tb_1, tb_2, tb_3)$$


$$\therefore \frac{x - a_1}{b_1} = \frac{y - a_2}{b_2} = \frac{z - a_3}{b_3} = t$$

এটি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে  $(a_1, a_2, a_3)$  স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট বিন্দুগামী একটি সরলরেখার সমীকরণ ও এটির কোসাইন দিগন্কগোষ্ঠী (direction cosines) হলে  $(b_1, b_2, b_3)$ ।

(খ) প্রদত্ত দুইটি বিন্দুগামী একটি সরলরেখার ডেক্টর সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি A ও B দুটি প্রদত্ত বিন্দু (চিত্র-2) যাদের মূলবিন্দু O-এর সাপেক্ষে অবস্থান ডেক্টর যথাক্রমে  $\bar{a}$  এবং  $\bar{b}$ । মনে করি AB সরলরেখার উপর P যে কোনও একটি বিন্দু যার অবস্থান ডেক্টর O-এর সাপেক্ষে হল  $\bar{r}$ ।  $\therefore \overline{OA} = \bar{a}, \overline{OB} = \bar{b}, \overline{OP} = \bar{r}$

$$\therefore \overline{AB} = \bar{b} - \bar{a}, \overline{AP} = \bar{r} - \bar{a}$$



যেহেতু  $\overline{AP}$  এবং  $\overline{AB}$  সমরেখ ডেক্টর (collinear vectors) সূতরাং আমরা লিখতে পারি

চিত্র-2

$$\overline{AP} = t \overline{AB}$$

$$\therefore \bar{r} - \bar{a} = t(\bar{b} - \bar{a})$$

$$\therefore \bar{r} = \bar{a} + t(\bar{b} - \bar{a}) = (1 - t)\bar{a} + t\bar{b}$$

$$\text{অর্থাৎ } \boxed{\bar{r} = (1 - t)\bar{a} + t\bar{b}} \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{অথবা } \vec{r} = s\vec{a} + t\vec{b} \quad \dots\dots (3)$$

যেখানে  $s = 1 - t$ ,  $t$  একটি ক্ষেত্রের সংখ্যা।

(2) নং সমীকরণ অথবা (3) নং সমীকরণ হল নির্ণেয় সরলরেখাটির ভেট্টের সমীকরণ।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : (3) নং সমীকরণকে লেখা যায়

$$\vec{r} = s\vec{a} + t\vec{b} \text{ অর্থাৎ } \vec{r} - s\vec{a} + t\vec{b} = 0,$$

এখানে  $\vec{r}$ ,  $\vec{a}$  এবং  $\vec{b}$ -এর ক্ষেত্রের সহগণের যোগফল হলো

$$1 - s + t = 1 - (1 - t) + t = 0।$$

সুতরাং  $A, B, P$  এই তিনটি বিন্দুর সমরেখ হওয়ার শর্ত সিদ্ধ হলো।


অনুসিদ্ধান্ত (2) : মনে করি  $O$  বিন্দু দিয়া অক্ষিত সমকেণ্টী অক্ষগোষ্ঠীর সাপেক্ষে  $P, A, B$ -এর সমকেণ্টী কার্টেসীয় স্থানাঙ্ক (rectangular cartesian coordinates) যথাক্রমে  $(x, y, z), (x_1, y_1, z_1)$  এবং  $(x_2, y_2, z_2)$ । (3) নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়।

$$(x, y, z) = s(x_1, y_1, z_1) + t(x_2, y_2, z_2)$$

$$\therefore \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t \quad \dots\dots (8)$$

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে (4) নং সমীকরণটি হলো দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণদ্বয়।

#### 4.3.2 দুইটি সরলরেখার অন্তর্গত কোণগুলির সমন্বিতশুকন্দয়ের সমীকরণ নির্ণয় :



চিত্র-3

মনে করি  $\angle AOB$  কোণের অন্তর্সমন্বিতশুকন্দয় হলো  $\overline{OP}$  সরলরেখা। মনে করি  $\vec{a}$  এবং  $\vec{b}$  হলো যথাক্রমে  $\overline{OA}$  এবং  $\overline{OB}$  এর দিকে একক ভেট্টের।  $O$  হলো ভেট্টের মূলবিন্দু (vector origin)

অস্তর্মধিখণ্ডকের উপর P যে কোনও একটি বিন্দু নেওয়া হলো এবং  $\overline{MP}$  হলো  $\overline{OB}$  সরলরেখার সমান্তরাল। এখানে  $OM = MP = t$  (ধরি)

$$\therefore \overline{OM} = t\bar{a} \text{ এবং } \overline{MP} = t\bar{b}$$

মনে করি  $\overline{OP} = \bar{r}$   $\Delta OMP$  এই ত্রিভুজে

$$\overline{OP} = \overline{OM} + \overline{MP}$$

$$\text{অথবা } \bar{r} = t\bar{a} + t\bar{b} \quad \therefore \bar{r} = t(\bar{a} + \bar{b}) \quad \dots\dots (1)$$

এই সম্পর্ক হতে  $t$ -এর বিভিন্ন মানের জন্য  $OP$ -এর উপর যে কোনও বিন্দু P-এর অবস্থান ভেট্টের নির্ণয় করা যাবে। সূতরাং এটিই হলো  $\angle AOB$  কোণের অস্তর্ধিখণ্ডকের ভেট্টের সমীকরণ।

মনে করি  $OP'$ ,  $\angle AOB$  কোণের বাহির্ধিখণ্ডক এবং  $\overline{OP}' = \bar{r}$ ।  $M'A'$  হলো  $\overline{OB}$ -এর সমান্তরাল এবং এটি  $\overline{AO}$ কে (বর্দিত)  $M'$  বিন্দুতে ছেদ করে। যদি  $OM' = M'P' = t$  হয় তবে

$$\overline{OM'} = -t\bar{a}, \quad \overline{M'P'} = t\bar{b}$$

$$\therefore \bar{r} = t(\bar{b} - \bar{a}) \quad \dots\dots (2)$$

এটিই হলো  $\angle AOB$  কোণের বাহির্ধিখণ্ডকের ভেট্টের সমীকরণ।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : যদি  $\overline{OA} = \bar{a}$  এবং  $\overline{OB} = \bar{b}$  হয় তবে  $\overline{OA}$ -এর দিকে একক ভেট্টের হবে  $\frac{\bar{b}}{|\bar{b}|}$  এবং  $\overline{OB}$ -এর দিকে একক ভেট্টের হবে।  $\frac{\bar{b}}{|\bar{b}|}$  সূতরাং এই ক্ষেত্রে  $\angle AOB$  এর অস্তর্ধিখণ্ডক এবং বাহির্ধিখণ্ডকের সমীকরণ হবে।

$$\bar{r} = t \left( \frac{\bar{b}}{|\bar{b}|} \pm \frac{\bar{a}}{|\bar{a}|} \right) \quad \dots\dots (3)$$

#### 4.3.3 সমদ্বিখণ্ডক সমন্বয়ীয় উপপাদ্যগুলির ভেট্টের প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ :

উপপাদ্য (1) : একটি ত্রিভুজের যে কোনও একটি কোণের অস্তঃসমদ্বিখণ্ডক ঐ কোণের বিপরীত বাত্রকে অপর দুই বাহর অনুপাতে অস্তঃবিভক্ত করে।

$\triangle ABC$  ত্রিভুজের  $\angle BAC$  কোণের অস্তর্মধিখণ্ডক হলো  $AD$  সরলরেখা।  $A$  বিন্দুকে মূলবিন্দু ধরা হলো।  $A$ -এর সাপেক্ষে  $B$  এবং  $C$  বিন্দু দুটির অবস্থান ভেট্টের যথাক্রমে  $\bar{c}$  এবং  $\bar{b}$ । সূতরাং  $\overline{AD}$  সরলরেখাটির ভেট্টের সমীকরণ হবে  $\bar{r} = t \left( \frac{\bar{c}}{|\bar{c}|} + \frac{\bar{b}}{|\bar{b}|} \right) = t \frac{|\bar{b}|\bar{c} + |\bar{c}|\bar{b}}{|\bar{c}||\bar{b}|}$


যেখানে : একটি ক্ষেত্রার সংখ্যা।

$$\text{যদি } \text{আমরা } t = \frac{|\bar{b}| |\bar{c}|}{|\bar{b}| + |\bar{c}|}$$

ধরি  $\overline{AD}$  সরলরেখার সমীকরণ

$$\text{হবে } \bar{r} = \frac{|\bar{b}| \bar{c} + |\bar{c}| \bar{b}}{|\bar{b}| + |\bar{c}|} \quad \dots \dots (1)$$

এক্ষেত্রে  $\bar{r}$  হলো  $\overline{BC}$  বাহুর উপর  
এমন একটি বিন্দুর অবস্থান ভেটের যা  
 $\overline{BC}$  বাহুকে  $|\bar{b}| : |\bar{c}|$  অনুপাতে  
অঙ্গৰিভক্ত করেছে। এই বিন্দুটি হলো



চিত্র-4

$AD$  এবং  $BC$  সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু। সূতরাং  $AD$  সরলরেখা  $BC$  বাহুকে  $D$  বিন্দুতে  $AB : AC$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করেছে।

উপপাদ্য (2) : কোনও ত্রিভুজের যেকোনও একটি কোণের বহিস্মিন্থগুক ঐ কোণের বিপরীত  
বাহুকে অপর দুই বাহুর অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করে।

$\triangle ABC$  ত্রিভুজের  $\angle FAC$  কোণের সমদ্বিখণক হল  $AE$  (৪নং ছবি হতে)।

এখানে  $\overline{AB} = \bar{c}$ ,  $\overline{BC} = \bar{b}$  সূতরাং  $AE$  সরলরেখার ভেটের সমীকরণ হবে

$$\bar{r} = t \left( \frac{\bar{b}}{|\bar{b}|} - \frac{\bar{c}}{|\bar{c}|} \right) = t \frac{|\bar{c}| \bar{b} - |\bar{b}| \bar{c}}{|\bar{b}| |\bar{c}|}$$

আমরা যদি  $t = \frac{|\bar{b}| |\bar{c}|}{|\bar{b}| + |\bar{c}|}$  ধরি তাহলে  $AE$ -এর সমীকরণ হবে


$$\bar{r} = \frac{|\bar{b}| \bar{c} - |\bar{c}| \bar{b}}{|\bar{b}| + |\bar{c}|} \quad \dots \dots (2)$$

এটাই হলো  $\overline{BC}$  সরলরেখার ওপর এমন একটি বিন্দুর অবস্থান ভেটের যেটি  $\overline{BC}$  বাহুকে  
 $|\bar{c}| : |\bar{b}|$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করেছে। সূতরাং এটিই হলো  $\overline{BC}$  বাহু এবং  $\overline{AE}$  সরলরেখার ছেদবিন্দুর  
অবস্থান ভেটের। সূতরাং  $E$  বিন্দু  $BC$  বাহুকে  $AB : AC$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করেছে।

উপপাদ্য (3) : কোন ত্রিভুজের তিনটি কোণের অঙ্গসমদ্বিখণকগুলি সমবিন্দু।

ধরা যাক  $\Delta ABC$  ত্রিভুজের  $A, B, C$  এই শীর্ষবিন্দুগুলির কোনও মূলবিন্দুর সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{r}_1, \vec{r}_2$  এবং  $\vec{r}_3$ ।

মনে করি  $BC = a, CA = b, AB = c$ । যদি  $\angle A$  কোণের অস্তর্সমন্বিতগুক  $BC$  বাহকে  $D$  বিন্দুতে ছেদ করে তবে  $D$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে  $\frac{br_2 + cr_3}{b+c}$ ।



চিত্র-5

মনে করি  $AD$  সরলরেখার ওপর  $I$  একটি বিন্দু যা  $AD$  রেখাখকে  $(b+c) : a$  অনুপাতে অস্তঃবিভক্ত করে। সূতরাং  $I$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হবে

$$\begin{aligned} & \frac{a\vec{r}_1 + (b+c) \cdot \frac{\vec{r}_2 + \vec{r}_3}{(b+c)}}{a + (b+c)} \\ &= \frac{a\vec{r}_1 + b\vec{r}_2 + c\vec{r}_3}{a + b + c} \end{aligned}$$


এই রাশিমালাটির প্রতিসাম্য (symmetry) হতে বোঝা যাচ্ছে যে  $I$  বিন্দুটি অপর দুই কোণের অস্তর্সমন্বিতগুক দ্বয়ের উপরেও থাকবে। সূতরাং সমন্বিতগুকক্রয় সমবিন্দু।

**উপপাদ্য (4) :** কোনো ত্রিভুজের যে কোনো একটি কোণের অস্তঃসমন্বিতগুক এবং অপর দুই কোণের বহিস্মন্বিতগুক দ্বয় সমবিন্দু হবে।

মনে করি  $\Delta ABC$  ত্রিভুজে  $A, B, C$  এই শীর্ষবিন্দু তিনটির কোনও ভেক্টর যথাক্রমে  $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3$ ।

যদি  $\angle B$  কোণের বহিস্মন্বিতগুকটি  $AC$  বাহকে  $E$  বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে  $E$  বিন্দু  $AC$  বাহকে  $c : a$  অনুপাতে বহির্বিভক্ত করে যেখানে  $BC = a, AC = b$  এবং  $AB = c$  সূতরাং,  $E$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর

$$\text{হবে } \frac{cr_3 + ar_1}{c-a}$$



চিত্র-6

মনেকরি  $BE$  সরলরেখার ওপর  $I_1$

এমন একটি বিন্দু যা  $\overline{BE}$  কে  $(c-a) : b$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত করে।

$\therefore I_1$  বিন্দুর অবস্থান ভেট্টর

$$= \frac{(c-a) \left( \frac{cr_3 - ar_1}{c-a} \right) + br_2}{(c-a) + b}$$

$$= \frac{cr_3 - ar_1 + br_2}{b+c-a}$$

যদি  $\angle C$  কোণের বহিসমন্বিষ্টক AB বাহকে বহির্ভাবে F বিন্দুতে ছেদ করে তবে F বিন্দুর অবস্থান ভেট্টর হবে  $\frac{br_2 - ar_1}{b-a}$ । এখন CF সরলরেখাটি যে বিন্দুতে  $(b-a) : c$  অনুপাতে অঙ্গৰিভক্ত

$$\text{হয় তার অবস্থান ভেট্টর হবে } \frac{(b-a) \left( \frac{br_2 - ar_1}{b-a} \right) + cr_3}{(b-a) + c}$$

$$= \frac{cr_3 - ar_1 + br_2}{b+c-a}$$

$= I_1$  বিন্দুর অবস্থান ভেট্টর।

অনুরূপে দেখানো যাবে যে  $\angle A$  কোণের অঙ্গসমন্বিষ্টক AD সরলরেখা  $I_1$  বিন্দুতে  $(b+c) : a$  অনুপাতে বহির্বিভক্ত হয়।

সুতরাং AD, BE, CF সরলরেখা ত্রয়ি সমবিন্দু।

#### 4.4 জ্যামিতিতে ভেট্টর গুণের প্রয়োগ :

4.4 অনুচ্ছেদে দুটি ভেট্টরের ক্ষেলার গুণ ও ভেট্টর গুণের সাহায্যে সমতলের ভেট্টর সমীকরণ বিভিন্ন সর্তানুযায়ী নির্ণয় করা হয়েছে।

এছাড়া কোন বিন্দু থেকে সমতলের উপর লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে।

সমতল সম্পর্কীয় সরলরেখার ভেট্টর সমীকরণ এই অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়।

ক্ষেলার গুণ ও ভেট্টর গুণ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কোণ ও বিন্দু হতে সরলরেখার উপর লম্ব দূরত্ব, দুটি নেক্যাতলীয় সরলরেখার (skew lines) মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব (shortest distance) ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

তিনি বা ততোধিক ভেষ্টরের ক্ষেত্রের গুণের সাহায্যে চতুর্স্তলকের ঘনফল এখানে নির্ণয় করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে গোলকের সমীকরণ ভেষ্টরের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

#### 4.4.1 সমতলের ভেষ্টর সমীকরণ নির্ণয়

(ক) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং একটি প্রদত্ত ভেষ্টরের সঙ্গে লম্ব এমন একটি তলের ভেষ্টর সমীকরণ নির্ণয় :

[অভিলম্ব আকারে তলের ভেষ্টর সমীকরণ]

মনে করি O হল মূলবিন্দু এবং O-  
এর সাপেক্ষে প্রদত্তবিন্দু A-এর অবস্থান  
ভেষ্টর  $\bar{a}$ । ON হল সমতলের ওপর  
লম্ব। সমতলে অবস্থিত যে কোনও  
একটি বিন্দু P-এর অবস্থান ভেষ্টর হলো  
 $\bar{r}$ । এখানে  $\overline{OA} = \bar{a}$ ,  $\overline{OP} = \bar{r}$ ,  $\overline{ON} = \bar{n}$  যেখানে  $p = |\overline{ON}| = ON$  এবং  
 $\bar{n}$  হলো সমতলের উপর লম্ব এবং  
একক ভেষ্টর।

7নং চিত্র হতে  $\overline{AP} = \bar{r} - \bar{a}$ ,  
 $\overline{AP}$  সরলরেখাটি সমতলের মধ্যে  
আছে। সুতরাং  $\overline{AP}$  হলো  $\bar{n}$  ভেষ্টরের  
ওপর লম্ব।

$$\therefore (\bar{r} - \bar{a}) \cdot \bar{n} = 0 \quad \dots \dots (1)$$

চিত্র-7

P বিন্দুর যে কোনও অবস্থানের  
জন্য এটি সিদ্ধ। (1)নং সমীকরণ হলো সমতলটির ভেষ্টর সমীকরণ।

(1) নং সমীকরণ হতে  $\bar{r} \cdot \bar{n} = \bar{a} \cdot \bar{n}$


এখানে  $\bar{a} \cdot \bar{n} = \overline{ON}$  ভেষ্টরের উপর  $\overline{OA}$  ভেষ্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$\overline{ON} = p$$

$$\therefore \bar{r} \cdot \bar{n} = p \quad \dots \dots (2)$$

এটাই হলো সমতলের ভেষ্টর সমীকরণের অভিলম্ব রূপ (normal form)।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : যদি মূলবিন্দু O সমতলের মধ্যে অবস্থিত হয় তবে  $p = 0$  হবে এবং সমতলের  
ভেষ্টর সমীকরণ হবে  $\bar{r} \cdot \bar{n} = 0 \quad \dots \dots (3)$



অনুসিদ্ধান্ত (2) : মনে করি  $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$  এই সমতলটি সমকোণী অক্ষগোষ্ঠীর তিনটি অক্ষকে যথাক্রমে D, E, F বিন্দুতে ছেদ করে যাদের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\alpha\hat{i}$ ,  $\beta\hat{j}$ , এবং  $\gamma\hat{k}$

$$\text{অর্থাৎ } \overrightarrow{OD} = \alpha\hat{i}$$

$$\overrightarrow{OE} = \beta\hat{j}$$

এবং  $\overrightarrow{OF} = \gamma\hat{k}$  যেখানে  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$ ,  $\hat{k}$  হলো যথাক্রমে সমকোণী অক্ষগোষ্ঠীর তিনটি অক্ষের ধরাঘাতক দিকে একক ভেক্টর।

যেহেতু DEF বিন্দু তিনটি সমতলে অবস্থিত সূতরাং (1) নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়  $(\alpha\hat{i}) \cdot \vec{n} = p$ ,

$$(\beta\hat{j}) \cdot \vec{n} = p \text{ এবং } (\gamma\hat{k}) \cdot \vec{n} = p$$

$$\alpha = \frac{p}{\hat{i} \cdot \vec{n}}, \quad \beta = \frac{p}{\hat{j} \cdot \vec{n}}, \quad \gamma = \frac{p}{\hat{k} \cdot \vec{n}}$$

অনুসিদ্ধান্ত (3) : O বিন্দুতে সমকোণী অক্ষগোষ্ঠীর মূলবিন্দু ধরে যদি P বিন্দুর স্থানাঙ্ক  $(x, y, z)$  হয় এবং  $\vec{n}$  ভেক্টরের কোসাইন দিগন্কগোষ্ঠী  $(l, m, n)$  হয় তবে

$$\vec{r} = xi + yj + zk \text{ এবং } \vec{n} = li + mj + nk \text{। এক্ষেত্রে (1)নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়}$$

$$Ix + my + nz = p$$


এটাই হলো স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে সমতলের সমীকরণের অভিলম্বকৃপ।

(খ) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং দুইটি প্রদত্ত সরলরেখার সমান্তরাল সমতলের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয়।

মনে করি A প্রদত্তবিন্দু এবং O হল ভেক্টর মূলবিন্দু।

মনে করি O এর সাপেক্ষে A বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  $\vec{r}$  এবং সমতলে অবস্থিত যে কোণও বিন্দু P-এর অবস্থান ভেক্টর O-এর সাপেক্ষে হলো  $\vec{t}$ ।

প্রদত্ত সরলরেখা দুটি যথাক্রমে ভেক্টর  $\vec{b}$  এবং  $\vec{c}$  ভেক্টর এর সমান্তরাল। সূতরাং নির্ণয় সমতলটি  $\vec{b}$  এবং  $\vec{c}$ -এর সমান্তরাল হবে।



চিত্র-8

এক্ষেত্রে  $\overline{AP}$  ভেক্টর,  $\overline{b}$  ভেক্টর  
এবং  $\overline{c}$  ভেক্টর নির্ণয় সমতলের  
সমান্তরাল হবে।

যেহেতু নির্ণয় সমতলটি  $\overline{b}$  এবং  
 $\overline{c}$ -এর সমান্তরাল সূতরাং  $\overline{b} \times \overline{c}$  ঐ  
সমতলের উপর অসম্ভব হবে।


যেহেতু  $P$  বিন্দু সমতলের উপর যে  
কোনও একটি বিন্দু  $\therefore \overline{AP}$  ভেক্টর  
 $\overline{b} \times \overline{c}$ -এর উপর অসম্ভব হবে।

$$\therefore (\overline{r} - \overline{a}) \cdot (\overline{b} \times \overline{c}) = 0$$

$$\text{অর্থাৎ } \overline{r} \cdot (\overline{b} \times \overline{c}) = \overline{a} \cdot (\overline{b} \times \overline{c})$$

$$\text{অথবা } [\overline{r} \ \overline{b} \ \overline{c}] = [\overline{a} \ \overline{b} \ \overline{c}] \quad \dots \dots (4)$$

এটিই হলো নির্ণয় সমতলটির  
ভেক্টর সমীকরণ।



চিত্র-9

**অনুসিদ্ধান্ত (1) :** যেহেতু  $\overline{AP}$ ,

$\overline{b}$  এবং  $\overline{c}$  ভেক্টরগুলি একই সমতলের সঙ্গে সমান্তরাল সূতরাং  $\overline{AP}$  ভেক্টর  $\overline{b}$  এবং  $\overline{c}$  এর সঙ্গে  
সামতলিক হবে। এই ক্ষেত্রে ভেক্টরের প্রাথমিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী

$$\overline{r} - \overline{a} = s\overline{b} + t\overline{c} \text{ হবে।}$$

$$\text{অর্থাৎ } \overline{r} = \overline{a} + s\overline{b} + t\overline{c} \quad \dots \dots (5)$$

যেখানে  $s$  এবং  $t$  দুটি ক্ষেত্রাল সংখ্যা। (5)-এ সমীকরণকে  $(\overline{b} \times \overline{c})$  দিয়ে ক্ষেত্রাল গুণ (scalar product) করা হলে (4) নং সমীকরণটি পাওয়া যায়।

**অনুসিদ্ধান্ত (2) :** (4) নং সমীকরণকে (2) নং সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করলে পাওয়া যায়

$$\overline{n} = \frac{\overline{b} \times \overline{c}}{|\overline{b} \times \overline{c}|} \text{ এবং } p = \text{মূলবিন্দু হতে সমতলের উপর অসম্ভব দূরত্ব} = \frac{[\overline{a} \ \overline{b} \ \overline{c}]}{|\overline{b} \times \overline{c}|}$$

**অনুসিদ্ধান্ত (3) :**  $\overline{r} = \overline{a} + t\overline{b}$  এই সরলরেখার মধ্যগামী এবং  $\overline{r} \cdot \overline{d} = q$  এই সমতলের উপর  
অসম্ভব সমতলটি নির্দিষ্ট একটি বিন্দুগামী যার অবস্থান ভেক্টর  $\overline{r}$ । এই সমতলটি  $\overline{b}$  এবং  $\overline{d}$  ভেক্টর দুটির  
সমান্তরাল। সূতরাং এই সমতলের ভেক্টর সমীকরণ হবে  $(\overline{r} - \overline{a}) \cdot (\overline{b} \times \overline{d}) = 0$  [ 3.4.1 অনুচ্ছেদের  
1 নং সমীকরণ হতে ]

$$\text{অথবা } [\bar{r} \bar{b} \bar{d}] = [\bar{a} \bar{b} \bar{d}]$$

(গ) দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং একটি প্রদত্ত সরলরেখার সমান্তরাল সমতলের ভেক্টর সমীকরণ :

মনেকরি  $A$  এবং  $B$  সমতলে অবস্থিত দুটি বিন্দু যাদের অবস্থান ভেক্টর  $\bar{a}$  এবং  $\bar{b}$ । প্রদত্ত সরলরেখাটি  $\bar{c}$  ভেক্টরের সমান্তরাল।

এই ক্ষেত্রে সমতলটি  $A$  বিন্দুগামী এবং  $\bar{b} - \bar{a}$  এবং  $\bar{c}$  এই দুটি ভেক্টরের সমান্তরাল।

সূতরাং (4) নং সমীকরণ অনুযায়ী এই সমতলটির সমীকরণ হবে

$$(\bar{r} - \bar{a}) \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times \bar{c}\} = 0$$

$$\text{অথবা } \bar{r} \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times \bar{c}\}$$

$$= \bar{a} \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times \bar{c}\}$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a})$$

$$= \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a})$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a}) = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) [\bar{a} \bar{b} \bar{c}]$$

$$\text{বা } \boxed{\bar{r} \cdot (\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a}) = [\bar{a} \bar{b} \bar{c}]} \quad \dots \dots (6)$$

নির্ণেয় সমতলটি  $A$  বিন্দুগামীও  $\bar{b} - \bar{a}$  এবং  $\bar{c}$  এই দুটি ভেক্টরের সমান্তরাল বলে (5)নং সমীকরণ অনুযায়ী এটি লেখা যায়

$$\bar{r} = \bar{a} + t(\bar{b} - \bar{a}) + s\bar{c}$$


$$\text{বা } \boxed{\bar{r} = (1-t)\bar{a} + t\bar{b} + s\bar{c}} \quad \dots \dots (7)$$

(ঘ) তিনটি প্রদত্ত বিন্দুগামী সমতলের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি  $A, B, C$  সমরেখ নয় এমন তিনটি বিন্দু, যাদের অবস্থান ভেক্টর  $O$  বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে  $\bar{a}, \bar{b}$  এবং  $\bar{c}$ ।

$$\text{সূতরাং, } \overline{AB} = \bar{b} - \bar{a}$$

$$\overline{AC} = \bar{c} - \bar{a}$$



চিত্র-10

এই সমতলে  $P$  যে কোন একটি বিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর  $O$ -এর সাপেক্ষে  $\bar{r}$ ।

সূতরাং,  $\overline{AP}$ ,  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  এই তিনটি ভেক্টর সামতলিক হবে।

$$\text{সূতরাং, } \overline{AP} (\overline{AB} \times \overline{AC}) = 0$$

$$\text{বা } (\bar{r} - \bar{a}) \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times (\bar{c} - \bar{a})\} \\ = 0$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times (\bar{c} - \bar{a})\}$$

$$= \bar{a} \cdot \{(\bar{b} - \bar{a}) \times (\bar{c} - \bar{a})\}$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot \{\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} + \bar{a} \times \bar{b}\}$$

$$= \bar{a} \cdot \{\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} + \bar{a} \times \bar{b}\}$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot \bar{m} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = [\bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{c}] \quad \dots\dots (8)$$

(8) নং সমীকরণটি হলো সমতলটির নির্মেয় ভেক্টর সমীকরণ।

$$[\bar{m} = \{\bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} + \bar{a} \times \bar{b}\} = 2 \times ABC \text{ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল}]$$

এইক্ষেত্রে যেহেতু সমতলটি  $A$  বিন্দুগামী এবং  $(\bar{b} - \bar{a})$  এবং  $\bar{c} - \bar{a}$  এই দুটি ভেক্টরের সমাপ্তরাল সূতরাং (5) নং সমীকরণ অনুযায়ী প্রাথমিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমতলটির ভেক্টর সমীকরণ হবে।

$$\bar{r} = \bar{a} + t(\bar{b} - \bar{a}) + s(\bar{c} - \bar{a})$$

$$\text{অথবা } \boxed{\bar{r} = (1 - t - s)\bar{a} + t\bar{b} + s\bar{c}} \quad \dots\dots (9)$$

অনুসিদ্ধান্ত (1) : (8)নং সমীকরণ হতে পাওয়া যায়  $p = \text{মূলবিন্দু হতে সমতলটির লম্বদূরত্ব}$ ।


$$= \frac{[\bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{c}]}{|\bar{m}|}$$

(6) দুটি নির্দিষ্ট সরলরেখাগামী সমতলের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি প্রদত্ত সরলরেখা দুটির ভেক্টর সমীকরণ যথাক্রমে  $\bar{r} = \bar{a}_1 + t\bar{b}_1$ ,

এবং  $\bar{r} = \bar{a}_2 + s\bar{b}_2$ , যেখানে  $t$  এবং  $s$  হল দুটি ক্ষেত্রাল সংখ্যা।

সমতলটি  $A$  বিন্দুগামী যার অবস্থান ভেক্টর  $\bar{a}_1$ ।



চিত্র-11

সরলরেখা দুটির সমীকরণ হতে বোঝা যাচ্ছে যে  
সমতলটির ভেষ্টের  $\bar{b}_1$  এবং ভেষ্টের  $\bar{b}_2$ -এর  
সমান্তরাল। সূতরাং (4)নং সমীকরণ অনুযায়ী এই  
সমতলের ভেষ্টের সমীকরণ হবে

$$(\bar{r} - \bar{a}_1) \cdot (\bar{b}_1 \times \bar{b}_2) = 0$$

অর্থাৎ  $[\bar{r} \bar{b}_1 \bar{b}_2] = [\bar{a}_1 \bar{b}_1 \bar{b}_2]$  ---- (10)

অথবা (5) নং সমীকরণ অনুযায়ী

$$\bar{r} = \bar{a}_1 + t\bar{b}_1 + s\bar{b}_2 \quad \text{----- (11)}$$

যেখানে  $t$  এবং  $s$  দুটি যে কোন ক্ষেত্রের সংখ্যা।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : দুটি সরলরেখার সামতলিক  
হওয়ার শর্ত :

যেহেতু সমতলটি  $B$  বিন্দুগামী যার অবস্থান  
ভেষ্টের  $\bar{a}_2$  সূতরাং (10)নং সমীকরণে  $\bar{r} = \bar{a}_2$ ,  
বসিয়ে পাই  $[\bar{a}_2 \bar{b}_1 \bar{b}_2] = [\bar{a}_1 \bar{b}_1 \bar{b}_2]$

অর্থাৎ  $[\bar{a}_1 \bar{b}_1 \bar{b}_2] = [\bar{a}_2 \bar{b}_1 \bar{b}_2]$

(চ) পরস্পর সমান্তরাল নয় এমন দুটি সমতল যে সরলরেখা বরাবর ছেদ করে তার মধ্যগামী  
সমতলের ভেষ্টের সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি সমতল দুটির ভেষ্টের সমীকরণ 1নং সমীকরণ অনুযায়ী) যথাক্রমে

$$\bar{r} \cdot \bar{n}_1 = p_1 \quad \text{----- (12)}$$

$$\bar{r} \cdot \bar{n}_2 = p_2 \quad \text{----- (13)}$$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে সব বিন্দুগুলি (12)নং এবং (13)নং সমতলে অবস্থিত সেই সমস্ত  
বিন্দুগুলির অবস্থান ভেষ্টের


$$(\bar{r} \cdot \bar{n}_1 - p_1) + \lambda(\bar{r} \cdot \bar{n}_2 - p_2) = 0 \quad \text{----- (14)}$$

এই সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে। এখানে  $\lambda$  একটি প্রচল।

সূতরাং (14) নং সমীকরণটি একটি তলের সমীকরণ যা (12) নং (13) নং তলের সাধারণ  
বিন্দুগুলি দিয়ে যাবে। অর্থাৎ (12)নং এবং (13)নং যে সরলরেখা বরাবর ছেদ করে (14)নং সমতলটি  
সেই সরলরেখাগামী হবে।

(14)নং সমীকরণটিকে

$$\bar{r} \cdot (\bar{n}_1 - \lambda \bar{n}_2) = (p_1 - \lambda p_2) \quad \text{----- (15)}$$



চিত্র-12

এই আকারে লেখা যায়।

যদি (14) নং সমতলটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী হয় যার অবস্থান ভেক্টর  $\bar{p}$  তাহলে

$$\bar{a} \cdot (\bar{n}_1 - \lambda \bar{n}_2) = (p_1 - \lambda p_2)$$

$$\therefore (\bar{a} \cdot \bar{n}_1 - p_1) = \lambda(\bar{a} \cdot \bar{n}_2 - p_2)$$

$$\therefore \lambda = \frac{\bar{a} \cdot \bar{n}_1 - p_1}{\bar{a} \cdot \bar{n}_2 - p_2}$$

(14) নং সমীকরণে  $\lambda$ -এর মান বসিয়ে পাই

$$(\bar{r} \cdot \bar{n}_1 - p_1)(\bar{a} \cdot \bar{n}_2 - p_2) + (\bar{a} \cdot \bar{n}_1 - p_1)(\bar{r} \cdot \bar{n}_2 - p_2) = 0 \quad \text{-----(16)}$$

এটিই হলো (12) নং এবং (13) নং সমতলের দ্বারা ছেদিত সরলরেখাগামী এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর  $\bar{p}$  দিয়ে যায় এমন সমতলের ভেক্টর সমীকরণ।

#### 4.4.2 একটি প্রদত্তবিন্দু হতে কোনও সমতলের দূরত্ব নির্ণয় :

(ক) লম্ব দূরত্ব নির্ণয় :

মনে করি A একটি প্রদত্তবিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর হলো  $\bar{a}$  ( $O$  বিন্দুর সাপেক্ষে)।

মনে করি প্রদত্ত সমতলটির ভেক্টর সমীকরণ

$\bar{r} \cdot \bar{n} = p$ , যেখানে  $\bar{n}$  হলো সমতলটির ওপর লম্ব ভেক্টর এবং একক ভেক্টর।

যদি A হতে সমতলের ওপর লম্ব AN হয় তাহলে এই লম্বটি A বিন্দুগামী এবং ভেক্টর  $\bar{n}$ -এর সমান্তরাল। সূতরাং  $\overline{AN}$  সরলরেখার সমীকরণ হবে  $\bar{r} = \bar{a} + t\bar{n}$ , যেখানে  $t$  ইল ক্ষেত্রার সংখ্যা।

সূতরাং N বিন্দুতে লম্বটি এই সমতলকে ছেদ করে।

$$\therefore N \text{ বিন্দুতে } (\bar{a} + t\bar{n}) \cdot \bar{n} = p$$

$$\therefore \bar{a} \cdot \bar{n} + t = p$$


$$\therefore t = (p - \bar{a} \cdot \bar{n})$$

$$\therefore t = \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2}$$

$[\because |\bar{n}| = 1]$

$\therefore N$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হলো

$$\overline{ON} = \bar{a} + t\bar{n}$$



চিত্র-13

$$= \bar{a} + \left( \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \right) \bar{n}$$

$$\therefore \overline{AN} = \left\{ \bar{a} + \left( \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \right) \bar{n} \right\} - \bar{a}$$

$$= \left( \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \right) \bar{n}$$

$\therefore$  নির্গেয় লম্ব দূরত্ব

$$= |\overline{AN}|$$

$$= \left| \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|^2} \right| |\bar{n}| = \left| \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|} \right|$$

$$= \left| \frac{p - \bar{a} \cdot \bar{n}}{|\bar{n}|} \right|$$


(খ) কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু হতে কোনও নির্দিষ্ট দিকে কোনও সমতলের দূরত্ব :

মনেকরি সমতলটির ভেষ্টের সমীকরণ

$$\bar{r} \cdot \bar{n} = p \quad \dots \dots \quad (17)$$

মনে করি প্রদত্তবিন্দু A-এর অবস্থান ভেষ্টের  $\bar{a}$  (O-এর সাপেক্ষে)।  $\bar{b}$  হলো একটি নির্দিষ্ট দিকে একক ভেষ্টের।

A বিন্দু দিয়ে আঙ্কিত  $\bar{b}$ -এর সমান্তরাল সরলরেখা সমতলটিকে M বিন্দুতে ছেদ করেছে।



চিত্র-14

যদি  $AM = d$  হয় তবে  $\overline{AM} = d\bar{b}$ ।

আবার  $\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{AM} = \bar{a} + d\bar{b}$ ।

যেহেতু M বিন্দুটি একই সমতলে অবস্থিত

$$\therefore (\bar{a} + d\bar{b})\bar{n} = p$$

$$\text{অথবা } \bar{a} \cdot \bar{n} + d\bar{b} \cdot \bar{n} = p$$

$$d\bar{b} \cdot \bar{n} = p - \bar{a} \cdot \bar{n}$$

$\therefore d = \frac{\mathbf{P} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{n}}$  এটিই হলো A বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত নির্ণয় দূরত্ব।

#### 4.4.3 দুটি সমতলের অন্তর্গত কোণের সমদ্বিখণক সমতলসময়ের ভেষ্টর সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি সমতল দুটির ভেষ্টর সমীকরণ যথাক্রমে  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_1 = p_1$ , এবং  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_2 = p_2$ ।

যদি সমদ্বিখণক সমতলে (bisecting plane) অবস্থিত যে কোনও একটি বিন্দুর অবস্থান ভেষ্টর  $\mathbf{r}$  হয় তাহলে ঐ বিন্দু হতে উপরোক্ত তল দুটির ওপর লম্ব দূরত্ব দুটি সমান এবং বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে।

$$\text{সূতরাঃ } \frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_1}{|\mathbf{n}_1|} = \pm \frac{\mathbf{p}_2 - \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_2|}$$

$$\text{অথবা } \mathbf{r} \cdot \left( \frac{\mathbf{n}_1}{|\mathbf{n}_1|} \mp \frac{\mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right) = \left( \frac{\mathbf{p}_1}{|\mathbf{n}_1|} \pm \frac{\mathbf{p}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right)$$

$$\therefore \mathbf{r} \cdot \left( \frac{\mathbf{n}_1}{|\mathbf{n}_1|} + \frac{\mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right) = \left( \frac{\mathbf{p}_1}{|\mathbf{n}_1|} + \frac{\mathbf{p}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right) \quad \dots\dots (1)$$

$$\text{এবং } \therefore \mathbf{r} \cdot \left( \frac{\mathbf{n}_1}{|\mathbf{n}_1|} - \frac{\mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right) = \left( \frac{\mathbf{p}_1}{|\mathbf{n}_1|} - \frac{\mathbf{p}_2}{|\mathbf{n}_2|} \right) \quad \dots\dots (2)$$

(1) নং এবং (2) নং সমীকরণ দুটি হলো নির্ণয় সমদ্বিখণক সমতলদুটির ভেষ্টর সমীকরণ।

#### 4.4.4 সমতলের সঙ্গে সম্পর্কিত সরলরেখার ভেষ্টর সমীকরণ নির্ণয় :


(ক) দুটি পরস্পরছেদি সমতলের মধ্যগামী এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি সমতল দুটির সমীকরণ যথাক্রমে

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_1 = p_1 \text{ এবং } \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}_2 = p_2$$

সূতরাঃ নির্ণয় সরলরেখাটি সমতল দুটির ওপর লম্ববর্তীর সঙ্গে লম্বভাবে থাকবে।

সূতরাঃ ঐ সরলরেখাটি  $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$  এই ভেষ্টরের সমান্তরাল হবে।



চিত্র-15

মনে করি সরলরেখাটি A বিন্দুগামী যার অবস্থান ভেক্টর  $\vec{a}$ ।

$$\text{সূতরাং } (\vec{r} - \vec{a}) \times (\vec{n}_1 \times \vec{n}_2) = 0 \quad \dots\dots (1)$$

এটিই হলো নির্ণয় সরলরেখাটির সমীকরণ।

(খ) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী ও নির্দিষ্ট সমতলের সঙে সমান্তরাল এবং একটি নির্দিষ্ট সরলরেখাকে ছেদ করেছে এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় :

মনে করি প্রদত্ত সরলরেখাটির সমীকরণ  $\vec{r} = \vec{a} + b\vec{\beta}$  --- (2) এবং প্রদত্ত বিন্দু দুটির অবস্থান ভেক্টর  $\vec{p}$ ।

$$\text{প্রদত্ত সমতলের সমীকরণ ধরি } \vec{r} \cdot \vec{n} = p \quad \dots\dots (3)$$

সূতরাং নির্ণয় সরলরেখা এবং (2) নং সরলরেখাগামী সমতলটি  $\vec{\beta}$  ভেক্টরের সমান্তরাল হবে। আবার (2) নং সরলরেখাটি এই সমতলে আছে বলে যে বিন্দুটির অবস্থান ভেক্টর  $\vec{p}$  সেই বিন্দুটি ঐ সমতলে আছে।

সূতরাং  $(\vec{a} - \vec{p})$  ভেক্টরটি ঐ সমতলেই আছে।

অর্থাৎ  $(\vec{a} - \vec{p}) \times \vec{\beta}$  এই ভেক্টরটি ঐ সমতলের ওপর লম্ব হবে। যেহেতু নির্ণয় সরলরেখাটি এই সমতলের সমান্তরাল সূতরাং  $(\vec{a} - \vec{p}) \times \vec{\beta}$  ভেক্টর ঐ সরলরেখার ওপর লম্ব হবে।

আবার নির্ণয় সরলরেখা  $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$  এর সমান্তরাল বলে সরলরেখাটি  $\vec{n}$ -এর ওপর লম্ব হবে।

∴ সরলরেখাটি  $\{(\vec{a} - \vec{p}) \times \vec{\beta}\} \times \vec{n}$  ভেক্টরের সমান্তরাল হবে।

সরলরেখাটির সমীকরণ হবে।

$$(\vec{r} - \vec{a}) \times [ \{(\vec{a} - \vec{p}) \times \vec{\beta}\} \times \vec{n} ] = 0 \quad \dots\dots (4)$$

(গ) দুটি পরস্পরছেদি সমতলের মধ্যগামী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় :

$$\text{মনে করি সমতল দুটির সমীকরণ } \vec{r} \cdot \vec{n}_1 = p_1 \quad \dots\dots (5)$$

$$\text{এবং } \vec{r} \cdot \vec{n}_2 = p_2 \quad \dots\dots (6)$$

যেহেতু নির্ণয় সরলরেখাটি উভয় সমতলেই অবস্থিত সূতরাং এটি  $\vec{n}_1$  এবং  $\vec{n}_2$  এই দুই ভেক্টরের ওপর লম্ব হবে। এক্ষেত্রে সরলরেখাটি  $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$  এই ভেক্টরের সমান্তরাল হবে।

ON হলো মূলবিন্দু O হতে সরলরেখাটির ওপর লম্ব।

$\vec{n}_1$  এবং  $\vec{n}_2$  ভেক্টর ঐ সরলরেখাটির ওপর লম্ব এবং  $\vec{ON}$  ভেক্টরটি ঐ সরলরেখার ওপর লম্ব হলে  $\vec{n}_1$  এবং  $\vec{n}_2$  যে সমতলে আছে  $\vec{ON}$  ভেক্টর সেই সমতলে থাকবে।

অর্থাৎ  $\overline{ON}$ ,  $\bar{n}_1$  এবং  $\bar{n}_2$  সামতলিক বলে  $\overline{ON} = l_1 \bar{n}_1 + l_2 \bar{n}_2$ । যেখানে  $l_1$  এবং  $l_2$  দুটি ক্ষেত্রার সংখ্যা। যেহেতু  $N$  বিন্দুটি (5) নং এবং (6) নং সমতলে অবস্থিত সূতরাং।

$$(l_1 \bar{n}_1 + l_2 \bar{n}_2) \cdot \bar{n}_1 = p_1$$

$$\text{অথবা } (l_1 \bar{n}_1^2 + l_2 \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2 = p_1) \quad \dots \dots \quad (9)$$

$$\text{এবং } (l_1 \bar{n}_1 + l_2 \bar{n}_2) \cdot \bar{n}_2 = p_2$$

$$\text{অর্থাৎ } l_1 \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2 + l_2 \bar{n}_2^2 = p_2 \quad \dots \dots \quad (8)$$

এই দুটি সম্পর্ক হতে পাওয়া যায়

$$l_1 = \frac{p_1 \bar{n}_2^2 - p_2 \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2}{\bar{n}_1^2 \bar{n}_2^2 - (\bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2)^2}, \quad l_2 = \frac{p_2 \bar{n}_1^2 - p_1 \bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2}{\bar{n}_1^2 \bar{n}_2^2 - (\bar{n}_1 \cdot \bar{n}_2)^2}$$

সূতরাং নির্ণয় সরলরেখাটির সমীকরণ হবে

$$\bar{r} = l_1 \bar{n}_1 + l_2 \bar{n}_2 + t(\bar{n}_1 \times \bar{n}_2) \quad \dots \dots \quad (9)$$

যেখানে  $t$  হলো একটি ক্ষেত্রার সংখ্যা।

#### 4.4.5 ক্ষেত্রার গুণ এবং ভেষ্টের গুণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয় :

(ক) একটি প্রদত্ত বিন্দু হতে কোনও সরলরেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় :


মনেকরি  $BN$  সরলরেখাটির ভেষ্টের সমীকরণ

$$\bar{r} = \bar{b} + t \bar{n} \quad \dots \dots \quad (1)$$


যেখানে  $t$  হলো ক্ষেত্রার সংখ্যা,  $\bar{b}$  হলো  $B$  বিন্দুর

অবস্থান ভেষ্টের এবং  $\bar{n}$  হলো  $\overline{BN}$ -এর সমান্তরাল একক ভেষ্টের।

$A$  একটি প্রদত্ত বিন্দু যার অবস্থান ভেষ্টের হলো  $\bar{a}$ ।



চিত্র-16



চিত্র-17

$$\therefore \overline{BA} = (\bar{a} - \bar{b})$$

$$\therefore \overline{BA}^2 = (\bar{a} - \bar{b}) \cdot (\bar{a} - \bar{b})$$

$AN$  হলো  $BN$ -এর ওপর লম্ব। এক্ষেত্রে  $BN$  হল  $BN$  সরলরেখার ওপর  $\overline{BA}$  ভেষ্টের লম্ব অভিক্ষেপ।

$$\therefore BN = BA \cos \theta = |\overline{BA}| \cos \theta$$

$$= 1. |\bar{a} - \bar{b}| \cos\theta \quad [\angle ABN = 0]$$

$$= (\bar{a} - \bar{b}) \cdot \bar{n}$$

সূতরাং 17 নং ছবি হতে পাওয়া যাব।

$$AB^2 = BN^2 + AN^2$$

$$AN^2 = AB^2 - BN^2 = |\overline{BA}|^2 - BN^2$$

$$= (\bar{a} - \bar{b})^2 - (\bar{a} - \bar{b}) \cdot \bar{n} \quad \dots \dots \dots (2)$$

অনুসিদ্ধান্ত 1. :

$$\overline{NA} = \overline{BA} - \overline{BN}$$

$$= (\bar{a} - \bar{b}) - \{(\bar{a} - \bar{b}) \cdot \bar{n}\} \bar{n}$$

অনুসিদ্ধান্ত 2. : যদি (1)নং সমীকরণে ভেট্টের  $\bar{n}$  একক ভেট্টের না হয় তবে  $\bar{n}$  কে  $\frac{\bar{n}}{|\bar{n}|}$  দিয়ে

প্রতিস্থাপন করতে হবে।


(খ) দুটি নৈকতলীয় সরলরেখার (skewlines) মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব (shortest distance) নির্ণয় :

মনে করি LA এবং MC দুটি নৈকতলীয় সরলরেখা।

LA সরলরেখাটির ভেট্টের সমীকরণ

$$\bar{r} = \bar{a} + t\bar{b}$$

এবং MC সরলরেখাটির ভেট্টের সমীকরণ  $\bar{r} = \bar{c} + s\bar{d}$ , যেখানে t ও s ক্ষেত্রে সংখ্যা। A এবং C হল LA এবং MC-এর ওপর দুটি অদ্বিতীয় বিন্দু যাদের অবস্থান ভেট্টের যথাক্রমে  $\bar{b}$  এবং  $\bar{c}$ ।



LA সরলরেখাটি  $\bar{b}$ -এর সমান্তরাল এবং MC সরলরেখা  $\bar{c}$ -এর সমান্তরাল।

LM হলো সরলরেখাদুটির মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব।

$LM = LM$  সরলরেখার ওপর  $\overline{AC}$  ভেট্টের লম্ব অভিক্ষেপ।

এখন  $\overline{AC} = \bar{c} - \bar{a}$  এবং LM হল LA এবং MC সরলরেখাদুটির উভয়ের ওপর লম্ব।

সূতরাং  $\overline{LM}$  ভেট্টের  $\bar{b} \times \bar{d}$ -এর সমান্তরাল হবে।

$\therefore \overline{LM}$  ভেট্টের বরাবর একক ভেট্টের হলো  $\frac{\bar{b} \times \bar{d}}{|\bar{b} \times \bar{d}|}$ ।

$$\therefore LM = \overline{AC} \cdot \left\{ \frac{\bar{b} \times \bar{d}}{|\bar{b} \times \bar{d}|} \right\}$$

$$= (\bar{c} - \bar{a}) \cdot \left\{ \frac{\bar{b} \times \bar{d}}{|\bar{b} \times \bar{d}|} \right\} \quad \dots \dots (3)$$

নৈক্যতলীয় সরলরেখাদুটির সর্বনিম্ন দূরত্বের সমীকরণ নির্ণয় :

নৈক্যতলীয় সরলরেখাদুটির সর্বনিম্ন দূরত্বগামী সরলরেখাটি (অর্থাৎ LM সরলরেখা) হল এই সরলরেখা এবং নৈক্যতলীয় সরলরেখাদুটি দিয়ে অঙ্কিত দুটি সমতলের (অর্থাৎ ALM সমতল এবং CML সমতল) মধ্যগামী সরলরেখা।

LMA সমতলের উপর লম্ব হলো  $\bar{b} \times (\bar{b} \times \bar{d})$

কারণ  $\bar{b}$  ভেক্টর LA সরলরেখার সমান্তরাল এবং  $\overline{LM}$  ভেক্টর  $\bar{b} \times \bar{d}$ -এর সমান্তরাল।

এই সমতলটি A বিন্দুগামী বলে এটির সমীকরণ হবে।

$$(\bar{r} - \bar{a}) \cdot \{ \bar{b} \times (\bar{b} \times \bar{d}) \} = 0 \quad \dots \dots (4)$$

অনুরূপে LMC সমতলটির ওপর লম্ব হলো  $\bar{b} \times (\bar{b} \times \bar{d})$  এবং এটি C বিন্দুগামী বলে এটির সমীকরণ হবে  $(\bar{r} - \bar{c}) \cdot \{ \bar{b} \times (\bar{b} \times \bar{d}) \} = 0 \quad \dots \dots (5)$

(4) নং এবং (5) নং সমীকরণদুটি একই সঙ্গে LM সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে।

অনুসিদ্ধান্ত 1. : ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে

$$\bar{a} = (x_1, y_1, z_1), \bar{c} = (x_2, y_2, z_2)$$

$$\bar{b} = (l_1, m_1, n_1), \bar{d} = (l_2, m_2, n_2)$$

$$\therefore LM = (\bar{c} - \bar{a}) \cdot \left\{ \frac{(\bar{b} \times \bar{d})}{|\bar{b} \times \bar{d}|} \right\} = \frac{[\bar{c} - \bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{d}]}{|\bar{b} \times \bar{d}|} \quad \dots \dots (6)$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} \div \sqrt{\sum (m_1 n_2 - m_2 n_1)^2}$$

অনুসিদ্ধান্ত (2) : দুটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করার শর্ত নির্ণয় :

দুটি সরলরেখা যাদের ভেক্টর সমীকরণ যথাক্রমে

$$\bar{r} = \bar{a} + t\bar{b} \text{ এবং } \bar{r} = \bar{c} + s\bar{d}$$

যদি পরস্পর ছেদ করে তবে তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব শূন্য হবে। এই ক্ষেত্রে (6) নং সম্পর্ক হতে পাওয়া যায়  $[\bar{c} - \bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{d}] = 0 \quad \dots \dots (7)$

4.4.6 জ্যামিতিতে তিনি বা ততোধিক ভেক্টরের ক্ষেলার গুণফল এবং ভেক্টর গুণফলের প্রয়োগে ঘনফল নির্ণয় :

(ক) চতুর্স্তলকের ঘনফল নির্ণয় : ABCD একটি চতুর্স্তলক এবং O হল মূলবিন্দু। O-এর সাপেক্ষে A, B, C, D-এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$ ,  $\bar{c}$  এবং  $\bar{d}$ । DL হল D বিন্দু হতে ABC সমতলের উপর লম্ব। এখন  $\overline{AB} \times \overline{AC}$

$$= (\bar{b} - \bar{a}) \times (\bar{c} - \bar{a})$$

এটি  $\overline{LD}$  ভেক্টরের সমান্তরাল ভেক্টর এবং এটির মান (Magnitude) হলো  $2\Delta ABC$

$$= 2 \times \text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল}$$

$\bar{n}$  হলো ABC সমতলের ওপর লম্ব এবং একক

ভেক্টর  $LD = \overline{LD}$  ভেক্টরের ওপর  $\overline{AD}$  ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$= AD \cdot \cos\theta [ \angle ADL = \theta = \overline{AD} \text{ এবং } \bar{n} \text{ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ} ]$$

∴ চতুর্স্তলকের ঘনফল

$$= \frac{1}{3} \times \text{ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} \times LD$$

$$= \frac{1}{3} \times \Delta ABC \times LD$$

$$= \frac{1}{6} \cdot |\overline{AB} \times \overline{AC}| \cdot LD$$

$$= \frac{1}{6} \cdot |\overline{AB} \times \overline{AC}| \cdot AD \cdot \cos\theta$$


$$= \frac{1}{6} \cdot |\overline{AB} \times \overline{AC}| \{ |\overline{AD}|, |\bar{n}|, \cos\theta \} \quad [\because |\bar{n}| = 1]$$

$$= \frac{1}{6} \cdot |\overline{AB} \times \overline{AC}| (\overline{AD} \cdot \bar{n}) = \frac{1}{6} \{ |\overline{AB} \times \overline{AC}| \bar{n} \} \cdot \overline{AD}$$

$$= \frac{1}{6} \cdot |\overline{AB} \times \overline{AC}| \cdot \overline{AD} \quad [\because |\overline{AB} \times \overline{AC}| = |\overline{AB} \times \overline{AC}| \bar{n}]$$

$$= \frac{1}{6} \{ (\bar{b} - \bar{a}) \times (\bar{c} - \bar{a}) \} \cdot (\bar{d} - \bar{a})$$

$$= \frac{1}{6} (\bar{b} - \bar{a}) \cdot \{ (\bar{c} - \bar{a}) \} \times (\bar{d} - \bar{a}) \quad [\text{ভেক্টরগুণ ও ক্ষেলারগুণের বিনিময় করে}]$$



চিত্র-19

$$= \frac{1}{6} [\bar{b} - \bar{a} \bar{c} - \bar{a} \bar{d} - \bar{a}] \quad \dots\dots (1)$$

$$= \frac{1}{6} \{[\bar{b} \bar{c} \bar{d}] + [\bar{c} \bar{a} \bar{d}] + [\bar{d} \bar{a} \bar{b}] - [\bar{a} \bar{b} \bar{c}]\} \dots\dots (2)$$

অনুসিদ্ধান্ত (1) : ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে

$$\bar{a} = x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k}$$

$$\bar{b} = x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}$$

$$\bar{c} = x_3 \hat{i} + y_3 \hat{j} + z_3 \hat{k}$$

$$\bar{d} = x_4 \hat{i} + y_4 \hat{j} + z_4 \hat{k}$$

$$\bar{b} - \bar{a} = (x_2 - x_1) \hat{i} + (y_2 - y_1) \hat{j} + (z_2 - z_1) \hat{k}$$

$$\bar{c} - \bar{a} = (x_3 - x_1) \hat{i} + (y_3 - y_1) \hat{j} + (z_3 - z_1) \hat{k}$$

$$\bar{d} - \bar{a} = (x_4 - x_1) \hat{i} + (y_4 - y_1) \hat{j} + (z_4 - z_1) \hat{k}$$

∴ চতুর্ভুলকের ঘনফল

$$= \frac{1}{6} [\bar{b} - \bar{a} \bar{c} - \bar{a} \bar{d} - \bar{a}]$$

$$= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}$$

অনুসিদ্ধান্ত (2) : চারটি বিন্দু সামতলিক হওয়ার প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট শর্ত হলো  
ঐ বিন্দুগুলিকে শীর্ষবিন্দু ধরে অঙ্কিত চতুর্ভুলকের ঘনফল শূন্য হবে

$$\text{অর্থাৎ } [\bar{b} \bar{c} \bar{d}] + [\bar{c} \bar{a} \bar{d}] + [\bar{d} \bar{a} \bar{b}] - [\bar{a} \bar{b} \bar{c}] = 0$$

অনুসিদ্ধান্ত (3) : চতুর্ভুলকের যে কোন দুটি নৈক্যতলীয় বাহুর মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় :

19 নং ছবি হতে দেখা যায়  $\overline{AC}$  এবং  $\overline{BD}$  দুটি নৈক্যতলীয় বাহু।

$\overline{AC}$  এবং  $\overline{BD}$  এই দুটি বাহুর মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্বের সংখ্যামান হবে

$$\frac{(\bar{d} - \bar{a}) \cdot \{(\bar{c} - \bar{a}) \times (\bar{d} - \bar{b})\}}{(\bar{c} - \bar{a}) \times (\bar{d} - \bar{b})}$$

[4.4.5 অনুচ্ছেদের (3)নং সম্পর্ক অনুযায়ী]

অনুরূপভাবে  $\overline{AD}$  এবং  $\overline{BC}$  বাহ্যিক ও  $\overline{AB}$  এবং  $\overline{DC}$  বাহ্যিকের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

অনুসিদ্ধান্ত (4) : যদি A বিন্দুকে ভেক্টর মূলবিন্দু ধরা হয় তাহলে ABCD চতুর্ভুক্তকের ঘনফল

$$(1) \text{ নং সম্পর্ক হতে } ABCD \text{ চতুর্ভুক্তকের ঘনফল হবে } = \frac{1}{6} [\bar{b} \bar{c} \bar{d}].$$

#### 4.4.9 গোলকের সমীকরণ নির্ণয়ে ভেক্টরের প্রয়োগ :

(ক) একটি গোলকের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যার কেন্দ্রের অবস্থান ভেক্টর  $\bar{c}$  এবং ব্যাসার্ধ  $a$ ।

মনেকরি গোলকের কেন্দ্র C এর অবস্থান ভেক্টর O-মূলবিন্দুর সাপেক্ষে হলো  $\bar{c}$  এবং গোলকের ব্যাসার্ধ a। গোলকের ওপরে P যে কোন একটি বিন্দু।

P-এর অবস্থান ভেক্টর O-এর সাপেক্ষে হলো  $\bar{r}$ ।

$$\therefore \overline{CP} = \bar{r} - \bar{c}$$


$$\text{এখন } |\overline{CP}|^2 = a^2$$

$$\therefore |\bar{r} - \bar{c}|^2 = a^2$$

$$\text{অথবা } (\bar{r} - \bar{c}) \cdot (\bar{r} - \bar{c}) = a^2$$

$$\text{অথবা } \boxed{\bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} + \bar{c}^2 = a^2} \quad \dots\dots (1)$$

এটিই হলো গোলকটির ভেক্টর সমীকরণ।



চিত্র-20

$$\text{যদি } k = \bar{c}^2 - a^2 \text{ হয় তাহলে (1)-এর সমীকরণ হবে } \bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} + k = 0 \quad \dots\dots (2)$$


অনুসিদ্ধান্ত (1) : যদি গোলকটির কেন্দ্র মূলবিন্দু হয় তবে  $\bar{c} = \bar{O}$  এবং গোলকটির সমীকরণ (1) নং হতে হবে  $\bar{r}^2 = a^2$   $\dots\dots (3)$

অনুসিদ্ধান্ত (2) : যদি ভেক্টর মূলবিন্দু O গোলকের তলের উপরে থাকে তবে  $\bar{c}^2 = a^2$  এবং সেক্ষেত্রে গোলকের সমীকরণ হবে।

$$\bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} = 0 \quad \dots\dots (4)$$

(খ) একটি গোলকের কোনও ব্যাসের প্রান্তবিন্দুসহের অবস্থান ভেক্টর পদ্ধত হলে গোলকের সমীকরণ নির্ণয় :

AB হল গোলকটির একটি ব্যাস ও প্রান্তবিন্দুসহ A এবং B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\bar{a}$  এবং  $\bar{b}$  মনেকরি P হলো গোলকটির ওপর যে কোনও একটি বিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর হলো  $\bar{r}$ ।



চিত্র-21

$$\text{তাহলে } \overline{AP} = \bar{r} - \bar{a}, \overline{BP} = \bar{r} - \bar{b}$$

যেহেতু  $\overline{PA}$  এবং  $\overline{PB}$  পরম্পর লম্ব (অর্ধবৃত্ত কোণ সমকোণ বলে),

$$(\bar{r} - \bar{a}) \cdot (\bar{r} - \bar{b}) = 0 \quad \dots\dots (5)$$

এটিই হলো গোলকটির ভেক্টর সমীকরণ।

(গ) একটি গোলক ও একটি সরলরেখার ছেদবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় :

মনে করি গোলকটির সমীকরণ

$$\bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} + k = 0 \quad \dots\dots (6)$$

এবং সরলরেখাটির সমীকরণ

$$\bar{r} = \bar{a} + t\bar{b} \quad \dots\dots (7)$$

$t$ -এর যে সকল মানের জন্য সরলরেখাটি গোলকটিকে ছেদ করবে তা নির্ণয় করতে হবে।

এখন (6) এবং (7) হতে পাওয়া যায়

$$(\bar{a} + t\bar{b})^2 - 2(\bar{a} + t\bar{b}) \cdot \bar{c} + k = 0$$

$$\text{অথবা } \boxed{\bar{b}^2 t^2 + 2\bar{b} \cdot (\bar{a} - \bar{c}) + \bar{a}^2 - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k = 0} \quad \dots\dots (8)$$

এটি  $t$ -এর একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। (8)-এর দুটি মানের জন্য (6) এবং (7)-এর ছেদবিন্দুয়ের অবস্থান ভেক্টর পাওয়া যাবে।

অনুসিদ্ধান্ত (1) : (7) নং সরলরেখাটি (6) নং সরলরেখাকে স্পর্শ করবে যদি (8) নং সমীকরণে  $t$ -এর মান দুটি সমান হয়।

অনুসিদ্ধান্ত (2) : মনে করি A বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  $\bar{a}$  এবং সরলরেখাটি গোলককে P এবং Q বিন্দুতে ছেদ করছে। (8) নং সমীকরণের বীজন্য  $t_1$  এবং  $t_2$  হলে

P এবং Q-এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\bar{a} + t_1\bar{b}$  এবং  $\bar{a} + t_2\bar{b}$  হবে।


$$(8) \text{ নং সমীকরণ হতে } t_1 t_2 = \frac{\bar{a}^2 - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k}{\bar{b}^2} \quad \dots\dots (9)$$

$$\text{এখন } \overline{AP} = (\bar{a} + t_1\bar{b}) - \bar{a} = t_1\bar{b} \quad \therefore AP = |t_1|\bar{b}|$$

$$\text{অনুরূপে } \overline{AQ} = t_2\bar{b} \quad \therefore AQ = |t_2|\bar{b}|$$

$$\therefore AP \cdot AQ = t_1 t_2 |\bar{b}|^2 = t_1 t_2 \bar{b}^2 = \bar{a}^2 - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k$$

[ (9) নং হতে ]



চিত্র-22

যদি সরলরেখাটি গোলককে স্পর্শ করে  $T$  বিন্দুতে সেক্ষেত্রে (8)নং সমীকরণের বীজন্ধয় সমান হবে অর্থাৎ

$$t_1 = t_2 \text{ হবে } \therefore AP = AQ = AT$$

$$\therefore AT = \bar{a}^2 - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k \quad \dots\dots(10)$$

(ঘ) একটি প্রদত্ত গোলকের ওপর নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক তলের ভেষ্টের সমীকরণ নির্ণয় :

20 নং ছবি হতে দেখা যাচ্ছে যদি (9)নং সরলরেখাটি  $A$  বিন্দুতে স্পর্শক হয় তবে  $A, P, Q$  সমাপ্তিত হবে।

$$\text{এক্ষেত্রে } t_1 = 0 \text{ হবে } \therefore t_2 = 0$$

$$\text{সূত্রাং (8)নং সমীকরণ হতে } t_1 + t_2 = 0 \text{ এবং } t_1 t_2 = 0$$

$$\therefore \bar{b}(\bar{a} - \bar{c}) = 0 \quad \dots\dots(11)$$

$$\text{এবং } \bar{a}^2 - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k = 0 \quad \dots\dots(12)$$

(11)নং শর্তটি নির্দেশ করে সরলরেখা  $\bar{r} = \bar{a} + t\bar{b}$  এবং  $(\bar{a} - \bar{c})$  ভেষ্টের পরম্পরের ওপর লম্ব।

$$\therefore (\bar{r} - \bar{a}) \cdot (\bar{a} - \bar{c}) = 0 \quad \dots\dots(13)$$

(13) নং সমীকরণ হতে বোঝা যাচ্ছে  $A$  বিন্দুগামী সকল স্পর্শক (13)নং তলের ওপর অবস্থিত।

(13) নং হতে

$$\bar{r} \cdot \bar{a} - \bar{r} \cdot \bar{c} - \bar{a}^2 + (\bar{a} \cdot \bar{c}) = 0$$

$$\text{অথবা } \bar{r} \cdot \bar{a} - \bar{c} \cdot (\bar{r} - \bar{a}) - \bar{a}^2 = 0$$

$$\text{অথবা } \bar{r} \cdot \bar{a} - \bar{c} \cdot (\bar{r} - \bar{a}) - 2\bar{a} \cdot \bar{c} + k = 0 \quad [(12)\text{নং হতে}]$$

$$\text{অথবা } [\bar{r} \cdot \bar{a} - \bar{c} \cdot (\bar{r} + \bar{a}) + k = 0] \quad \dots\dots(14)$$

এটাই হলো  $A$  বিন্দুতে (যার অবস্থান ভেষ্টের) গোলকের স্পর্শকতলের ভেষ্টের সমীকরণ।

(ঙ)  $\bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} + k = 0$  এই সমীকরণ বিশিষ্ট কোন গোলককে  $\bar{r} \cdot \bar{n} = p$  এই সমতল দ্বারা স্পর্শ করার শর্ত :

$$\text{মনে করি } \bar{r}^2 - 2\bar{r} \cdot \bar{c} + k = 0$$

এই গোলকের কোন বিন্দুতে

$$\bar{r} \cdot \bar{n} = p \text{ একটি স্পর্শক তল।}$$

এক্ষেত্রে গোলকের কেন্দ্র হতে স্পর্শবিন্দুতে স্পর্শক তলের উপর লম্ব দূরত্ব গোলকের ব্যাসার্ধের সমান হবে।

এখন গোলকের কেন্দ্র C-এর অবস্থান ভেট্টের  $\vec{r}$ । C-হতে  $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$  এই তলের ওপর লম্ব দূরত্ব

$$= \frac{|\vec{p} - \vec{c} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \quad [4.4.2 \text{ অনুচ্ছেদের (ক) হতে}]$$

$\therefore$  নিচের শর্তটি হলো

$$\frac{|\vec{p} - \vec{c} \cdot \vec{n}|^2}{|\vec{n}|^2} = a^2$$

অথবা  $\frac{|\vec{p} - \vec{c} \cdot \vec{n}|^2}{\vec{n}^2} = a^2$

#### 4.5 বিবিধ উদাহরণমালা :

উদাহরণ—1 : একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করুন যা  $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$  এই ভেট্টেরের সমান্তরাল।

সমাধান : সরলরেখাটির সমীকরণ হবে

$$\vec{r} = t(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

(4.3.1 অনুচ্ছেদের 1নং সমীকরণ দেখুন)

যেখানে  $t$  একটি ক্ষেত্রার সংখ্যা।

উদাহরণ—2 : একটি সরলরেখার ভেট্টের সমীকরণ নির্ণয় করুন যা  $(3\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  বিন্দুগামী এবং  $(2\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k})$  এই ভেট্টেরের সমান্তরাল।

সমাধান : ভেট্টের সমীকরণ হবে


$$\vec{r} = (3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k})$$

অর্থাৎ  $\vec{r} = (3+2t)\hat{i} + (t-1)\hat{j} + (1-4t)\hat{k}$

উদাহরণ—3 : একটি সরলরেখার ভেট্টের সমীকরণ নির্ণয় করুন যা


$(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  এবং  $(3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$  বিন্দুগামী।

সমাধান : মনে করি A এবং B বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের O বিন্দুর সাপেক্ষে যথাক্রমে  $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  এবং



$$\begin{array}{c} 2\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k} \\ \hline \hline \end{array}$$

A(  $3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  )



$(3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$ । P সরলরেখার ওপর যে কোনও একটি বিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর  $\bar{r}$ ।

$$\text{সূতরাং } \overline{AB} = (3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\overline{AP} = \bar{r} - (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$\therefore \overline{AP} = t \overline{AB} \quad [4.3.1\text{-এর (2) নং সমীকরণ দেখুন]$$

$$\therefore \bar{r} - (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) = t(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$$

$$\therefore \bar{r} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + t(2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$$

$$= (1+2t)\hat{i} + (1+t)\hat{j} + (1-2t)\hat{k}$$

$$\therefore \bar{r} = (1+2t)\hat{i} + (1+t)\hat{j} + (1-2t)\hat{k}$$

উদাহরণ—3 : একটি সমতলের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় করুন যা  $(-1, 1, 2), (1, -2, 1)$  এবং  $(2, 2, 4)$  বিন্দুগামী।

সমাধান : প্রদত্ত তিনটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\bar{a} = (-\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$ ,

$$\bar{b} = (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) \text{ এবং } \bar{c} = (2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k})$$

এখানে সমতলটির ভেক্টর সমীকরণ হবে

$$\bar{r} \cdot (\bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a}) = [\bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{c}]$$

[4.3.1 অনুচ্ছেদের 8নং সমীকরণ দেখুন]

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$$

$$\bar{b} \times \bar{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -10\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\bar{c} \times \bar{a} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -8\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\therefore \bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k} - 10\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k} - 8\hat{j} + 4\hat{k} \\ = -5\hat{i} - 7\hat{j} + 11\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\therefore [\bar{a} \quad \bar{b} \quad \bar{c}] &= \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) \\&= (-\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (-10\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}) \\&= 10 - 2 + 12 = 20\end{aligned}$$

$\therefore$  সমতলটির ভেক্টর সমীকরণ হবে  $\bar{r} (11\hat{k} - 5\hat{i} - 7\hat{j}) = 20$

উদাহরণ (4) : একটি সমতল  $(1, -2, 4)$  এবং  $(3, 0, 2)$  এবং  $(3, 1, 4)$  বিন্দুগামী।  $(3, 6, -5)$  এবং  $(1, 2, 3)$  বিন্দুসমূহের সংযোজক সরলরেখা সমতলটিকে যে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাদের অবস্থান ভেক্টর নির্ণয় করুন।

আমরা জানি  $(3, 6, -5)$  এবং  $(1, 2, 3)$  বিন্দুগামী সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ হবে


$$\bar{r} = (3\hat{i} + 6\hat{j} - 5\hat{k}) + t\{(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) - (3\hat{i} + 6\hat{j} - 5\hat{k})\}$$

$$[\because \overline{AP} = t \overline{AB}]$$

$$\text{অথবা } \bar{r} = (3 - 2t)\hat{i} + (6 - 4t)\hat{j} + (8t - 5)\hat{k} \quad (1)$$

$$\text{আবার } (1, -2, 4), (3, 0, 2), (3, 1, 4)$$

বিন্দুগামী সমতলের সমীকরণ হবে



$$\bar{r} = (1 - t_1, -s)(\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}) + t_1(3\hat{i} + 2\hat{k}) + s(3\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k})$$

[4.4.1 অনুচ্ছেদের (9)নং সমীকরণ দেখুন]

$$= (1 + 2s + 2t_1)\hat{i} + (3s + 2t_1 - 2)\hat{j} + (4 - 2t_1)\hat{k} \quad (2)$$

যেখানে  $t, s, t_1$  তিনটি ক্ষেত্রাল সংখ্যা।

(1) নং সরলরেখাটি যে বিন্দুতে (2)নং সমতলটিকে ছেদ করে সেই বিন্দুটির অবস্থান ভেক্টর (1) এবং (2) সমীকরণে একই হবে।

$\therefore \hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$  এর সহগগুলি তুলনা করে পাই

$$3 - 2t = 1 + 2s + 2t_1 \quad \dots \dots \quad (i)$$

$$6 - 4t = 3s + 2t_1 - 2 \quad \dots \dots \quad (ii)$$

$$8t - 5 = 4 - 2t_1 \quad \dots \dots \quad (iii)$$

সমাধান করে পাওয়া যাবে

$$t = \frac{19}{10}, \quad t_1 = -\frac{31}{10}, \quad s = \frac{11}{5}$$

সূতরাং নির্ণেয় ছেদবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর (1) বা (2) হতে

$$\bar{r} = -\frac{4}{5}\hat{i} - \frac{8}{5}\hat{j} + \frac{51}{5}\hat{k}$$

উদাহরণ—5. : দুটি সরলরেখা  $L_1$  এবং  $L_2$ -এর ভেক্টর সমীকরণ দুটি যথাক্রমে

$$\bar{r} = 3\hat{i} + \hat{j} + t(2\hat{j} + \hat{k})$$

$\bar{r} = 4\hat{k} + s(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ , যেখানে  $t$  এবং  $s$  দুটি ক্ষেত্র। প্রমাণ করেন  $L_1$  এবং  $L_2$  পরস্পরছেদি এবং তারা যে সমতলে অবস্থিত তার ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় করুন।

আমরা জানি যে দুটি সরলরেখা  $L_1$  এবং  $L_2$  যাদের সমীকরণ যথাক্রমে  $\bar{r} = \bar{a}_1 + t\bar{b}_1$  এবং

$$\bar{r} = \bar{a}_2 + t\bar{b}_2$$
 তাদের সামতলিক হওয়ার শর্ত হবে  $[\bar{a}_1 \ \bar{b}_1 \ \bar{b}_2] = [\bar{a}_2 \ \bar{b}_1 \ \bar{b}_2]$

[4.4.1 অনুচ্ছেদের (6)-এর অনুসিদ্ধান্ত (1) দেখুন]

$$\text{এখানে } \bar{a}_1 = 3\hat{i} + \hat{k}, \bar{b}_1 = 2\hat{j} + \hat{k}$$

$$\bar{a}_2 = 4\hat{k}, \bar{b}_2 = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$[\bar{a}_1 \ \bar{b}_1 \ \bar{b}_2] = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3(-2 - 1) + 1(1) = -9 + 1 = -8$$

$$[\bar{a}_2 \ \bar{b}_1 \ \bar{b}_2] = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4(-2) = -8$$

সূতরাং সরলরেখা দুটি ছেদ করবে।

নির্ণয় সমতলটির ভেক্টর সমীকরণ হবে (4.4.1 অনুচ্ছেদের (6)-এর (10) নং সমীকরণ দেখুন)

$$[\bar{r} \ \bar{b}_1 \bar{b}_2] = [\bar{a}_1 \ \bar{b}_1 \bar{b}_2]$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (\bar{b}_1 \times \bar{b}_2) = -8$$

$$\text{বা এখন } \bar{b}_1 \times \bar{b}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমীকরণটি হবে } \bar{r} \cdot (-3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}) = -8$$

উদাহরণ—6. : O, Q, R, S চারটি বিন্দু (যাদের যে কোনও তিনটি সমরেখ নয়)। যদি O-এর সাপেক্ষে Q, R, S বিন্দুগুলির অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\bar{\beta}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\delta}$  হয় তবে OQ এবং RS-এর মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $\overline{OQ}$  সরলরেখার সমীকরণ হবে  $\bar{\lambda} = t\bar{\beta}$  ----- (1)


এবং RS সরলরেখার সমীকরণ হবে  $\bar{r} - \bar{\gamma} = s(\bar{\delta} - \bar{\gamma})$

$$\text{অর্থাৎ } \bar{r} = \bar{\gamma} + s(\bar{\delta} - \bar{\gamma}) \quad \dots \dots \quad (2)$$

সূতরাং তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব হবে

$$\frac{(\bar{\gamma} - 0) \cdot \{ \bar{\beta} \times (\bar{\delta} - \bar{\gamma}) \}}{|\bar{\beta} \times (\bar{\delta} - \bar{\gamma})|}$$

$$\frac{\bar{\gamma} \cdot \{ \bar{\beta} \times (\bar{\delta} - \bar{\gamma}) \}}{|\bar{\beta} \times (\bar{\delta} - \bar{\gamma})|}$$



[4.4.5 অনুচ্ছেদের (খ) এ (3) নং সম্পর্ক দেখুন]

$$\text{উদাহরণ}—7 : \bar{r} = \bar{r}_1 + t\bar{\alpha} \text{ এবং } \bar{r} = \bar{r}_2 + t\bar{\beta}$$

এই দুটি নৈক্যতলীয় সরলরেখার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করুন। যেখানে  $s, t$  দুটি ক্ষেত্রাল এবং  $\bar{r}_1, \bar{\alpha}, \bar{r}_2, \bar{\beta}$  ভেষ্টরগুলি হলো যথাক্রমে  $(1, -2, 3), (2, 1, 1), (-2, 2, -1)$  এবং  $(-3, 1, 2)$ .

$$\text{সমাধান} : \text{এখানে } \bar{r}_1 = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\bar{r}_2 = -2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

$$\bar{\alpha} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}, \bar{\beta} = (-3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$$

$$\therefore \bar{\alpha} \times \bar{\beta} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \hat{i} - 7\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$\therefore |\bar{\alpha} \times \bar{\beta}| = \sqrt{1 + 49 + 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

$$\text{আবার } |\bar{r}_1 - \bar{r}_2| = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$$

সূতরাং তাদের মধ্যে নির্মোয় সর্বনিম্ন দূরত্ব হবে

$$\frac{(\bar{r}_1 - \bar{r}_2) \cdot (\bar{\alpha} \times \bar{\beta})}{|\bar{\alpha} \times \bar{\beta}|} \quad [4.4.5 \text{ অনুচ্ছেদের (3)নং সম্পর্ক হতে}]$$

$$= \frac{(3\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}) \cdot (\hat{i} - 7\hat{j} + 5\hat{k})}{5\sqrt{3}}$$

$$\frac{3+28+20}{5\sqrt{3}} = \frac{51}{5\sqrt{3}} \text{ একক।}$$

উদাহরণ—৪. : একটি একক ঘনকের কোনও কৌণিক বিন্দু হতে কোন কর্ণের (যা ঐ বিন্দুগামী নয়) উপর লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করুন।

সমাধান : মনে করি OABCDEFG একটি একক ঘনক। এবং  $\overline{OA} = \hat{i}$ ,  $\overline{OC} = \hat{j}$ ,  $\overline{OE} = \hat{k}$ , যেখানে  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$ ,  $\hat{k}$  তিনটি পরস্পর লম্ব একক ভেস্টের।

$$\begin{aligned}\therefore \text{কর্ণ } \overline{OG} &= \overline{OB} + \overline{BG} \\ &= \overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BG} \\ &= \overline{OA} + \overline{OC} + \overline{OE} \\ &= \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\end{aligned}$$

সূতরাং  $\overline{OG}$  বরাবর একক ভেস্টের হবে  $\frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}}$

EM হলো  $\overline{OG}$ -এর লম্ব।

$$\therefore \overline{OM} = OM \cdot \left( \frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}} \right)$$

আবার  $OM = \overline{OE}$  এর  $\overline{OM}$ -এর উপর লম্ব অভিক্ষেপ

$$= \overline{OE} \cdot \overline{OM}$$

$$= k \cdot \left( \frac{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$\text{আবার } |\overline{OE}| = 1$$

$$\therefore EM^2 = OE^2 - OM^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore EM = \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ একক।}$$

উদাহরণ—৫ :  $A(4, d, -1)$ ,  $B(4, 2, -2)$  এবং  $C(6, 4, -1)$  তিনটি বিন্দু সমরেখ নয়।


$A$  বিন্দু হতে  $BC$  সরলরেখার উপর লম্ব দূরত্ব ১।  $d$ -এর মান নির্ণয় করুন।



সমাধান : এক্ষেত্রে  $\overline{BA} = (0, d-2, 1)$

এবং  $\overline{BC} = (2, 2, 1) \therefore |\overline{BC}| = \sqrt{4+4+1} = 3$

$$\text{প্রদত্ত শর্তানুসারে } \frac{|\overline{BC} \times \overline{BA}|}{|\overline{BC}|} = 1 \quad \dots\dots (1)$$



এখন  $\overline{BC} \times \overline{BA}$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & d-2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (4-d)i - 2j + (2d-4)k$$

$$\therefore (4-d)^2 + 4 + (2d-4)^2 = 9 \quad (\text{যিৎ হতে})$$

$$\text{বা } 5d^2 - 24d + 27 = 0$$

$$\text{বা } (d-3)(5d-9) = 0$$

$$\therefore d = 3, \frac{9}{5}$$

উদাহরণ—10 :  $\vec{r} = t\vec{\alpha}$  এই সরলরেখাগামী এবং  $\vec{r} = t_1\vec{\beta}$  ও  $\vec{r} = t_2\vec{\gamma}$  সরলরেখাদ্বয় যে সমতলে আছে তার ওপর লম্ব সমতলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

সমাধান : প্রদত্ত সরলরেখা  $\vec{r} = t\vec{\alpha}$  মূলবিন্দুগামী এবং এটি  $\vec{\alpha}$ -এর সমান্তরাল। যেহেতু নির্ণেয় সমতলটির মধ্যে এই সরলরেখা আছে সূতরাং এই সমতলটি মূল বিন্দুগামী হবে এবং  $\vec{\alpha}$  ভেক্টরের সমান্তরাল হবে। প্রদত্ত সমতলটির ওপর লম্ব হলো  $\vec{\beta} \times \vec{\gamma}$ ।

সূতরাং নির্ণেয় তলটি  $\vec{\beta} \times \vec{\gamma}$  এর সমান্তরাল হবে।

এক্ষেত্রে  $\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma})$  ভেক্টরটি এই সমতলের ওপর লম্ব ভেক্টর হবে।

সূতরাং সমতলটির সমীকরণ হবে  $\vec{r} \cdot \{\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma})\} = 0 \quad [4.4.1 \text{ অনুচ্ছেদের (2)নং সমীকরণ দেখুন}]$

উদাহরণ—11 : তিনটি সমতলের ভেক্টর সমীকরণ যথাক্রমে  $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = p_1$ ,  $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = p_2$ ,  $\vec{r} \cdot \vec{n}_3 = p_3$  যেখানে  $\vec{n}_1$ ,  $\vec{n}_2$ ,  $\vec{n}_3$  হল অসামতলিক ভেক্টর। এদের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করুন।

সমাধান : যেহেতু প্রদত্ত সমতল তিনটির ওপর লম্ব ভেক্টরগুলি অসামতলিক সূতরাং  $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ ,  $\vec{n}_2 \times \vec{n}_3$ ,  $\vec{n}_3 \times \vec{n}_1$  এই ভেক্টরগুলি অসামতলিক হবে।

মনে করি প্রদত্ত সমতলগুলি একটি বিন্দুতে ছেদ করে যার অবস্থান ভেক্টর হল  $\bar{r}$ ।

$$\bar{r} \cdot \bar{n}_1 = p_1, \quad \bar{r} \cdot \bar{n}_2 = p_2, \quad \bar{r} \cdot \bar{n}_3 = p_3$$

আবার  $\bar{r}$  ভেক্টরকে  $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2$ ,  $\bar{n}_2 \times \bar{n}_3$ ,  $\bar{n}_3 \times \bar{n}_1$ -এর বৈধিক সমবায় হিসাবে লেখা যায়।

$$\bar{r} = x(\bar{n}_2 \times \bar{n}_3) + y(\bar{n}_3 \times \bar{n}_1) + z(\bar{n}_1 \times \bar{n}_2) \quad \dots(1)$$

সূতরাং  $\bar{r} \cdot \bar{n}_1 = p_1 \Rightarrow$

$$x\{\bar{n}_1 \cdot (\bar{n}_2 \times \bar{n}_3)\} = p_1$$

$$\therefore x = \frac{p_1}{[\bar{n}_1 \bar{n}_2 \bar{n}_3]}$$

$$\text{অনুরূপে } y = \frac{p_2}{[\bar{n}_1 \bar{n}_2 \bar{n}_3]}, \quad z = \frac{p_3}{[\bar{n}_1 \bar{n}_2 \bar{n}_3]}$$

(1) নং সম্পর্কে x, y, z-এর মান বসিয়ে প্রদত্ত সমতলগুলির সাধারণবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর পাওয়া যাবে।

**উদাহরণ—12 :** একটি সমতলের ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় করুন যা  $(8\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$  বিন্দুগামী ও  $\bar{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 0$  এবং  $\bar{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}) + 5 = 0$  এই দুটি সমতলের প্রত্যেকটির ওপর লম্ব।

সমাধান :  $\bar{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) = 0$ -এর ওপর লম্ব ভেক্টর হল  $2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$  এবং  $\bar{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}) + 5 = 0$  এর ওপর লম্ব ভেক্টর হলো  $\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$  ( $\bar{r} \cdot \bar{n} = p$ -এর সঙ্গে তুলনা করে) নির্ণেয় সমতলটি এই দুটি ভেক্টরের সঙ্গে সমান্তরাল হবে।

সূতরাং  $(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \times (\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$  এই ভেক্টরটি নির্ণেয় সমতলের ওপর লম্ব হবে।

$$\text{এখন } (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \times (\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -5 \end{vmatrix} = -\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k}$$

নির্ণেয় সমতলটি  $(8\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})$  বিন্দুগামী বলে এটির সমীকরণ হবে

$$\{(\bar{r} - (8\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})) \cdot (-\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k})\} = 0$$

[4.4.1 অনুচ্ছেদের 1 নং সমীকরণ দেখুন]

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (-\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k}) = (8\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) \cdot (-\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k})$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (-\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k}) = -8 + 24 - 21 = -5$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot (-\hat{i} + 12\hat{j} + 7\hat{k}) + 5 = 0$$

**উদাহরণ—13.** : PQRS একটি চতুর্ভুলক যার শীর্ষবিন্দুগুলির অবস্থান ভেটার যথাক্রমে  $(-5, -4, 8), (2, 3, 1), (4, 1, 2)$  এবং  $(6, 3, 7)$ ।

P বিন্দু হতে QRS সমতলটির লম্ব ধূরত্ব নির্ণয় করুন।

**সমাধান :** মনে করি O হলে I মূলবিন্দু।

$$\overline{OP} = -5\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k}$$

$$\overline{OQ} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}, \quad \overline{OR} = 4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\overline{OS} = 6\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$$

$$\overline{OQ} \times \overline{OS} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 6 & 3 & 7 \end{vmatrix} = +18\hat{i} - 8\hat{j} - 12\hat{k}$$

$$\therefore \overline{OS} \times \overline{OQ} = -18\hat{i} + 8\hat{j} + 12\hat{k}$$

$$\overline{OQ} \times \overline{OR} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5\hat{i} - 10\hat{k}$$

$$\overline{OR} \times \overline{OS} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 7 \end{vmatrix} = \hat{i} - 16\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$\overline{OQ} \cdot (\overline{OR} \times \overline{OS}) = (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) \cdot (\hat{i} - 16\hat{j} + 6\hat{k}) = -40$$

QRS সমতলের সমীকরণ হবে [অনুচ্ছেদ 4.4.1-এর 8 নং সমীকরণ]

$$\bar{r} \cdot [\overline{OQ} \times \overline{OR} + \overline{OR} \times \overline{OS} + \overline{OS} \times \overline{OQ}] = [\overline{OQ} \quad \overline{OR} \quad \overline{OS}]$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot [5\hat{i} - 10\hat{k} + \hat{i} - 16\hat{j} + 6\hat{k} - 18\hat{i} + 8\hat{j} + 12\hat{k}] = -40$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot [-12\hat{i} - 8\hat{j} + 8\hat{k}] = -40$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot [-3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}] = -10$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot \frac{-3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{9+4+4}} = +\frac{10}{\sqrt{17}}$$

$$\text{বা } \bar{r} \cdot \left( \frac{3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{17}} \right) = \frac{10}{\sqrt{17}} \quad \text{-----(1)} \quad [\bar{r} \cdot \bar{n} = p \text{ আকারে প্রকাশ করা হল}]$$

সূতরাং P বিন্দু হতে (1)নং সমতলটির লম্ব দূরত্ব

$$= \left| \frac{10}{\sqrt{17}} - \overline{OP} \cdot \left( \frac{3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{17}} \right) \right| \quad [4.4.2 \text{ অনুচ্ছেদের (ক) হতে } |\bar{n}|=1 \text{ হলে পাওয়া যায়}]$$

$$= \left| \frac{10}{\sqrt{17}} - \left\{ (-5\hat{i} - 4\hat{j} + 8\hat{k}) \cdot \left( \frac{3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}}{\sqrt{17}} \right) \right\} \right|$$

$$= \left| \frac{10}{\sqrt{17}} - \frac{15 - 8 - 16}{\sqrt{17}} \right| = \frac{49}{\sqrt{17}} \text{ একক।}$$

**উদাহরণ—14 :** একটি চতুর্ভুলকের ঘনফল হলো 2 এবং তিনটি শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেট্টের যথাক্রমে  $(1, 1, 0)$ ,  $(1, 0, 1)$ ,  $(2, -1, 1)$ । চতুর্থ শীর্ষ বিন্দুর সংগ্রামপথের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

**সমাধান :** মনে করি ABCD একটি চতুর্ভুলক এবং A, B, C বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের যথাক্রমে  $(1, 1, 0)$ ,  $(1, 0, 1)$  এবং  $(2, -1, 1)$ । মনে করি D এর অবস্থান ভেট্টের  $(\alpha, \beta, \gamma)$

চতুর্ভুলকের ঘনফল

$$= \frac{1}{6} (\overline{AB} \times \overline{AC}) \cdot \overline{AD}$$

$$\text{এখানে } \overline{AB} = -(i + j) + (i + k) = -j + k$$

$$\overline{AC} = i - 2j + k,$$

$$\overline{AD} = (\alpha - 1)i + (\beta - 1)j + \gamma k$$

$\therefore$  প্রদত্ত শর্তানুসারে

$$= \frac{1}{6} \{ \overline{AD} \cdot (\overline{AB} \times \overline{AC}) \} = 2$$

$$\text{বা } \frac{1}{6} \begin{vmatrix} \alpha - 1 & \beta - 1 & \gamma \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$\text{বা } (\alpha - 1)(-1 + 2) + ((\beta - 1)(1 + 0) + \gamma(0 + 1)) = 12$$

$$\text{বা } (\alpha - 1) + (\beta - 1) + \gamma = 12$$

$$\text{বা } \alpha + \beta + \gamma = 14$$

সূতরাং D বিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণ হবে  $x + y + z = 14$ .

**উদাহরণ—15 :** একটি চতুর্ভুক্তকের চারটি তলের সমীকরণ যথাক্রমে  $\bar{r} \cdot \bar{i} = 0$ ,  $\bar{r} \cdot \bar{j} = 0$ ,  $\bar{r} \cdot \bar{k} = 0$  এবং  $\bar{r} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}) = 0$ । শীর্ষবিন্দু দিয়ে অঙ্কিত আঙুর্গোলিকটির সমীকরণ নির্ণয় করুন। গোলকটির কেন্দ্রের অবস্থান ভেষ্টের নির্ণয় করুন।

সমাধান : মনে করি গোলকটির কেন্দ্রের অবস্থান ভেষ্টের  $\bar{a}$ । প্রদত্ত চারটি সমতলের ওপর কেন্দ্র হতে অঙ্কিত লম্বগুলি গোলকের ব্যাসার্ধের সমান হবে।

$$\therefore \bar{a} \cdot \bar{i} = \bar{a} \cdot \bar{j} = \bar{a} \cdot \bar{k} = \frac{\bar{a} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}) - a}{\sqrt{3}} \quad \dots \quad (1)$$

[4.4.2 অনুচ্ছেদের (ক) হতে]

$$\text{যদি } \bar{a} = \alpha_1 \bar{i} + \alpha_2 \bar{j} + \alpha_3 \bar{k} \text{ হয় তবে (1) হতে}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - a}{\sqrt{3}}$$

$$\text{বা } \frac{3\alpha_1 - a}{\sqrt{3}} = \alpha_1 \quad \therefore 3\alpha_1 - a = \sqrt{3}\alpha_1$$

$$\text{বা } (3 - \sqrt{3})\alpha_1 = a \quad \therefore \alpha_1 = \frac{a}{3 - \sqrt{3}}$$

$$\therefore \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_1 = \frac{a}{3 - \sqrt{3}} = \frac{a(3 + \sqrt{3})}{6} = \text{ব্যাসার্ধ}$$

গোলকের কেন্দ্রের অবস্থান ভেষ্টের হবে

$$\frac{a}{6}(3 + \sqrt{3})(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$\text{সূতরাং গোলকটির সমীকরণ হবে। } (\bar{r} - \bar{a})^2 = \left\{ \frac{a}{6}(3 + \sqrt{3}) \right\}^2$$

[4.4.7 অনুচ্ছেদের (1)নং সমীকরণ হতে]

## 4.6 সারাংশ :

- (i)  $\bar{r} = \bar{a} + \bar{b}$  সমীকরণটি সরলরেখার ভেষ্টের সমীকরণ যেখানে  $t$  একটি ক্ষেত্রাব।  
(ii) সমতলের ভেষ্টের সমীকরণের অভিলম্ব রূপটি (Normal form) হল

$$\bar{r} \cdot \bar{n} = p$$

যেখানে  $p =$  মূলবিন্দু থেকে সমতলের উপর লম্ব দূরত্ব।

## 4.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

- দেখান যে  $(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  এবং  $(3\hat{k} - 2\hat{j})$  বিন্দু দুটি দিয়ে যায় এমন সরলরেখার সমীকরণ হবে  $\bar{r} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k} + t(2\hat{k} - \hat{i})$
- একটি সমতল মূলবিন্দুগামী এবং  $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  ও  $(2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$  এই দুটি ভেষ্টেরের সমান্তরাল। দেখান যে সমতলটির ভেষ্টের সমীকরণ হবে

$$\bar{r} = (t + 2s)\hat{i} + (2t - s)\hat{j} + (3t - s)\hat{k}$$

- একটি সমতল  $(3, -2, -1)$  বিন্দুগামী এবং  $(1, -2, 4), (3, 2, -5)$  এই দুটি ভেষ্টেরের সমান্তরাল। দেখান যে সমতলটির কার্তেসীয় সমীকরণ হবে  $2x + 17y + 8z + 36 = 0$
- $(-2, 6, -6), (-3, 10, 9)$  এবং  $(-5, 0, -6)$  এই তিনটি বিন্দুগামী একটি সমতলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

$$[\text{উৎ: } \bar{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}) = 2]$$

- দেখান যে  $(2, 2, 2), (3, 1, 1)$  ও  $(6, -4, -6)$  বিন্দুগামী সমতলের কার্তেসীয় সমীকরণ হবে  $x + 2y - z = 4$
- একটি সরলরেখা  $(7, -3, 4)$  ও  $(2, -1, 1)$  বিন্দুগামী। একটি সমতলে অবস্থিত তিনটি বিন্দু হলো  $(3, 0, 1), (4, -1, 2)$  এবং  $(2, 1, -3)$ । দেখান যে ঐ সরলরেখা এবং ঐ সমতলের ছেদবিন্দুর অবস্থান ভেষ্টের হবে  $(5, -2, 3)$ ।
- $(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  ও  $(3\hat{k} - 2\hat{j})$  এই দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখার ভেষ্টের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

দেখান যে মূলবিন্দু ও  $4\hat{j}$  এবং  $(2\hat{i} + \hat{k})$  বিন্দুগামী সমতলকে ঐ সরলরেখাটি যে বিন্দুতে ছেদ করে তার অবস্থান ভেষ্টের হবে  $\frac{1}{5}(6\hat{i} - 10\hat{j} + 3\hat{k})$ ।

- দেখান যে  $(6, -4, 4), (0, 0, -4)$  বিন্দুয়ের সংযোজক সরলরেখা  $(-1, -2, -3)$  ও  $(1, 2, -5)$  বিন্দুয়ের সংযোজক সরলরেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার অবস্থান ভেষ্টের হবে  $(0, 0, -4)$ ।

9. দেখান যে  $\bar{r} = \bar{a} + t(\bar{b} + \bar{c})$  এবং  $\bar{r} = \bar{b} + t(\bar{c} + \bar{a})$  এই দুটি সরলরেখা যে বিন্দুতে ছেদ করে তার অবস্থান ভেষ্টের  $(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$ ।
10. একটি সমতল  $\bar{r} = \bar{a} + s\bar{b}$  এবং  $\bar{r} = \bar{a}' + t\bar{b}$  এই দুটি সরলরেখার সমাপ্তরাল। দেখান যে সমতলটির সমীকরণ হবে  $\bar{r}.((\bar{a}' - \bar{a}) \times \bar{b}) = [\bar{a} \ \bar{a}' \ \bar{b}]$
11. দেখান যে  $\bar{r} = \bar{a} + t(\bar{b} \times \bar{c})$  এবং  $\bar{r} = \bar{b} + s(\bar{c} \times \bar{a})$  এই দুটি সরলরেখা ছেদ করবে যদি  $\bar{a}.\bar{c} = \bar{b}.\bar{c}$  হয়। যেখানে  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  হলো তিনটি অসামতলিক ভেষ্টে। দেখান যে যদি এগুলি ছেদ করে তবে ছেদ বিন্দুর অবস্থান ভেষ্টের হবে
- $$\bar{r} = \frac{1}{[\bar{a} \ \bar{b} \ \bar{c}]} \{ (\bar{b}.\bar{a})(\bar{b} \times \bar{c}) + (\bar{a}.\bar{b})(\bar{c} \times \bar{a}) + (\bar{a}.\bar{c})(\bar{a} \times \bar{b}) \}$$
12.  $\bar{r} = \bar{a} + t\bar{\alpha}$  এবং  $\bar{r} = \bar{b} + s\bar{\beta}$  এই দুটি নেক্যাতলীয় সরলরেখার মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করুন যেখানে  $\bar{a} = 6\bar{i} + 2\bar{j} + 2\bar{k}$ ,  $\bar{b} = -4\bar{i} - \bar{k} - \bar{k}$ ,  $\bar{\alpha} = \bar{i} - 2\bar{j} + 2\bar{k}$  এবং  $\bar{\beta} = 3\bar{i} - 2\bar{j} - 2\bar{k}$ . [উৎপত্তি: 9 একক]
13.  $(-14, 8, 6)$  ও  $(-11, 4, 1)$  বিন্দুগামী সরলরেখা এবং  $(3, 5, 5)$  ও  $(6, 11, 8)$  বিন্দুগামী সরলরেখা দুটির সর্বনিম্ন দূরত্ব হবে  $\frac{58}{5\sqrt{2}}$  একক এটি দেখান।
14.  $\bar{r} = \bar{\alpha} + t\bar{\beta}$  এবং  $\bar{r} = \bar{\gamma} + s\bar{\delta}$  সরলরেখা দুটির সর্বনিম্ন দূরত্ব  $m$ -এর সাহায্যে নির্ণয় করুন যেখানে  $\bar{\alpha} = (1, 2, 3)$ ,  $\bar{\beta} = (2, 3, 4)$ ,  $\bar{\gamma} = (m, 3, 4)$  এবং  $\bar{\delta} = (3, 4, 5)$ .  $m$ -এর কোন মানের জন্য সরলরেখা দুটি সামতলিক হবে?
- [উৎপত্তি:  $\frac{k-2}{\sqrt{6}}, k = 2$ ]
15. A, B, C, D চারটি বিন্দুর অবস্থান ভেষ্টের যথাক্রমে  $(-1, 2, -3)$ ,  $(-16, 6, 4)$ ,  $(1, -1, 3)$  এবং  $(4, 9, 7)$ । AB এবং CD সরলরেখা দুটির সর্বনিম্ন দূরত্ব নির্ণয় করুন। [উৎপত্তি: 7 একক]
16. দুটি সরলরেখার ভেষ্টের সমীকরণ যথাক্রমে  $\bar{r} = \bar{r}_1 + t\bar{\alpha}$ ,  $\bar{r} = \bar{r}_2 + t\bar{\beta}$ , যেখানে  $t$  একটি ক্ষেপণ এবং  $\bar{r}_1, \bar{\alpha}, \bar{r}_2, \bar{\beta}$  ভেষ্টেরগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(1, 4, 5)$ ,  $(2, 1, 2)$ ,  $(2, 8, 11)$  এবং  $(-1, 3, 4)$ । দেখান যে সরলরেখা দুটি সামতলিক।
17. একটি সমতল  $(2, 3, -1)$  বিন্দুগামী এবং  $(3\bar{i} - 4\bar{j} + 7\bar{k})$  এই ভেষ্টেরের ওপর অসমতল। সমতলটির ভেষ্টের সমীকরণ নির্ণয় করুন। [উৎপত্তি:  $\bar{r}.(3\bar{i} - 4\bar{j} + 7\bar{k}) + 13 = 0$ ]

18. A এবং B দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $(3, 1, 2)$  এবং  $(1, -2, -4)$ । দেখান যে B বিন্দুগামী সমতল  $\overline{AB}$  ভেক্টরের ওপর লম্ব তার কার্তেসীয় সমীকরণ হবে  
 $2x + 3y + 6z + 28 = 0$ ।
19.  $\vec{r} \cdot (2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}) = 9$  সমতলের সঙ্গে স্থানাঙ্ক অক্ষ তিনটির ছেদিতাংশ নির্ণয় করুন।  
[উৎ:  $\frac{9}{2}, 3, -9$ ]
20. দেখান যে  $\vec{r} \cdot (2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}) = 7$  এবং  $\vec{r} \cdot (3\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}) = 5$  এই সমতল দুটির মধ্যবর্তী কোণ হবে  $\cos^{-1} \frac{5}{\sqrt{14} \sqrt{38}}$   
[সমতল দুটির লম্ব ভেক্টর ক্ষেত্রে গুণ নিতে হবে]
21. দেখান যে চারটি বিন্দু  $(0, -1, -1), (4, 5, 1), (3, 9, 4)$  এবং  $(-4, 4, 4)$  সামতলিক।
22. দেখান যে  $(2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k})$  বিন্দু হতে  $\vec{r} \cdot (4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}) = 18$  এই সমতলের ওপর লম্ব দূরত্ব হবে  $\frac{20}{\sqrt{26}}$  একক।
23. দেখান যে  $(\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k})$  এবং  $3(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$  বিন্দু দুটি  $\vec{r} \cdot (5\vec{i} + 2\vec{j} - 7\vec{k}) + 9 = 0$  এই সমতল হতে সমদূরবর্তী এবং এগুলি সমতলের বিপরীত দিকে অবস্থিত।
24. দেখান যে  $\vec{r} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0, \vec{r} \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = 0$  এবং  $\vec{r} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0$  এই সমতল তিনটি পরস্পরের উপর লম্ব।
25.  $\vec{r} \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 1$  এবং  $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}) = 2$  এই সমতল দুটি যে সরলরেখা বরাবর ছেদ করে সেই সরলরেখার ওপর লম্ব সমতল  $(\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$  বিন্দুগামী হলে দেখান যে এই সমতলের সমীকরণ হবে  $\vec{r} \cdot (-2\hat{i} + 7\hat{j} + 13\hat{k}) + 1 = 0$
26.  $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) = 0$  এবং  $\vec{r} \cdot (\hat{j} + 2\hat{k}) = 0$  সমতল দুটি যে সরলরেখা বরাবর ছেদ করে সেই সরলরেখাগামী এবং  $(2, 1, -1)$  বিন্দুগামী সমতলের ভেক্টর সমীকরণ হবে  
 $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 9\hat{j} + 11\hat{k}) = 0$  দেখান।  
[সূত্র সমতলটির সমীকরণ হবে  $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) + \lambda \vec{r} \cdot (\hat{j} + 2\hat{k}) = 0$ ]
27.  $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$  এই সরলরেখাগামী সমতল  $\vec{r} \cdot \vec{d} = q$  এই সমতলের উপর লম্ব। দেখান যে এই সমতলের সমীকরণ হবে  $[\vec{r} - \vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{d}] = 0$   
[সূত্রঃ 4.4.1 অনুচ্ছেদের (খ) হতে (4) নং সমীকরণ দেখুন। সমতলটি  $\vec{b}$  এবং  $\vec{d}$  ভেক্টরের সমান্তরাল এবং নির্দিষ্ট বিন্দু A (যার অবস্থান ভেক্টর  $\vec{a}$ ) দিয়ে যায়।]

28. একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A-এর অবস্থান ভেষ্টের হলো  $\bar{a}$ । একটি সঞ্চরণশীল বিন্দু P-এর অবস্থান ভেষ্টের হলো  $\bar{r}$ ।
- যদি  $(\bar{r} - \bar{a}) \cdot \bar{a} = 0$  হয় দেখান যে P, A বিন্দুগামী এবং OA-এর ওপর লম্ব সমতলে থাকবে যেখানে O হলো মূলবিন্দু।
  - যদি  $|\bar{r} - \bar{a}| = 3$  হয় তবে দেখান P বিন্দু একটি গোলকের ওপর থাকবে যার কেন্দ্র হল A এবং ব্যাসার্ধ 3 একক।
29. PQRS একটি চতুর্স্তলক যার শীর্ষবিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(1, 0, -2)$ ,  $(-1, 1, 0)$ ,  $(2, -1, 1)$  এবং  $(0, 3, 1)$ . P হতে QRS সমতলের ওপর লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করুন।
- [উৎপাদক:  $\frac{11}{\sqrt{12}}$  একক]
30. দেখান যে  $(2, 1, 2)$  ও  $(3, -1, 4)$  বিন্দুগামী সরলরেখাটির  $(6, -4, 4)$  থেকে লম্ব দূরত্ব 3 একক।
31. O হলো একটি সমকোণী অক্ষগোষ্ঠীর মূলবিন্দু। O-এর সাপেক্ষে A, B, C বিন্দুর অবস্থান ভেষ্টের যথাক্রমে  $(3, -2, -1)$ ,  $(1, 3, 4)$  এবং  $(2, 1, -2)$  দেখান A বিন্দু হতে OBC সমতলের ওপর লম্ব দূরত্ব 3 একক হবে।
32. O বিন্দুর সাপেক্ষে P, Q, R তিনটি বিন্দুর অবস্থান ভেষ্টের যথাক্রমে  $\bar{a}$ ,  $\bar{b}$  এবং  $\bar{c}$ । দেখান যে QR সরলরেখা থেকে P-এর লম্ব দূরত্ব হবে
- $$\frac{|\bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a}|}{|\bar{b} - \bar{a}|}$$
33. O বিন্দু হতে অক্ষিত সরলরেখা একটি নির্দিষ্ট গোলককে P বিন্দুতে ছেদ করে। OP সরলরেখার ওপর Q একটি বিন্দু দেওয়া হলো। OP : OQ হলো একটি নির্দিষ্ট অনুপাত। দেখান যে Q বিন্দুর সঞ্চার পথ একটি গোলক হবে।
34.  $\bar{r} \cdot (m\hat{j} + n\hat{k}) = 0$ ,  $\bar{r} \cdot (n\hat{k} + l\hat{i}) = 0$ ,  $\bar{r} \cdot (l\hat{i} + m\hat{j}) = 0$  এবং  $\bar{r} \cdot (l\hat{i} + m\hat{j} + n\hat{k}) = p$  এই চারটি সমতল দ্বারা আবদ্ধ চতুর্স্তলকের ঘনফল দেখান  $\frac{2p^3}{3lmn}$  হবে।
35.  $x^2 + y^2 + z^2 = d^2$  এই গোলকের একটি স্পর্শকতল সমকোণী অক্ষগোষ্ঠী হতে a, b, c ছেদিতাংশ উৎপন্ন করলে দেখান যে  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{d^2}$
- [সূত্র : স্পর্শকতলের সমীকরণ  $\bar{r} \cdot \bar{n} = p$  হলে  $\frac{p}{|n|} = d$ ,  $\frac{p}{\bar{n} \cdot \hat{i}} = a$ ;  $\frac{p}{\bar{n} \cdot \hat{j}} = b$ ,  $\frac{p}{\bar{n} \cdot \hat{k}} = c$ ]

### গঠন

- 5.1 — প্রস্তাৱনা
- 5.2 — উদ্দেশ্য
- 5.3 — স্থিতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রয়োগ
- 5.4 — গতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রয়োগ
- 5.5 — বিবিধ উদাহরণ
- 5.6 — গতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় উদাহরণ সমূহ
- 5.7 — সারাংশ
- 5.8 — সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

## 5.1 প্রস্তাবনা :

আমরা দেখেছি যে আগের এককগুলিতে (Unit – 01, 02, 03) ভেট্টরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলির জ্যামিতিতে প্রয়োগ (একক - 04 দেখুন) বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়েছে। এই এককটিতে বলবিদ্যায় ভেট্টরের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হলো।

আমরা জানি বল, সরণ, গতিবেগ, আমক ইত্যাদি ভেট্টর রাশি। সূতরাং এই রাশিগুলির জন্যে ভেট্টরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি প্রযোজ্য হবে।

## 5.2 উদ্দেশ্য :

5.3 অনুচ্ছেদে স্থিতিবিদ্যায় ভেট্টরের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। । nং এককে মুক্ত ভেট্টরের ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে আবদ্ধ ভেট্টর সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বল যে আবদ্ধ ভেট্টর তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই অনুচ্ছেদে স্থিতি বিদ্যায় বিভিন্ন উপপাদ্যের ভেট্টররূপ প্রদত্ত হলো। 5.4 অনুচ্ছেদে গতিবিদ্যায় ভেট্টরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। 5.5 অনুচ্ছেদে স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যায় ভেট্টর প্রয়োগের বিস্তারিত উদাহরণ দেওয়া হলো।


## 5.3 স্থিতিবিদ্যায় ভেট্টরের প্রয়োগ :

স্থিতিবিদ্যায় ভেট্টরের প্রয়োগ কিভাবে হয় তা জানতে হলে নিম্নে বর্ণিত বিশেষ তথ্যগুলি আগে জানা দরকার।

### 5.3.1 বল এবং আবদ্ধ ভেট্টরের ধারণা (Force and Bound Vector) :-

আমরা জানি বল একটি মান ও দিক বিশিষ্ট রাশি হওয়ায় একটি ভেট্টর দ্বারা বলকে প্রকাশ করা সম্ভব। ভেট্টরের সংজ্ঞা অনুযায়ী পূর্বে বর্ণিত । nং এককে (EMT-04, Block – I, unit – 01) মুক্ত ভেট্টরের ধারণা দেওয়া আছে। কিন্তু বলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে।

মনে করি BA বরাবর (B হতে A দিক বরাবর) F মান বিশিষ্ট একটি বল বন্ধুর A বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এখন বন্ধুর অপর এক বিন্দু C-তে BA-র সমান্তরাল DC বরাবর F-এর সমমান ও সমদিক বিশিষ্ট বলের ক্রিয়া অবশ্যই A বিন্দুতে ক্রিয়াশীল F-বলের সমতুল্য নয় কারণ দুটি ক্ষেত্রে বন্ধুর সরণ একই হবে না। সূতরাং সমান্তরাল রেখা বরাবর বন্ধুর বিভিন্ন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল সমমান ও সমদিক বিশিষ্ট বলগুলি সমতুল্য নয়। অতএব মুক্ত ভেট্টরের (free vector) ধারণা বল ভেট্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।



চিত্র : ।


বলরূপ ভেট্টরকে অবশ্যই একটি বিশেষ রেখা বরাবর হতে হবে।

সেইহেতু বল ভেট্টরকে আবদ্ধ ভেট্টর বলা হয় (একটি বিশেষ রেখার ওপর আবদ্ধ)।

এখানে মনে রাখতে হবে যে রেখা বরাবর বলরূপ ভেস্টেরটি আবদ্ধ সেই রেখা বরাবর মান ও দিক ঠিক রেখে কোন অবস্থানে বলটিকে প্রকাশ করা যেতে পারে (চিত্র : ২)। একে বলের সরণ যোগ্যতার নিয়ম (Principle of transmissibility) বলে। ২য় ছবিতে  $xx'$  রেখা বরাবর  $\overline{AB}$  অথবা  $\overline{A'B'}$  ভেস্টের দ্বারা একটি বলকে প্রকাশ করা সম্ভব যদি  $\overline{AB}$  এবং  $\overline{A'B'}$  সমান ও সমদিক বিশিষ্ট হয়।

### 5.3.2. বল-ভেস্টের (Force vector) :

একটি প্রদত্ত বল আছে। অতএব বলের মান, দিক ও যে রেখা বারবার বলটি ক্রিয়াশীল তা প্রদত্ত আছে। এখন এই প্রদত্ত বলের সমমান ও সমদিক বিশিষ্ট যে কোন ভেস্টেরকে বল-ভেস্টের বল হবে।




বল-ভেস্টের বলের সমচিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অতএব একটি বলকে প্রকাশ করতে হলে উক্ত বলের বল ভেস্টের এবং বলটি যে বিন্দুতে ক্রিয়াশীল তা জানতে হবে।

### 5.3.3. সমবিন্দুগামী বলের লক্ষ বল : (Resultant of concurrent forces) :

মনে করি  $\overline{F_1}$ ,  $\overline{F_2}$ ,  $\overline{F_3}$ ,  $\overline{F_4}$  .....  
একাধিক বল একই বিন্দুতে O-তে ক্রিয়াশীল।

আমরা জানি একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি বল সামন্তরিক সূত্র মেনে চলে। অতএব  $\overline{F_1}$  এবং  $\overline{F_2}$  বলের লক্ষ বল হবে  $\overline{F_1}$  এবং  $\overline{F_2}$  বল-ভেস্টেরের ভেস্টের যোগফল এবং একই বিন্দুর O-তে ক্রিয়াশীল। অনুরাপে ( $\overline{F_1} + \overline{F_2}$ ) এবং  $\overline{F_3}$  বল ভেস্টেরের লক্ষ বল বলের সামন্তরিক সূত্র অনুযায়ী



চিত্র : ৩

$(\overline{F_1} + \overline{F_2}) + \overline{F_3} = \overline{F_1} + \overline{F_2} + \overline{F_3}$  এবং এটিও O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এইভাবে একাধিকবার বলের সামন্তরিক সূত্র ব্যবহার করে বলা যায় O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল  $\overline{F_1}$ ,  $\overline{F_2}$ ,  $\overline{F_3}$ ,  $\overline{F_4}$  ..... বলগুলির লক্ষ বল হবে O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল একটি বল যা ( $\overline{F_1} + \overline{F_2} + \dots$ )-এর সমান। অতএব  $\overline{R}$  লক্ষ বল হলে আমরা পাই  $\overline{R} = \overline{F_1} + \overline{F_2} + \overline{F_3} + \dots = \sum \overline{F_i}$  যদি  $\overline{R} = \overline{O}$  (শূন্য ভেস্টের) হলে বলগুলি সাম্যাবস্থায় (Equilibrium of forces) আছে বুঝতে হবে।

লক্ষ বল-ভেস্টের  $\overline{R}$  বল-ভেস্টেরগুলির যোগফল সূত্রাং  $\overline{R}$ -কে ভেস্টেরের বহুভুজ সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাবে।  $A_1 A_2 A_3 \dots A_n A_{n+1}$ , বহুভুজের  $\overline{A_1 A_2} = \overline{F_1}$ ,  $\overline{A_2 A_3} = \overline{F_2}$ ,  $\overline{A_3 A_4} = \overline{F_3}$ , .....  $\overline{A_n A_{n+1}} = \overline{F_n}$  হলে লক্ষ-বল-ভেস্টেরকে  $\overline{A_n A_{n+1}}$  দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

কারণ  $\overline{F_1} + \overline{F_2} + \overline{F_3} + \dots + \overline{F_n}$


$$= \overline{A_1 A_2} + \overline{A_2 A_3} + \overline{A_3 A_4} + \dots + \overline{A_n A_{n+1}}$$

$$= \overline{A_n A_{n+1}} \quad (\text{চিত্র} - 4)$$

$$\text{অতএব } \overline{R} = \overline{A_n A_{n+1}}$$

$A_1 A_2 A_3 \dots A_{n+1}$  বহুজকে ভেট্টর বহুজ  
(Vector polygon) বলা হয়।

বলগুলি সাম্যাবস্থায় থাকলে  $\overline{R} = \overline{A_1 A_{n+1}} = O$   
হবে। এক্ষেত্রে ভেট্টর বহুজটি একটি সম্পূর্ণ বহুজ  
হবে (Complete Polygon)।



চিত্র : 4

বিঃ দ্রঃ (1) ভেট্টর বহুজের সাহায্যে লক্ষিতের বল-ভেট্টর  $\overline{R} = \overline{A_1 A_{n+1}}$  নির্ণয় করা যায়। লক্ষিতের বলটি যে বিন্দুতে বলগুলি ক্রিয়াশীল, সেই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল হবে।

(2) ভেট্টর বহুজটি একটি সমতলে নাও থাকতে পারে। বলগুলি সমতলীয় হলে ভেট্টর বহুজটি একটি সমতলে থাকবে।

#### 5.3.4. ল্যামির উপপাদ্য : (Lami's theorem)

কোন বস্তুর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল তিনটি বল সাম্যাবস্থায় থাকলে বলগুলি সমতলীয় হবে এবং প্রতিটি বলের মান অপর দুইটি বলের অঙ্গৰ্হণ কোণের সাইনের (sine) সঙ্গে সমানুপাতিক হবে।


প্রমাণ : মনে করি তিনটি বল  $\overline{F_1}$ ,  $\overline{F_2}$ ,  $\overline{F_3}$  কোন- ও বস্তুর একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল এবং সাম্যাবস্থায় আছে। সূতরাং এগুলির লক্ষিত শূন্য ভেট্টর হবে।

$$\text{অর্থাৎ } \overline{R} = \overline{F_1} + \overline{F_2} + \overline{F_3} = O$$

$\therefore \overline{F_3} = -\overline{F_1} - \overline{F_2}$  সূতরাং, বল তিনটি সামতলিক হবে। সূতরাং বল-ভেট্টরগুলি দ্বারা গঠিত ভেট্টর বহুজটি একটি সম্পূর্ণ ত্রিভুজ হবে।

মনে করি  $A_1 A_2 A_3$  ত্রিভুজে  $\overline{A_1 A_2} = \overline{F_1}$ ,

$$\overline{A_2 A_3} = \overline{F_2}, \quad \overline{A_3 A_1} = \overline{F_3}$$



চিত্র : 5

$$\therefore \frac{\overline{A_1 A_2}}{\sin \angle A_1 A_3 A_2} = \frac{\overline{A_2 A_3}}{\sin \angle A_2 A_1 A_3} = \frac{\overline{A_3 A_1}}{\sin \angle A_1 A_2 A_3}$$

$$\text{सिर्फ } \frac{\mathbf{A}_1\mathbf{A}_2}{\sin(\pi - \angle A_3)} = \frac{\mathbf{A}_2\mathbf{A}_3}{\sin(\pi - \angle A_1)} = \frac{\mathbf{A}_3\mathbf{A}_1}{\sin(\pi - \angle A_2)}$$

$$\text{से } \frac{|\overline{F}_1|}{\sin(\overline{F}_2 \wedge \overline{F}_3)} = \frac{|\overline{F}_2|}{\sin(\overline{F}_3 \wedge \overline{F}_1)} = \frac{|\overline{F}_3|}{\sin(\overline{F}_1 \wedge \overline{F}_2)}$$

সুতরাং ল্যামির উপপাদ্য প্রমাণিত হলো।

**বিকল্প প্রমাণ:** মনে করি  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  হলো যথাক্রমে  $\overline{F_1}, \overline{F_2}, \overline{F_3}$  বল ভেট্টারের দিকে একক ভেট্টা।

$$\therefore \quad \overline{\mathbf{F}_1} = |\overline{\mathbf{F}_1}| \overline{\mathbf{a}}, \quad \overline{\mathbf{F}_2} = |\overline{\mathbf{F}_2}| \overline{\mathbf{b}}, \quad \overline{\mathbf{F}_3} = |\overline{\mathbf{F}_3}| \overline{\mathbf{c}}$$

যেহেতু বলগুলির লক্ষিত শূন্য-ভেট্টের সূতরাং এগুলি সাম্যবস্থায় থাকবে।

$$\therefore \overline{F_1} + \overline{F_2} + \overline{F_3} = 0$$

$$\bar{a} - |\bar{F}_1| \bar{a} + |\bar{F}_2| \bar{b} + |\bar{F}_3| \bar{c} = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$$

ମୁଁ ଦାରା ଭେଟ୍‌ର ଶୁଣ କରଲେ

$$|\overline{F_1}|(\bar{a} \times \bar{a}) + |\overline{F_2}|(\bar{a} \times \bar{b}) + |\overline{F_3}|(\bar{a} \times \bar{c}) = 0$$

$$\text{Thus } |\overline{F_2}|(\bar{a} \times \bar{b}) = |\overline{F_3}|(\bar{c} \times \bar{a})$$

$$\therefore \frac{|\overline{\mathbf{F}_2}|}{|\overline{\mathbf{c}} \times \overline{\mathbf{a}}|} = \frac{|\overline{\mathbf{F}_3}|}{|\overline{\mathbf{a}} \times \overline{\mathbf{b}}|}$$

$$\text{অনুরূপে (1) নং সমীকরণে } \bar{b} \text{ দ্বারা ভেষ্টির শুণ করলে পাওয়া যাবে \frac{|\bar{F}_1|}{\bar{b} \times \bar{c}} = \frac{|\bar{F}_3|}{\bar{a} \times \bar{b}}$$

$$\text{अर्थात् } \frac{|\bar{F}_1|}{|\bar{b} \times \bar{c}|} = \frac{|\bar{F}_2|}{|\bar{c} \times \bar{a}|} = \frac{|\bar{F}_3|}{|\bar{a} \times \bar{b}|}$$

$$\text{वा } \frac{\left| \overline{F}_1 \right|}{\sin(\overline{F}_2 \wedge \overline{F}_3)} = \frac{\left| \overline{F}_2 \right|}{\sin(\overline{F}_3 \wedge \overline{F}_1)} = \frac{\left| \overline{F}_3 \right|}{\sin(\overline{F}_1 \wedge \overline{F}_2)}$$


## 5.4 গতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রযোগ :

### 5.4.1 : আপেক্ষিক গতিবেগ (Relative Velocity)

(ক) আপেক্ষিক অবস্থান :

দুইটি গতিশীল বিন্দুর কোনও এক সময়ে তাদের অবস্থান যথাক্রমে A ও B বিন্দু। হিসেবে বিন্দু (মুখবিন্দু) O-এর সাপেক্ষে A ও B বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে  $\overrightarrow{OA}$  এবং  $\overrightarrow{OB}$  ভেক্টর।

এখন  $\overrightarrow{AB}$  ভেক্টরকে A বিন্দুর সাপেক্ষে B-এর অবস্থান ভেক্টর বলা হয়। সূতরাং  $\overrightarrow{AB}$  কে A-এর সাপেক্ষে B-এর আপেক্ষিক অবস্থান ভেক্টর বলা হবে।



চিত্র : 6

(খ) আপেক্ষিক গতিবেগ :

A-এর সাপেক্ষে B-এর আপেক্ষিক গতিবেগ হবে B-এর আপেক্ষিক ভেক্টরের সময়-হার (time-rate)।

(গ) উপপাদ্য : A-এর সাপেক্ষে B-এর গতিবেগ ভেক্টর হবে B-এর গতিবেগ ও A-এর গতিবেগের ভেক্টর বিয়োগফল যেখানে একটি হিসেবে বিন্দুর সাপেক্ষে A ও B-এর গতিবেগ জানা আছে।

প্রমাণ : সংজ্ঞা অনুসারে

A-এর সাপেক্ষে B-এর গতিবেগ

$$= \overrightarrow{AB} - \text{এর সময় হার} \quad [6\text{নং ছবি}]$$

$$= (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) - \text{এর সময় হার} \quad [O \text{ হিসেবে বিন্দু}]$$

$$= \overrightarrow{OB} - \text{এর সময় হার} - \overrightarrow{OA} - \text{এর সময় হার}$$


= B-এর গতিবেগ ভেক্টর - এর গতিবেগ ভেক্টর :

$$= \overline{v} - \overline{u}$$

### 5.4.2 : বলদ্বারা সাধিত কার্যের পরিমাণ নির্ণয় :

আমরা জানি যদি একটি বল কোন বস্তুকণার উপর প্রযুক্ত হয় তবে ঐ বল দ্বারা সাধিত কার্যের পরিমাণ হবে বলের মান ও বলের অভিযুক্ত প্রয়োগ বিন্দুর সরণের গুণফল।

মনে করি  $\vec{F}$  বল ক্রিয়া করার ফলে বস্তুর সরণ ভেক্টর হলো  $\vec{d}$ ।  $\vec{F}$  এবং  $\vec{d}$  ভেক্টরের অঙ্গবর্তী কোণ  $\theta$  হলো



চিত্র . 7

$$\begin{aligned} \text{কার্যের পরিমাণ} &= |\bar{F}| \cdot |\bar{d}| \cos\theta \\ &= \bar{F} \cdot \bar{d} \text{। সুতরাং এটি একটি ক্ষেত্রার রাশি।} \end{aligned}$$

অনুসিদ্ধান্ত - (1) : যদি  $\bar{r}$  এবং  $\bar{F}$  পরস্পরের ওপর লম্ব হয় তবে  $\bar{F} \cdot \bar{r} = 0$  হবে। এক্ষেত্রে কোনও কার্য সাধিত হবে না।

$$\begin{aligned} \text{অনুসিদ্ধান্ত - (2)} : \text{ একটি বিন্দুতে একাধিক বল } \bar{F}_1, \bar{F}_2, \bar{F}_3, \dots, \bar{F}_n \text{ ক্রিয়াশীল হয় এবং} \\ \text{বিন্দুটির সরণ ভেষ্টের } \bar{d} \text{ হলে মোট কার্যের পরিমাপ হবে বলগুলির লক্ষ-বল ভেষ্টের এবং বিন্দুটির } \\ \text{সরণ } \bar{d} \text{ ভেষ্টেরের ক্ষেত্রার গুণফল অর্থাৎ কার্যের পরিমাণ} &= \\ \bar{F}_1 \cdot \bar{d} + \bar{F}_2 \cdot \bar{d} + \bar{F}_3 \cdot \bar{d} + \bar{F}_4 \cdot \bar{d} + \dots + \bar{F}_n \cdot \bar{d} &= \\ &= \bar{F} \cdot \bar{d} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{যেখানে } \bar{F} &= (\bar{F}_1 + \bar{F}_2 + \bar{F}_3 + \dots + \bar{F}_n) \\ &= \text{ লক্ষ বল।} \end{aligned}$$

#### 5.4.3 : ভ্রামক :

(ক) একটি স্থির বিন্দুর চারিদিকে একটি বলের ভ্রামক:

মনে করি O একটি স্থির বিন্দু।  $\bar{F}$  বল P বিন্দুতে প্রযুক্ত হলো। O-এর সাপেক্ষে P-এর অবস্থান ভেষ্টের হইল  $\bar{r}$ । সুতরাং P বিন্দু  $\bar{F}$ -এর ক্রিয়ারেখায় অবস্থিত। O-বিন্দুর চারিদিকে  $\bar{F}$  বলের ভ্রামক  $\bar{m}$  একটি ভেষ্টের রাশি এবং  $\bar{m} = \bar{r} \times \bar{F}$ ।

O বিন্দু এবং  $\bar{F}$ -এর ক্রিয়ারেখা যে সমতলে অবস্থিত  $\bar{m}$  ভেষ্টের সেই তলের উপর লম্ব হবে



$\bar{m}$  এবং  $\bar{F}$  পরস্পর লম্ব।

চিত্র : 8

$$\begin{aligned} \therefore \bar{m} \cdot \bar{F} &= 0 \text{ (শূন্য ভেষ্টের)} \\ \text{এখন } |\bar{m}| &= |\bar{r} \times \bar{F}| \\ &= |\bar{r}| |\bar{F}| \sin \angle OPN \\ &= |\bar{r}| |\bar{F}| \sin \theta \\ &= |\bar{F}| OP \sin \theta \\ &= |\bar{F}| ON \end{aligned}$$

যেখানে  $ON = O$  বিন্দু হতে  $\bar{F}$  বলের ক্রিয়ারেখার ওপর লম্ব।

$\therefore |\bar{m}|$  হলো আমকের মান।

অনুসিদ্ধান্ত - (1) : যদি বহুসংখ্যক বল  $\bar{F}_1, \bar{F}_2, \dots, \bar{F}_n$  একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল হয় তবে একটি প্রদত্ত বিন্দুর চারিদিকে বল সমূহের আমকের যোগফল তাদের লক্ষ বলের আমকের সমান হবে।

$$\therefore \bar{m} = \bar{r} \times \bar{F}$$

$$= \bar{r} \times (\bar{F}_1, \bar{F}_2, \dots, \bar{F}_n) \quad [\bar{F} \text{ হলো তাদের লক্ষ বল}]$$

$$= \bar{r} \times \bar{F}_1 + \bar{r} \times \bar{F}_2 + \bar{r} \times \bar{F}_3 + \dots + \bar{r} \times \bar{F}_n$$

[ এটিভারিগনন-এর উপপাদ্য ] (Varignon's theorem)

অনুসিদ্ধান্ত - 2 :  $\bar{F}$  বলের আমক P বিন্দুর অবস্থানের ওপরে নির্ভর করে না।

ধরি A এবং B বিন্দুটি  $\bar{F}$  বলের ক্রিয়ারেখার উপরে নেওয়া হল।

$$\begin{aligned} \therefore \bar{OB} \times \bar{F} &= (\bar{OA} + \bar{AB}) \times \bar{F} \\ &= \bar{OA} \times \bar{F} + \bar{AB} \times \bar{F} \end{aligned}$$

কিন্তু  $\bar{AB} \times \bar{F} = O$  যেহেতু  $\bar{AB}$  এবং  $\bar{F}$  একই সরলরেখায় অবস্থিত।


$$\therefore \bar{OB} \times \bar{F} = \bar{OA} \times \bar{F}$$

সুতরাং O বিন্দুর চারিদিকে  $\bar{F}$  বলের আমক  $\bar{F}$  এর ক্রিয়ারেখার ওপর যে কোণও বিন্দুর জন্য একই হবে।

## 5.5 স্থিতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন উদাহরণ সমূহ

উদাহরণ - 1 :  $\bar{F}_1$  এবং  $\bar{F}_2$  বলের লক্ষ  $\bar{R}$ ।  $\bar{F}_1$  অনুভূমিক ও  $\bar{R}$  উলম্ব দিক বরাবর এবং  $\bar{F}_2$  বলটি  $\bar{R}$ -এর যেদিকে  $\bar{F}_1$  আছে তার বিপরীত দিকে  $\bar{R}$ -এর সঙ্গে  $60^\circ$  কোণে নত।  $\bar{R}$ -এর মানের সাপেক্ষে  $\bar{F}_1$  এবং  $\bar{F}_2$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান — মনে করি  $\hat{i}$  এবং  $\hat{j}$  যথাক্রমে অনুভূমিক ও উলম্ব দিক বরাবর একক ভেক্টর। সুতরাং  $\bar{F}_1 = |\bar{F}_1| \hat{i}, \bar{R} = |\bar{F}| \hat{j}$



চিত্র : 9

$$\begin{aligned}\overline{F_2} &= |\overline{F_2}| \cos(90^\circ + 60^\circ) + |\overline{F_2}| \sin(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -|\overline{F_2}| \frac{\sqrt{3}}{2} i + |\overline{F_2}| \frac{i}{2}\end{aligned}$$

যেহেতু  $\overline{R}$ ,  $\overline{F_1}$  এবং  $\overline{F_2}$  এর লক্ষ বল সূতরাং  $\overline{R} = \overline{F_1} + \overline{F_2}$

$$\therefore |\overline{R}| \vec{J} = |\overline{F_1}| \vec{i} - |\overline{F_2}| \frac{\sqrt{3}}{2} i + |\overline{F_2}| \frac{i}{2}$$

$$\therefore |\overline{R}| = \frac{1}{2} |\overline{F_2}| \quad \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\text{এবং } |\overline{F_1}| - |\overline{F_2}| \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \quad \therefore |\overline{F_1}| = \frac{\sqrt{3}}{2} |\overline{F_2}|$$

$$\therefore |\overline{F_1}| = |\overline{F_2}| \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} 2 |\overline{R}| = \sqrt{3} |\overline{R}|$$

$$|\overline{F_2}| = 2 |\overline{R}|.$$

**উদাহরণ - 2**  $\overline{P}, \overline{Q}, \overline{R}$  বলগুলি  $O$  বিন্দুতে বিভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল এবং সাম্যাবস্থায় আছে। একটি সরলরেখা বল তিনটির ক্রিয়াশীল রেখা গুলিকে যথাক্রমে  $A, B, C$  বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করুন যে

$$\frac{|\overline{P}|}{OA} + \frac{|\overline{Q}|}{OB} + \frac{|\overline{R}|}{OC} = 0$$

সমাধান — মনে করি  $\overline{P} = x \overline{OA}, \overline{Q} = y \overline{OB}, \overline{R} = z \overline{OC}$  ..... (i) যেখানে  $x, y, z$  তিনটি ক্ষেত্রার।

যেহেতু বল তিনটি একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল এবং সাম্যাবস্থায় আছে

$$\therefore \overline{P} + \overline{Q} + \overline{R} = \overline{0}$$

$$\text{বা } x \overline{OA} + y \overline{OB} + z \overline{OC} = \overline{0} \quad \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

$A, B, C$  তিনটি বিন্দু সমরেখীয় হওয়ায় (ii)-এর ক্ষেত্রার তিনটির যোগফল শূন্য হবে অর্থাৎ

চিত্র : 10

$$x + y + z = 0$$

$$\therefore \frac{|\overline{P}|}{OA} + \frac{|\overline{Q}|}{OB} + \frac{|\overline{R}|}{OC} = 0 \quad [ \text{(i) নং কে ব্যবহার করে } ]$$

উদাহরণ - 3 দেখান যে  $\bar{P}_1$  ও  $\bar{P}_2$  দুটি বলের লক্ষ বলের মান হবে


$(\bar{P}_1^2 + \bar{P}_2^2 + 2\bar{P}_1 \cdot \bar{P}_2 \cdot \cos\theta)^{1/2}$ । যেখানে বল দুটির ক্রিয়া রেখা দুটির মধ্যবর্তী কোণ  $\theta$  মনে করি  $\vec{i}$  এবং  $\vec{j}$  দুটি পরস্পরের লম্ব একক ভেক্টর। যেখানে  $\bar{P}_1$ -এর ক্রিয়ারেখার দিকে  $\vec{i}$  ভেক্টর আছে।

$$\therefore \bar{P}_1 = |\bar{P}_1| = p_1 \vec{i} \quad [|\bar{P}_1| = p_1 \vec{i}]$$

$$\bar{P}_2 = |\bar{P}_2| \cos\theta \vec{i} + |\bar{P}_2| \sin\theta \vec{j}$$

$$= p_2 \cos\theta \vec{i} + p_2 \sin\theta \vec{j}$$

$$[|\bar{P}_2| = p_2] \quad \text{চিত্র: 11}$$



$$\text{যদি } \bar{R} \text{ ভেক্টর তাদের লক্ষ বল ভেক্টর হয় তবে \bar{R} = \bar{P}_1 + \bar{P}_2$$

$$= p_1 \vec{i} + p_2 \cos\theta \vec{j} + p_2 \sin\theta \vec{j}$$

$$= (p_1 + p_2 \cos\theta) \vec{i} + p_2 \sin\theta \vec{j}$$

$$\therefore |\bar{R}| = \sqrt{(p_1 + p_2 \cos\theta)^2 + P_2^2 \sin^2\theta}$$

$$= \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2 \cos\theta}$$

$$= \left( |\bar{P}_1|^2 + |\bar{P}_2|^2 + 2|\bar{P}_1||\bar{P}_2| \cos\theta \right)^{1/2}$$

## 5.6 গতিবিদ্যায় ভেক্টরের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় উদাহরণ সমূহ :

উদাহরণ 1. A-এর প্রকৃত গতিবেগ  $x\vec{i} + y\vec{j}$  এবং B-এর প্রকৃত গতিবেগ  $u\vec{i} + v\vec{j}$  হলে A-এর সাপেক্ষে B-এর গতিবেগ নির্ণয় করুন।

সমাধান :


$$\bar{AB} = A - \text{এর সাপেক্ষে B-এর গতিবেগ}$$

$$\bar{OA} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$\bar{OB} = u\hat{i} + v\hat{j}$$

$$\therefore \bar{AB} = (u\vec{i} + v\vec{j})$$

$$= (u+x)\hat{i} - (v-y)\hat{j}$$



চিত্র : 12

**উদাহরণ 2.** নদীতে জলের গতিবেগের সাপেক্ষে নৌকার গতিবেগ  $3\hat{i} + 5\hat{j}$  এবং জলের গতিবেগ পৃথিবীর গতিবেগের সাপেক্ষে  $\hat{i} - \hat{j}$ । পৃথিবীর গতিবেগের সাপেক্ষে নৌকার গতিবেগ নির্ণয় করুন।  
 এবং  $\hat{j}$  যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তর দিকে ঘন্টায় 1 কিলোমিটার গতিবেগ ভেট্টের।

সমাধান : মনে করি পৃথিবীর গতিবেগ =  $\bar{v}$

$$\text{জলের গতিবেগ} = \bar{v}$$

$$\text{নৌকার গতিবেগ} = \bar{w}$$

$$\text{অতএব জলের গতিবেগ ভেট্টের পৃথিবীর গতিবেগের সাপেক্ষে} = \bar{v} - \bar{w} = \hat{i} - \hat{j} \quad \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার নৌকার গতিবেগ ভেট্টের জলের গতিবেগের সাপেক্ষে} = \bar{w} - \bar{v} = 3\hat{i} + 5\hat{j} \quad \dots\dots\dots(ii)$$


সুতরাং নৌকার গতিবেগ ভেট্টের পৃথিবীর

$$\text{গতিবেগের সাপেক্ষে} = \bar{w} - \bar{v}$$

$$= (\bar{w} - \bar{v}) + (\bar{v} - \bar{w})$$

$$= (3\hat{i} + 5\hat{j}) + (\hat{i} - \hat{j})$$

$$= 4\hat{i} + 4\hat{j}$$



চিত্র : 13

$$\therefore \text{নির্ণেয় গতিবেগের মান} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2} \text{ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়$$

এবং গতিবেগের দিক উত্তর বা পূর্ব দিকের সঙ্গে  $\theta$  কোণে নত হলে

$$\tan \theta = \frac{4}{4} = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

**উদাহরণ 3.** এক ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় 6 কিলোমিটার বেগে পূর্বদিকে ধাবমান হলে বায়ু সোজাসুজি উত্তর দিক হতে আসছে বোধ হয়। ব্যক্তিটি গতিবেগ দ্বিগুণ করলে বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক হতে আসছে বোধ হয়।  
 বায়ুর প্রকৃত গতিবেগ এবং তার দিক নির্ণয় করুন।

সমাধান : মনেকরি  $\hat{i} - \hat{j}$  হলো যথাক্রমে পূর্ব এবং উত্তরদিকে 6 কিলোমিটার/ঘন্টায় গতিবেগ ভেট্টের।

মনেকরি বায়ুর প্রকৃত গতিবেগ ( $\hat{i} - \hat{j}$  সমতলে) হলো  $(x\hat{i} + y\hat{j})$  যেখানে  $x, y$  দুটি ক্ষেত্রাল।

সুতরাং ব্যক্তিটির সাপেক্ষে বায়ুর গতিবেগ হলো বায়ু এবং ব্যক্তিটির গতিবেগের লক্ষি গতিবেগ

$$= (x\hat{i} + y\hat{j}) - \hat{i} \quad [\text{ব্যক্তির গতিবেগ } N = -\hat{i}]$$


$$= (x-1)\hat{i} + y\hat{j}$$

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বায়ু উত্তর দিক হতে বইছে।

$$\therefore \text{লক্ষি গতিবেগ} = -a\hat{j}$$

$$\therefore (x-1)\hat{i} + y\hat{j} = -a\hat{j}$$

$$\therefore x-1 = 0, y = -a. \quad \therefore x = 1$$



চিত্র : 14

আবার যদি ব্যক্তিটি তার গতিবেগ দ্বিগুণ করে অর্থাৎ  $-2\hat{i}$  হয় তবে ব্যক্তির গতিবেগ ও বায়ুর গতিবেগের লক্ষি গতিবেগ ভেঙ্গে হবে

$$(x\hat{i} + y\hat{j}) - 2\hat{i} = (x-2)\hat{i} + y\hat{j}$$

এক্ষেত্র মনে হচ্ছে যেন বায়ু - উত্তর - পূর্ব দিক থেকে বইছে।  $\therefore$  যদি গতিবেগ হবে  $-b(\vec{i} + \vec{j})$

$$[\theta = 45^\circ, \text{উত্তর-পূর্ব দিকে একক ভেঙ্গের হলো } \hat{i} + \hat{j}]$$

$$\therefore (x-2)\hat{i} + y\hat{j} = -b(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\therefore x-2 = -b, y = -b$$

$$\therefore x = 2-b, y = -b$$

$$x = 1 \text{ বসিয়ে } b = 1 \quad \therefore y = -1$$

$$\text{সুতরাং বায়ুর প্রকৃত গতিবেগ ভেঙ্গে} = x\hat{i} + y\hat{j} = \hat{i} - \hat{j}$$

$$\text{এর মান} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

এবং পূর্ব বা উত্তরদিকের সঙ্গে  $45^\circ$  কোণে নত।

**উদাহরণ 4** একটি বল  $\bar{F} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$  প্রয়োগের ফলে একটি কর্ণার একটি সরলরেখার দিকে  $(3, 2, -1)$  থেকে  $(2, -1, 4)$  বিন্দুতে সরণ হয়।  $\bar{F}$  বলদ্বারা কৃত কার্যের পরিমাপ নির্ণয় করুন।

**সমাধান** এখানে সরণ =  $\bar{d} = (2\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}) - (3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) = (-\vec{i} - 3\vec{j} - 5\vec{k})$

$$\bar{F} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\therefore \text{কৃতকার্য} = \bar{F} \cdot \bar{d}$$

$$= (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) \cdot (-\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k})$$

$$= -4 + 9 + 10 = 15 \text{ কার্যের একক।}$$

**উদাহরণ 5** একটি কণার ওপর দুটি বল  $(4\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$  ও  $(3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$  প্রয়োগের ফলে কণাটি  $(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$  বিন্দু হতে  $(5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k})$  বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলো।

বলগুলি দ্বারা মোট কৃতকার্যের পরিমাপ নির্ণয় করুন।

$$\text{সমাধান} \quad \text{মনে করি } \bar{F}_1 = 4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$$

$$\bar{F}_2 = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$$

$$\therefore \text{লক্ষ বল ভেক্টর } \bar{R} = \bar{F}_1 + \bar{F}_2$$

$$= (4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}) + (3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$$

$$= 7\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\text{কণাটির সরণ } \bar{d} = (5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$$

$$= 4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় কৃতকার্য} = \bar{R} \cdot \bar{d}$$

$$= (7\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) \cdot (4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k})$$

$$= 28 + 4 + 16$$

$$= 48 \text{ কার্যের একক}$$

**উদাহরণ 6** 15 এককের একটি বল একটি কণাতে প্রয়োগের ফলে কণাটি  $(1, 1, 1)$  বিন্দু হতে  $(2, 1, 3)$

বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। যদি বলের ক্রিয়া রেখা  $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$  ভেক্টর হয় তবে বলের দ্বারা কৃতকার্যের পরিমাপ নির্ণয় করুন।

$$\text{সমাধান : } (\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}) \text{ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর হলো } \frac{\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{1+4+4}}$$

$$\hat{i} = \hat{j} = \frac{\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3}$$

$$\text{সূতরাং বল ভেক্টর } \bar{F}_1 = 15 \cdot \left( \frac{\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3} \right)$$

$$= 5(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$$

$$\text{কণাটির সরণ } \vec{d} = (2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}) - (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ = \vec{i} + 2\vec{k}$$

$$\therefore \text{নিশ্চয় কৃতকার্য} = \vec{F} \cdot \vec{d} \\ = 5(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (\vec{i} + 2\vec{k}) \\ = 5 + 20 \\ = 25 \text{ কার্যের একক।}$$

**উদাহরণ 7.** একটি বল  $\vec{F} (4, 2, 1)$  একটি বিন্দু  $A (5, 2, 4)$ -এর মধ্যে দিয়ে যায়।  $B (3, -1, 3)$  বিন্দুর চারিদিকে  $\vec{F}$  বলের আমক নির্ণয় করুন।


**সমাধান :** যদি  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$  পরম্পরের ওপর লম্ব এবং একক ভেস্টের হয় তাহলে  $B$  বিন্দুর সাপেক্ষে  $A$  বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের হলো

$$\vec{r} = \overline{BA} = \overline{OA} - \overline{OB}$$

$$\text{যেখানে } \overline{OA} = 5\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\overline{OB} = 3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\therefore \vec{r} = (5\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) - (3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k})$$



চিত্র : 15

$$= 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}, \quad \vec{F} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$$

সুতরাং নিশ্চয় আমক হলো  $\vec{r} \times \vec{F}$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$


$$= \hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$$

**উদাহরণ 8**  $(2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k})$  বিন্দুগামী ও 15 এককের একটি বল  $\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$  এই ভেস্টেরের দিকে ত্রিয়া করে।  $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  বিন্দুর চারিদিকে বলটির আমক নির্ণয় করুন।

সমাধান : মনে করি A বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের  $= 2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$  F বল ভেস্টেরের মান = 15 একক F বলের ত্রিয়া রেখা  $(\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k})$ -এর দিকে আছে।

সূতরাং F- এর ত্রিয়ারেখার দিকে একক ভেস্টের হলো

$$\frac{\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{1+4+4}} = \left( \frac{\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3} \right)$$



চিত্র : 16

$$\therefore \bar{F} = 15 \cdot \left( \frac{\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}}{3} \right) = 5(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$$

$$\text{মনে করি } B \text{ বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k} = \overline{OB}$$

$$\therefore B \text{ বিন্দুর সাপেক্ষে } A \text{ বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের} = \bar{r}$$

$$\therefore \vec{r} = \overline{BA} = (\overline{OA} - \overline{OB})$$

$$= (2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}) - (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$= \hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় আমক} = \bar{r} \times \bar{F}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 1 \\ 5 & -10 & 10 \end{vmatrix} = -20\vec{i} - 5\vec{j} + 5\vec{k}$$

## 5.7 সারাংশ :

- (i) ল্যামির উপপাদ্যের (Lami's Theorem) গাণিতিক রূপটি হলো

$$\frac{|\bar{F}_1|}{\sin \left( \frac{|\bar{F}_2|}{\bar{F}_2 \wedge \bar{F}_3} \right)} = \frac{|\bar{F}_2|}{\sin \left( \frac{|\bar{F}_3|}{\bar{F}_3 \wedge \bar{F}_1} \right)} = \frac{|\bar{F}_3|}{\sin \left( \frac{|\bar{F}_1|}{\bar{F}_1 \wedge \bar{F}_2} \right)}$$

(ii) ধরুন  $\vec{F}$  বল ক্রিয়া করার ফলে বস্তুর সরণ ভেট্টার  $\vec{d}$  এবং  $\vec{F}$  ও  $\vec{d}$ -এর মধ্যবর্তী কোণ  $\theta$  হলে কার্যের পরিমাণ হবে  $|\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{d}$

(iii) আবক্ষেপ মান

$$|\vec{m}| = |\vec{F}| \cdot \text{ON}$$

যেখানে  $ON = O$  বিন্দু থেকে  $\vec{F}$  বলের ক্রিয়ারেখার উপর লম্ব।

## 5.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :

- 1। মূল বিন্দুতে স্থাপিত একটি কণার ওপর তিনটি বল  $(\hat{i} + \hat{k} - 2\hat{j}), (\hat{k} + \hat{i} - 2\hat{j}), (\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k})$  প্রযুক্ত হলো। বলগুলির লক্ষি বল নির্ণয় করুন। [উ:  $\vec{R} = O$ ]
- 2। দুইটি সমবিন্দুবল  $n \overline{OA}$  এবং  $n \overline{OB}$  দ্বারা প্রকাশ করা গেলে দেখান যে তাদের লক্ষি বল হবে  $(m+n) \overline{OR}$  যেখানে  $R$  বিন্দু  $\overline{AB}$  কে  $m:n$  অনুপাতে বিভক্ত করে এবং  $O$  হলো মূল বিন্দু।
- 3। ABCD চতুর্ভুজে  $\overline{AB}$  এবং  $\overline{AD}$  বল দুটি A বিন্দুতে এবং  $\overline{CD}$  ও  $\overline{CB}$  বল দুটি C বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। দেখান যে লক্ষি বল ভেট্টারটি হবে  $4 \overline{LM}$ , L এবং M যথাক্রমে  $\overline{AC}$  ও  $\overline{BD}$ -এর মধ্যবিন্দু।
- 4। ABCDEF একটি সূম ষড়ভুজ (regular hexagon)। পাঁচটি বল  $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{AE}$  ও  $\overline{AF}$  A বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। দেখান যে তাদের লক্ষি বল হবে  $6 \overline{AO}$ , যেখানে O বিন্দুটি হলো ষড়ভুজের ভরকেন্দ্র।
- 5। ABCDE একটি পঞ্চভুজের (pentagon)  $\overline{AB}, \overline{AE}, \overline{BC}, \overline{DC}, \overline{ED}$  ও  $\overline{AC}$  বলগুলি একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। দেখান যে তাদের লক্ষি বল হবে  $3 \overline{AC}$ ।
- 6। D, E, F যথাক্রমে ABC ত্রিভুজের BC, CA ও AB-এর মধ্যবিন্দু। প্রমাণ করুন  $\overline{OA}, \overline{OB}$  এবং  $\overline{OC}$  বলগুলি  $\overline{OD}, \overline{OE}$  এবং  $\overline{OF}$  বলগুলির সমতুল্য। O বিন্দুটি ABC সমতলে অবস্থিত।
- 7। একটি বস্তুকণার ওপর  $(5\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$  এবং  $(2\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k})$  দুটি বল প্রযুক্ত হলো এবং এর ফলে কণাটি মূলবিন্দু হতে  $(4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k})$  বিন্দুতে যায়। দেখান যে বলগুলির দ্বারা কৃতকার্যের পরিমাপ হলো 35 একক।
- 8। একটি কণার ওপর  $(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$  এবং  $(3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k})$  এই দুটি বল প্রযুক্ত হলে কণাটি A (1, 3, 2) বিন্দু হতে B (4, 5, -1) বিন্দুতে সরে যায়। দেখান যে এই বলগুলির দ্বারা কৃতকার্যের পরিমাপ হবে 7 একক।

- 9।  $6\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k}$  পাউন্ডের তিনটি বল যথাক্রমে  $(6, 2, 3)$ ,  $(3, -2, 6)$ ,  $(2, -3, -6)$  ভেক্টর বরাবর ক্রিয়াশীল। এই তিনটি বল একটি কণাতে প্রযুক্ত হলে কণাটি  $(2, -1, -3)$  বিন্দু হতে  $(5, -1, 1)$  বিন্দুতে সরে যায়। দেখান যে ঐ বলগুলির দ্বারা কৃতকার্যের পরিমাপ হলো  $53\frac{4}{7}$  ফুট - পাউন্ড, যখন দৈর্ঘ্যের একক হলো 1 ফুট।
- 10। একটি বল ভেক্টর  $(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$  একটি বিন্দু  $(3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k})$  দিয়ে ক্রিয়াশীল।  $(2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k})$  বিন্দুর চারিদিকে ঐ বলটির আমক দেখান  $(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$  হবে।
- 11। 15 এককের একটি বল  $(\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k})$  ভেক্টর বরাবর  $(2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k})$  বিন্দুতে ক্রিয়াশীল।  $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  বিন্দুর চারিদিক ঐ বলটির আমক নির্ণয় করুন।

$$[\text{উৎ}: -20\hat{i} - 5\hat{j} + 5\hat{k}]$$

## একক 6 □ ভেক্টরের ডেরিভেটিভ বা অবকল (Vector Differentiation)

পঠন

- 6.1 প্রস্তাবনা
- 6.2 উদ্দেশ্য
- 6.3 ভেক্টর ফাংশন
- 6.4 ভেক্টর ফাংশনের লিমিট বা সীমা ও সান্তত্য
  - 6.4.1 সীমা বিষয়ক কতিপয় উপপাদ্য ও প্রমাণ
  - 6.4.2 সান্তত্য বিষয়ক কতিপয় উপপাদ্য
- 6.5 ভেক্টরের অবকল
- 6.5.1 অবকলযোগ্য ফাংশনের সহিত সান্তত্যের সম্পর্ক
- 6.6 ভেক্টরের অবকলের কতিপয় সূত্র
- 6.7 প্রম্বক ভেক্টরের অবকল
  - 6.7.1 প্রম্বক ভেক্টরের অবকলজ সংজ্ঞান্ত আরও কিছু উপপাদ্য
- অনুশীলনী - 1
- 6.8 ভেক্টরের আধিক অবকলজ
- 6.9 জ্যামিতিতে ডেরিভেটিভের প্রয়োগ
  - 6.9.1 বক্রতা, ট্রিশম ইত্যাদির অন্য সূত্রাবলী
- অনুশীলনী - 2
- 6.10 সারাংশ
- 6.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
- 6.12 উজ্জ্বলালা (সংক্ষেত সহ)

## 6.1 প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা ভেট্টর ফাংশন, ফাংশনের লিমিট, সান্তত ডেরিভেটিভ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। একটি ক্ষেলার ফাংশনের লিমিট, সান্তত, ডেরিভেটিভ ও তাদের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে যেভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় ভেট্টর ফাংশনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়। কয়েকটি ধাপে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে এবং তাদের প্রয়োগ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

প্রকৃতপক্ষে ডেরিভেটিভ হল তাংক্ষণিক (Instantaneous) পরিবর্তনের হার। এই ভাবনার ফলফল হিসাবে জ্যামিতি, গতিবিদ্যা, ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক থিওরি (Electromagnetic theory) ইত্যাদি গাণিতিক শাখায় ভেট্টর ডেরিভেটিভের সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। গণিতের এইসব উচ্চতর শাখায় জ্ঞান অর্জনের সুবিধার জন্য প্রাথমিকভাবে ভেট্টর ডেরিভেটিভ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা এই এককে করা হবে।

## 6.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ভেট্টর ফাংশন (অপেক্ষক) সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন
- ভেট্টর ফাংশনের সীমা, সান্তত্যার সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন ধর্ম নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন
- ভেট্টর ফাংশনের ডেরিভেটিভের (অবকলজ) সংজ্ঞা ও তার ধর্মসমূহ বিবৃত করতে পারবেন
- ভেট্টরের আংশিক অবকলজ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে পারবেন
- ডেরিভেটিভের জ্যামিতিক প্রয়োগ দেখাতে পারবেন, এবং বক্রবর্থার স্পর্শক, লম্ব, বক্রতা, টেশন, ইত্যাদি ভেট্টরের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## 6.3 ভেট্টর ফাংশন (Vector function)

ধরা যাক : একটি ক্ষেলার চলরাশি (Scalar variable) এবং  $t$  একটি ভেট্টর রাশি। এই ক্ষেলার চলরাশি  $f$  এর জন্য নির্ধারিত বাস্তব সংখ্যার কোনো অঙ্গরাশ (Interval)  $[a,b]$  থেকে নেওয়া। এর প্রতিটি মানের জন্য যদি কোনো একটি সম্পর্ক থেকে  $t$  এর নির্দিষ্ট মান ও দিক পাওয়া যায় তবে  $t$  -কে  $f$  -কে ক্ষেলারের ভেট্টর ফাংশন বলা হয়।

সাধারণভাবে সম্পর্কটিকে  $\vec{r} = \vec{f}(t)$  এই আকারে প্রকাশ করা হয়। আবার যদি ত্রিমাত্রিক দেশে কার্ডিয় অক্ষ ত্রয়  $X$ ,  $Y$  ও  $Z$  বরাবর একক ভেট্টর সমূহ যথাক্রমে  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$  ও  $\vec{k}$  হয় তবে  $\vec{f}(t)$ -কে উক্ত অক্ষত্রয় বরাবর উপাংশে বিভাজন করে লিখলে

$$\vec{r} = f_1(t) \vec{i} + f_2(t) \vec{j} + f_3(t) \vec{k}$$

এই ভাবেও একটি ভেস্টের ফাংশনকে প্রকাশ করা যায়। এখানে  $f_1(t), f_2(t)$  ও  $f_3(t)$  ফাংশন তিনটি  $t$ -এর ক্ষেত্রে ফাংশন,  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  এগুলি প্রবক্ত একক ভেস্টের।

**উদাহরণ :** ধরা যাক ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থিত কোন বক্সের (Curve) উপর চলমান বিন্দু  $P$ -এর কোনো একটি অবস্থানের কার্ডিয় স্থানাংক  $(f_1(t), f_2(t), f_3(t))$ । তাহলে এই বিন্দুর অবস্থান ভেস্টের (Position vector)  $\vec{r}$  -কে

$$\vec{r}(t) = f_1(t) \vec{i} + f_2(t) \vec{j} + f_3(t) \vec{k}$$

আকারে লেখা হয়। এখানে  $t$  একটি প্রচল (Parameter) এবং  $f_1, f_2$  ও  $f_3$  ক্ষেত্রে ফাংশন তিনটি  $t$ -এর, উপর নির্ভরশীল।  $P$ -এর স্থানাংক  $(x, y, z)$  লিখলে  $x = f_1(t), y = f_2(t), z = f_3(t)$

যেমন,  $\vec{r}(t) = a \cos t \vec{i} + b \sin t \vec{j} + ok$  ইল  $xy$ -তলে একটি উপর্যুক্তের ভেস্টের সমীকরণ, যার কার্ডিয়

$$\text{জপ } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z = 0$$

কারণ  $P$  -এর স্থানাংক  $x, y, z$  হলে  $x = a \cos t, y = b \cdot \sin t, z = 0$

ভেস্টের অপেক্ষক বচ্ছেল বিশিষ্ট হতে পারে। কোন ভেস্টের  $\vec{r}$  যদি  $u, v, w$  ইত্যাদি একাধিক ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে  $\vec{r}$  -কে আমরা বচ্ছেলের ভেস্টের ফাংশন বলি।

## 6.4 ভেস্টের ফাংশনের লিমিট বা সীমা ও সান্তত্য (Limit and Continuity of a vector function)

**সংজ্ঞা :** যদি একটি ভেস্টের  $\vec{r}$  এমন থাকে এবং পূর্বনির্ধারিত খুব ছোট (যতটা সম্ভব) ধনাঘাতক সংখ্যা  $\delta$ -এর জন্য যদি  $t$  -এর উপর নির্ভরশীল আর একটি ধনাঘাতক সংখ্যা  $\delta$  পাওয়া যায়, যাতে

$$|\vec{r}(t) - \vec{r}| < \epsilon \text{ যখন } |t - t_0| < \delta$$

হয়; তখন  $t$  ক্ষেত্রে রাশি চলরাশির  $t_0$  মানের সমীপগামী হওয়ার জন্য  $\vec{r}$ -কে বলা হয়  $\vec{r}(t)$ -এর লিমিট বা সীমা। সাধারণত  $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{r}(t) = \vec{r}$

এইভাবে উপরোক্ত সংজ্ঞার প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় যদি  $\vec{r} = \vec{r}(t_0)$  হয়, তবে  $\vec{r}(t)$ -কে  $t = t_0$  মানেতে সন্তত (Continuous) বলা হয়।

#### 6.4.1 সীমা বিষয়ক ক্রিপ্ট উপপাদ্য ও প্রমাণ (Some theorems on limit)

(A) যদি  $\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$ ,  $\vec{\ell} = \ell_1\vec{i} + \ell_2\vec{j} + \ell_3\vec{k}$

এবং  $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{\ell}$  হয়, তবে

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f_1(t) = \ell_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} f_2(t) = \ell_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} f_3(t) = \ell_3, \quad \text{উপপাদ্যটি বিপরীতক্রমেও সত্য।}$$

(B) যদি  $\vec{f}(t)$  এবং  $\vec{g}(t)$  ভেষ্টের ফাংশন দুটির জন্য

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{\ell} \quad \text{এবং} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{g}(t) = \vec{m} \quad \text{হয়}$$

তাহলে (i)  $\lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{f}(t) \pm \vec{g}(t)] = \vec{\ell} \pm \vec{m}$

$$(ii) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t)] = \vec{\ell} \cdot \vec{m}$$

$$(iii) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t)] = \vec{\ell} \times \vec{m}$$

(C) যদি ক্লোর ফাংশন  $\phi(t)$  এবং ভেষ্টের ফাংশন  $\vec{f}(t)$ -এর জন্য

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \phi(t) = a \quad \text{এবং} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{\ell} \quad \text{হয়}$$

তাহলে (i)  $\lim_{t \rightarrow t_0} [\phi(t)\vec{f}(t)] = a\vec{\ell}$

$$(ii) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} [\vec{f}(t)] = [\vec{\ell}]$$

প্রমাণ : উপরোক্ত উপপাদ্য সমূহের দ্বাই একটির প্রমাণ এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলিকে অনুসরণ করলে বাকি উপপাদ্যগুলির প্রমাণ পাঠকগণ সহজেই করতে পারবেন।

উপপাদ্য (A) এর প্রমাণ : যেহেতু  $\lim_{t \rightarrow t_0} \bar{f}(t) = \bar{l}$ , আমরা সংজ্ঞা থেকে পাই

$$\therefore |\bar{f}(t) - \bar{l}| < \epsilon, \text{ যখন } |t - t_0| < \delta$$

অর্থাৎ  $|\{f_1(t)\bar{i} + f_2(t)\bar{j} + f_3(t)\bar{k}\} - \{\ell_1\bar{i} + \ell_2\bar{j} + \ell_3\bar{k}\}| < \epsilon$  যখন  $|t - t_0| < \delta$

অর্থাৎ  $|\{f_1(t) - \ell_1\}\bar{i} + \{f_2(t) - \ell_2\}\bar{j} + \{f_3(t) - \ell_3\}\bar{k}| < \epsilon$  যখন  $|t - t_0| < \delta$ .

অর্থাৎ  $|f_1(t) - \ell_1| < \epsilon, |f_2(t) - \ell_2| < \epsilon, |f_3(t) - \ell_3| < \epsilon$ , যখন  $|t - t_0| < \delta$ .

$\therefore$  ডেষ্টের ধর্ম অনুযায়ী তিনটি পরস্পরের সঙ্গে লম্ব ডেষ্টের  $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$  জন্য

$$|\bar{a}| < |\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}|, |\bar{b}| < |\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}|, |\bar{c}| < |\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}| \text{ হয়।}$$

এখানে  $\bar{a} = \{f_1(t) - \ell_1\}\bar{i}, \bar{b} = \{f_2(t) - \ell_2\}\bar{j}, \bar{c} = \{f_3(t) - \ell_3\}\bar{k}$  ইত্যাদি। ]

$$\therefore \lim_{t \rightarrow t_0} f_1(t) = \ell_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} f_2(t) = \ell_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} f_3(t) = \ell_3,$$

মন্তব্য : অর্থাৎ কোনো ডেষ্টের  $\bar{f}$ -এর  $f_1, f_2, f_3$  উপাংশগুলির সীমা যথাক্রমে ঐ ডেষ্টের সীমার উপাংশগুলি  $(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$  হবে। এই উপপাদ্যগুলি কাজে লাগিয়ে আমরা সীমা-সংরক্ষণ নানা উপপাদ্য প্রমাণ করতে পারি।

উপপাদ্য (খ) (iii)-এর প্রমাণ :  $\bar{f} = f_1\bar{i} + f_2\bar{j} + f_3\bar{k}, \bar{g} = g_1\bar{i} + g_2\bar{k} + g_3\bar{k}$

$$\Rightarrow \bar{f} \times \bar{g} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ f_1 & f_2 & f_3 \\ g_1 & g_2 & g_3 \end{vmatrix} = (f_2 g_3 - f_3 g_2)\bar{i} + (f_3 g_1 - f_1 g_3)\bar{j} + (f_1 g_2 - f_2 g_1)\bar{k}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{t \rightarrow t_0} (\bar{f} \times \bar{g}) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \{(f_2 g_3 - f_3 g_2)\bar{i} + (f_3 g_1 - f_1 g_3)\bar{j} + (f_1 g_2 - f_2 g_1)\bar{k}\} \\ &= (\ell_2 m_3 - \ell_3 m_2)\bar{i} + (\ell_3 m_1 - \ell_1 m_3)\bar{j} + (\ell_1 m_2 - \ell_2 m_1)\bar{k} \\ &= \bar{l} \times \bar{m} \quad (\text{উৎপাদক 'ক' অনুযায়ী যখন } \bar{m} = m_1\bar{i} + m_2\bar{j} + m_3\bar{k}) \end{aligned}$$

## 6.4.2 সান্তত্য বিষয়ক ক্রিপ্টোগ্রাফি উপপাদ্য (Some theorems on Continuity)

6.4.1 অনুচ্ছেদের উপপাদ্য খ-তে যদি  $\vec{t} = \vec{f}(t_0)$  এবং  $\vec{m} = \vec{g}(t_0)$  হয়, অর্থাৎ যদি  $\vec{f}(t)$  ও  $\vec{g}(t)$  ফাংশনসমূহ  $t = t_0$ -তে সন্তুষ্ট হয়, তবে (i), (ii) ও (iii) অনুযায়ী বলা যায় দুটি সন্তুষ্ট ভেক্টর ফাংশনের যোগফল, বিয়োগফল, ক্লেলার গুণফল (Dot product), ভেক্টর গুণফল (Vector product) এই সকলই  $t = t_0$ -তে সন্তুষ্ট হয়।

আবার একই অনুচ্ছেদের উপপাদ্য গ-তে যদি  $a = \phi(t_0)$  এবং  $\vec{t} = \vec{f}(t_0)$  হয় তবে বলা যায় একটি সন্তুষ্ট ভেক্টর ফাংশনকে যদি একটি সন্তুষ্ট ক্লেলার ফাংশন দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে ঐ গুণফল  $t = (t_0)$ -তে একটি সন্তুষ্ট ভেক্টর ফাংশন হয়।

**উদাহরণ :** দেখান যে  $\vec{r} = \vec{f}(t) = (t-2)\vec{i} + 3\vec{j} - t\vec{k}$  ভেক্টর ফাংশনটি  $t = 2$ -তে সন্তুষ্ট।

$$\text{সমাধান: } |\vec{f}(t) - \vec{f}(2)| = |(t-2)\vec{i} + 3\vec{j} - t\vec{k} - (3\vec{j} - 2\vec{k})| = |(t-2)(\vec{i} - \vec{k})|$$


$$= |t-2| |\vec{i} - \vec{k}| = |t-2| \sqrt{2}$$

$$\therefore |\vec{f}(t) - \vec{f}(2)| < \epsilon \Rightarrow \sqrt{2} |t-2| < \epsilon \Rightarrow |t-2| < \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} = \delta \text{ (ধরি)}।$$

অতএব সংজ্ঞানুসারে প্রমাণিত হল  $f = 2$ -তে  $\vec{f}(t)$  সন্তুষ্ট।

## 6.5 ভেক্টরের অবকল (Derivative of a Vector)

সংজ্ঞা : ধরা যাক  $\vec{r} = \vec{f}(t)$  একটি ভেক্টর ফাংশন, যখন  $t$  একটি ক্লেলার চলরাশি।  $t$ -এর পরিবর্তিত মান  $t + \Delta t$ -এর জন্য যদি  $\vec{r}$  এর পরিবর্তিত মান  $\vec{r} + \Delta \vec{r}$  হয় তবে



চিত্র 6.1

$\vec{r} + \Delta \vec{r} = \vec{f}(t + \Delta t)$ , যখন  $\Delta t = t$ -এর খুব ছোট পরিবর্তন এবং

$\Delta \vec{r}$  হল  $t$  এর অনুরূপ পরিবর্তনের জন্য  $\vec{r}$ -এর পরিবর্তন।

$$\begin{aligned}\text{অর্থাৎ } \Delta \vec{r} &= \vec{f}(t + \Delta t) - \vec{r} \\ &= \vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)\end{aligned}$$

$$\therefore t\text{-এর এই পরিবর্তনের সাপেক্ষে } \vec{r} \text{ এর পরিবর্তনের হার} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t}$$

যদি  $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t}$  এই লিমিটের অন্য অস্তিত্ব থাকে তবে

$\vec{r} = \vec{f}(t)$  কে  $t$ -এর সাপেক্ষে অবকলযোগ্য এবং ঐ লিমিটের মানকে  $\frac{d\vec{r}}{dt}$  বা  $\vec{f}'(t)$  দ্বারা সূচীত করা হয়

এবং এই  $\frac{d\vec{r}}{dt}$ -কেই ক্ষেলার চলরাশি  $t$  এর সাপেক্ষে  $\vec{r}$  ডেক্টর ফাংশনের ডেরিভেটিভ বা অন্তরকলজ বলা

হয়

এখানে যেহেতু  $\vec{r}$  একটি  $t$  ক্ষেলার চলরাশির ডেক্টর ফাংশন, অতএব সাধারণভাবে  $\frac{d\vec{r}}{dt}$ -ও  $t$  এর একটি

ডেক্টর ফাংশন। যদি  $\frac{d\vec{r}}{dt}$  অবকলনযোগ্য হয় তবে তার অবকলজকে  $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং  $\vec{r}$  এর দ্বিতীয় ক্রমের অবকলজ বা ডেরিভেটিভ বলে। একইভাবে  $\frac{d^3\vec{r}}{dt^3}, \frac{d^4\vec{r}}{dt^4}, \dots$  ইত্যাদি যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, ..... ক্রমের ডেরিভেটিভ। উদাহরণস্বরূপ

যদি  $t$  ক্ষেলার চলরাশি সময় এবং  $\vec{r}(t)$  ডেক্টর ফাংশন কোন গতিশীল বস্তুকণার  $t$  সময়ে অবস্থান

ডেক্টর (Position vector) হয়, তখন  $\Delta \vec{r}$  কে  $\Delta t$  সময়ে বস্তুকণার সরণ বলা হয় এবং  $t$  সময়ে বস্তুকণার

বেগ  $= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$  ধরা হয়।

অবশ্য একই সময়ে বস্তুকণার

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

**অস্তিত্ব :** যদি  $\vec{r} = \vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$  হয় যেখানে  $f_1, f_2, f_3$  স্কেলার ফাংশন

$$\text{তাহলে } \vec{f}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f_1(t + \Delta t) - f_1(t)}{\Delta t} \vec{i}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f_2(t + \Delta t) - f_2(t)}{\Delta t} \vec{j} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f_3(t + \Delta t) - f_3(t)}{\Delta t} \vec{k}$$

$$= f_1'(t)\vec{i} + f_2'(t)\vec{j} + f_3'(t)\vec{k}$$

**উদাহরণ 1.** যদি  $\vec{r} = (t^3 - 3)\vec{i} + (t^2 - 2)\vec{j} + (t - 1)\vec{k}$  হয় তবে

$$\frac{d\vec{r}}{dt}, \quad \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|, \quad \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{t=1} \text{ ইত্যাদির মান নির্ণয় করুন।}$$

$$\text{সমাধান : } \frac{d\vec{r}}{dt} = \left\{ \frac{d}{dt} (t^3 - 3) \right\} \vec{i} + \left\{ \frac{d}{dt} (t^2 - 2) \right\} \vec{j} + \left\{ \frac{d}{dt} (t - 1) \right\} \vec{k} = 3t^2 \vec{i} + 2t \vec{j} + \vec{k}$$

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \left\{ \frac{d(3t^2)}{dt} \right\} \vec{i} + \left\{ \frac{d(2t)}{dt} \right\} \vec{j} + \left\{ \frac{d(1)}{dt} \right\} \vec{k} = 6t \vec{i} + 2 \vec{j} + 0 \vec{k} = 6t \vec{i} + 2 \vec{j}$$

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{(3t^2)^2 + (2t)^2 + (1)^2} = \sqrt{9t^4 + 4t^2 + 1}$$

$$\left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{t=1} = 3(1)^2 \vec{i} + 2(1) \vec{j} + \vec{k} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

2. একটি বস্তুক্ষণ  $x = a \cos t, y = b \sin t, z = ct$  (যখন  $t = \text{সময়}$ )

বক্তৃ বরাবর গতিশীল।  $t = \frac{\pi}{2}$  সময়ে বস্তুক্ষণার বেগ ও ত্বরণ কত?

**সমাধান :**

ধরা যাক বস্তুক্ষণার যে কোনো অবস্থান  $P(x,y,z)$  এর অবস্থান ভেষ্টির  $\vec{r}$

$$\text{অতএব } \vec{r} = a \cos t \vec{i} + b \sin t \vec{j} + ct \vec{k}$$

$$\therefore \text{বস্তুক্ষণার বেগ } \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} (a \cos t) \vec{i} + \frac{d}{dt} (b \sin t) \vec{j} + \frac{d}{dt} (ct) \vec{k}$$

$$= -a \sin t \vec{i} + b \cos t \vec{j} + c \vec{k}$$

$$\text{এবং বস্তুক্ষণার ত্বরণ } \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d}{dt} (-a \sin t \vec{i} + b \cos t \vec{j} + c \vec{k})$$

অতএব  $f = \frac{\pi}{2}$  সময়ে বেগ—

$$\left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{t=\frac{\pi}{2}} = -a \sin \frac{\pi}{2} \vec{i} + b \cos \frac{\pi}{2} \vec{j} + c \vec{k} = -a\vec{i} + c\vec{k}$$

$$\text{তরণ হল, } \left( \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right)_{t=\frac{\pi}{2}} = -a \cos \frac{\pi}{2} \vec{i} - b \sin \frac{\pi}{2} \vec{j} = -b\vec{j}$$

### 6.5.1 অবকলনযোগ্য ফাংশনের সহিত সান্তত্বের সম্পর্ক (Relation between differentiable function and its continuity)

উপর্যুক্ত : যদি  $\vec{f}(t)$  ভেষ্টের ফাংশনটি  $t = t_0$ -তে অবকলযোগ্য হয় তবে ফাংশনটি  $t = t_0$ -তে সন্তত হবে।

$$\text{প্রমাণ : } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \{ \vec{f}(t_0 + \Delta t) - \vec{f}(t_0) \}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[ \Delta t \left\{ \frac{\vec{f}(t_0 + \Delta t) - \vec{f}(t_0)}{\Delta t} \right\} \right]$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta t \cdot \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{f}(t_0 + \Delta t) - \vec{f}(t_0)}{\Delta t} = 0 \cdot \vec{f}'(t_0) = 0$$

( $\because \vec{f}(t), t = t_0$ -তে অবকলযোগ্য)

$$\text{যা } \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t_0 + \Delta t) = \vec{f}(t_0)$$

অতএব সংজ্ঞা থেকে বলা যায় যে  $\vec{f}(t)$  ফাংশনটি  $t = t_0$ -তে সন্তত।

অঙ্গৰ্ধ :  $t$  এর কোনো মান  $t = t_0$  তে  $\vec{f}(t)$  সন্তত হলে  $t = t_0$ -তে অবকলনযোগ্য নাও হতে পারে।

উদাহরণ : যদি  $\vec{f}(t) = |t| \vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$  নেওয়া যায় তবে

$$|\vec{f}(t) - \vec{f}(0)| = ||t\vec{i} - 0\vec{i}|| = ||t\vec{i}|| = |t|$$

অতএব,  $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{f}(t) = \vec{f}(0) \quad [\because t \rightarrow 0 \Rightarrow |t| < \epsilon]$

সুতরাং  $f(t)$  ফাংশনটি  $t = 0$  বিশ্বৃতে সন্তত।

$$\text{কিন্তু } (-1)^i \frac{\bar{f}(t) - \bar{f}(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow t_0^+} \frac{|t|^i}{t} \pm \lim_{t \rightarrow t_0^-} i \quad [|t| = t \text{ যখন } t > 0] \\ = \bar{i}$$

$$\text{এবং } \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{\bar{f}(t) - \bar{f}(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{|t|^i}{t} = \lim_{t \rightarrow t_0^-} (-1)^i \\ = -\bar{i} \quad [ \because |t| = -t, \text{ যখন } t < 0 ]$$

যেহেতু উপরোক্ত লিমিট্বয় বিভিন্ন, সূতরাং  $f'(0)$ -এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ,  $f(t)$  অবকলনযোগ্য নয়।

## 6.6 ভেক্টরের অবকলনের ক্রিয়া সূত্র (Rules of differentiation)

যদি  $\bar{u}(t), \bar{v}(t), \bar{w}(t)$  তিনটি ভেক্টর ফাংশন  $t$  ক্ষেত্রে চলরাশির সাপেক্ষে অবকলনযোগ্য হয় এবং  $\phi(t)$  ক্ষেত্রে ফাংশনটিও  $t$ -এর সাপেক্ষে অবকলনযোগ্য হয় তবে

$$(i) \frac{d}{dt} (\bar{u} \pm \bar{v}) = \frac{d\bar{u}}{dt} \pm \frac{d\bar{v}}{dt}$$

$$(ii) \frac{d}{dt} (\bar{u} \cdot \bar{v}) = \bar{u} \cdot \frac{d\bar{v}}{dt} + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot \bar{v}$$

$$(iii) \frac{d}{dt} (\bar{u} \times \bar{v}) = \bar{u} \times \frac{d\bar{v}}{dt} + \frac{d\bar{u}}{dt} \times \bar{v}$$

$$(iv) \frac{d}{dt} (\phi \bar{u}) = \phi \frac{d\bar{u}}{dt} + \frac{d\phi}{dt} \times \bar{u}$$

$$(v) \frac{d}{dt} [\bar{u} \bar{v} \bar{w}] = \bar{u} \cdot \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} + \bar{u} \cdot \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot \bar{v} \times \bar{w},$$

$$(vi) \frac{d}{dt} \{ \bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) \} = \bar{u} \times \left( \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} \right) + \bar{u} \times \left( \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} \right) + \frac{d\bar{u}}{dt} \times (\bar{v} \times \bar{w})$$

প্রমাণ : ধরা যাক  $t$  ক্ষেত্রে চলরাশির  $\Delta t$  পরিবর্তনের জন্য  $\bar{u}, \bar{v}$  ও  $\bar{w}$  ফাংশনগুলির পরিবর্তন যথাক্রমে  $\Delta \bar{u}, \Delta \bar{v}, \Delta \bar{w}$ , তাহলে

(i)  $t$  ক্ষেত্রে চলরাশির  $\Delta t$  পরিবর্তনের জন্য  $\bar{u} + \bar{v}$  ভেক্টর ফাংশনের পরিবর্তন

$$\Delta(\bar{u} + \bar{v}) = (\bar{u} + \Delta\bar{u} + \bar{v} + \Delta\bar{v}) - (\bar{u} + \bar{v}) = \Delta\bar{u} + \Delta\bar{v}$$

$$\therefore \frac{\Delta(\bar{u} + \bar{v})}{\Delta t} = \frac{\Delta\bar{u}}{\Delta t} + \frac{\Delta\bar{v}}{\Delta t}$$

উভয় পক্ষে  $\Delta t \rightarrow 0$  এই পরিপ্রেক্ষিতে লিমিট নিয়ে পাই

$$\frac{d}{dt} (\bar{u} + \bar{v}) = \frac{d\bar{u}}{dt} + \frac{d\bar{v}}{dt} \quad (\text{সংজ্ঞা থেকে})$$

$$\text{অনুরূপে, } \frac{d}{dt} (\bar{u} - \bar{v}) = \frac{d\bar{u}}{dt} - \frac{d\bar{v}}{dt}$$

(ii)  $t$ -ক্ষেত্রে চলরাশির  $\Delta t$  পরিবর্তনের জন্য  $\bar{u}, \bar{v}$  এর পরিবর্তন.

$$\begin{aligned}\Delta(\bar{u}, \bar{v}) &= (\bar{u} + \Delta\bar{u})(\bar{v} + \Delta\bar{v}) - \bar{u}\bar{v} \\ &= \bar{u}\Delta\bar{v} + \Delta\bar{u}\bar{v} + \Delta\bar{u}\Delta\bar{v}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\Delta(\bar{u}, \bar{v})}{\Delta t} = \bar{u} \cdot \frac{\Delta\bar{v}}{\Delta t} + \frac{\Delta\bar{u}}{\Delta t} \cdot \bar{v} + \frac{\Delta\bar{u}}{\Delta t} \cdot \Delta\bar{v}$$

এখন  $\Delta t \rightarrow 0$  এই পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষে লিমিট নিয়ে পাই

$$\frac{d}{dt} (\bar{u}, \bar{v}) = \bar{u} \cdot \frac{d\bar{v}}{dt} + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot \bar{v} \quad [\because \Delta\bar{u}, \Delta\bar{v} \text{ উভয়ই } \Delta t \text{-এর সাথে সাথে } 0 \text{ এর সমীপগামী হয়}]$$

(iii)  $t$ -এর  $\Delta t$  পরিবর্তনের জন্য  $\bar{u} \times \bar{v}$  এর পরিবর্তন

$$\Delta(\bar{u} \times \bar{v}) = (\bar{u} + \Delta\bar{u}) \times (\bar{v} + \Delta\bar{v}) - \bar{u} \times \bar{v}$$

উভয়পক্ষকে  $\Delta t$  দিয়ে ভাগ করে এবং একইভাবে  $\Delta t \rightarrow 0$  এর পরিপ্রেক্ষিতে লিমিট নিয়ে পাই

$$\frac{d}{dt} (\bar{u} \times \bar{v}) = \bar{u} \times \frac{d\bar{v}}{dt} + \frac{d\bar{u}}{dt} \times \bar{v}$$

(iv)  $t$ -এর পরিবর্তন  $\Delta t$  এর জন্য  $\phi\bar{u}$  এর পরিবর্তন

$$\begin{aligned}\Delta(\phi\bar{u}) &= (\phi + \Delta\phi)(\bar{u} + \Delta\bar{u}) - \phi\bar{u} \\ &= (\Delta\phi)\bar{u} + \phi(\Delta\bar{u}) + (\Delta\phi)(\Delta\bar{u})\end{aligned}$$

এক্ষেত্রেও  $\Delta t$  দিয়ে ভাগ করে উভয়পক্ষে একই ভাবে লিমিট নিলে উভয় পাওয়া যাবে।

$$(v) \frac{d}{dt} [\bar{u} \bar{v} \bar{w}] = \frac{d}{dt} \{ \bar{u} \cdot (\bar{v} \times \bar{w}) \}$$

$$= \bar{u} \cdot \frac{d}{dt} (\bar{v} \times \bar{w}) + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot (\bar{v} \times \bar{w}) \quad [(ii) \text{ নং সূত্রানুসারে }]$$

$$= \bar{u} \cdot \left( \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} + \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} \right) + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot (\bar{v} \times \bar{w}) \quad [(iii) \text{ নং সূত্রানুসারে }]$$

$$= \bar{u} \cdot \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} + \bar{u} \cdot \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} + \frac{d\bar{u}}{dt} \cdot \bar{v} \times \bar{w}$$

$$= \left[ \bar{u} \bar{v} \frac{d\bar{w}}{dt} \right] + \left[ \bar{u} \frac{d\bar{v}}{dt} \bar{w} \right] + \left[ \frac{d\bar{u}}{dt} \bar{v} \bar{w} \right]$$

$$(vi) \frac{d}{dt} \{ \bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) \} = \bar{u} \times \frac{d}{dt} (\bar{v} \times \bar{w}) + \frac{d\bar{u}}{dt} \times (\bar{v} \times \bar{w}) \quad [(iii) \text{ নং সূত্র অনুযায়ী}]$$

$$= \bar{u} \times \left( \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} + \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} \right) + \frac{d\bar{u}}{dt} \times (\bar{v} \times \bar{w})$$

$$= \bar{u} \times \left( \bar{v} \times \frac{d\bar{w}}{dt} \right) + \bar{u} \times \left( \frac{d\bar{v}}{dt} \times \bar{w} \right) + \frac{d\bar{u}}{dt} \times (\bar{v} \times \bar{w})$$

## 6.7 প্রবক্ত ভেস্টের অবকল (Derivation of a Constant Vector)

যখন কোনো ভেস্টের মান ও দিক উভয়ই নির্দিষ্ট থাকে তখন তাকে প্রবক্ত ভেস্টের বলা হয়।

ধরা যাক । ক্ষেপার চলাচারির একটি প্রবক্ত ভেস্টের ফাংশন  $\vec{r} = \vec{c}$  অতএব  $t$ -এর পরিবর্তন  $\Delta t$ -এর জন্য  $\vec{r}$  এর পরিবর্তন  $\Delta \vec{r}$  ধরলে, এখানে  $\vec{r} + \Delta \vec{r} = \vec{c}$  হয়, অর্থাৎ  $\Delta \vec{r} = \vec{0}$

$$\therefore \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{0}}{\Delta t} = \vec{0}$$

$$\therefore \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{0}$$

$$\therefore \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{0}$$

বিপরীতজমে যদি  $\vec{r} = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$  এই ভেস্টের ফাংশনের ক্ষেত্রে  $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{0}$  হয়, তখন

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{df_1}{dt} \vec{i} + \frac{df_2}{dt} \vec{j} + \frac{df_3}{dt} \vec{k} = \vec{0}$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{df_1}{dt} = 0, \quad \frac{df_2}{dt} = 0, \quad \frac{df_3}{dt} = 0$$

অতএব  $f_1, f_2, f_3$  ক্ষেত্রের ফাংশন তথ্য সকলেই শ্রবক

$$\Rightarrow \vec{r} = f_1\vec{i} + f_2\vec{j} + f_3\vec{k} \text{ একটি শ্রবক ভেস্টর।}$$

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে (উপপাদ্য) একটি ভেস্টর ফাংশন  $\vec{f}(t)$  বা  $\vec{f}(t)$ -এর শ্রবক হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট (necessary and sufficient) শর্ত হল

$$\frac{d\vec{f}(t)}{dt} = \vec{0}$$

### 6.7.1 শ্রবক ভেস্টরের অবকলজ সংক্রান্ত আরও কিছু উপপাদ্য (Some more theorems on derivatives of constant vector)

যখন একটি ভেস্টর ফাংশনের পরিবর্তন ঘটে তখন ভেস্টরটির দিকের অথবা মানের অথবা উভয়েরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদি মান ও দিকের কোনো একটি শ্রবক থাকে তখন তার ডেরিভেটিভ সংক্রান্ত দুটি উপপাদ্য এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হচ্ছে।

**উপপাদ্য (A) :** ভেস্টর ফাংশন  $\vec{r} = \vec{f}(t)$  এর মান শ্রবক থাকার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত হল

$$\vec{f} \cdot \frac{d\vec{f}}{dt} = 0$$

প্রমাণ : ভেস্টর ফাংশন  $\vec{r} = \vec{f}(t)$ -এর মানকে  $|\vec{f}(t)|$  দ্বারা চিহ্নিত করলে আমরা জানি

$$\vec{f}(t) \cdot \vec{f}(t) = |\vec{f}(t)|^2$$

উভয় পক্ষকে । এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই

$$2\vec{f} \cdot \frac{d\vec{f}}{dt} = 2|\vec{f}| \frac{d|\vec{f}|}{dt} \quad (|\vec{f}(t)| \text{ হল ক্ষেত্রের ফাংশন})$$

$$\text{বা } \vec{f} \cdot \frac{d\vec{f}}{dt} = |\vec{f}| \frac{d|\vec{f}|}{dt} \dots\dots\dots (i) \quad (\because \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a})$$

এখন যদি  $|\vec{f}| =$  শ্রবক হয় তখন  $\frac{d|\vec{f}|}{dt} = 0$  হয় এবং তখন (i) থেকে বলা যায় —

$$\vec{f} \cdot \frac{d\vec{f}}{dt} = 0$$

$\therefore$  শর্তটি প্রয়োজনীয়।

ଆବାର ଯদି  $\bar{f} \cdot \frac{d\bar{f}}{dt} = 0$  ହୁ ତବେ (i) ଥେକେ ବଳା ଯାଇ,

$$|\vec{f}| \frac{d|\vec{f}|}{dt} = 0$$

$$\therefore \frac{d}{dt} |\vec{f}| = 0$$

$\Rightarrow \bar{f}(t)$  ডেস্ট্রি ফাংশনটির মান ধ্রুবক।

∴ শর্টটি যথেষ্ট

**অনুসিদ্ধান্ত :**  $f(t)$  ভেষ্টরতির মান প্রবক্ত হলে যেহেতু  $\bar{f} \cdot \frac{d\bar{f}}{dt} = 0$ , সূতরাং  $\bar{f}$  ও  $\frac{d\bar{f}}{dt}$  পরম্পর লম্ব।

**উপগাদ্য (B) :** ডেক্টের ফাল্পন  $\bar{t} = \bar{f}(t)$  এর দিক নির্দিষ্ট বা ধৰ্মক থাকার প্রয়োজনীয় ও ঘটেছে শর্ত হল

$$\bar{f} \times \frac{d\bar{f}}{dt} = \bar{0}$$

প্রমাণ : ধরা যাক  $f = f \circ i$ , যখন  $i = f$  এর দিকে বরাবর একক ভেস্টের এবং  $|f| = f$

$$\therefore \frac{d\vec{f}}{dt} = \vec{f} \frac{d\hat{n}}{dt} + \frac{d\vec{f}}{dt} \hat{n} \quad [ \text{এখানে } \vec{f} \text{ এবং } \hat{n} \text{ উভয়ই } t \text{ এর ফাংশন } ]$$

$$\therefore \bar{f} \times \frac{d\vec{f}}{dt} = \bar{f} \times \left( f \frac{d\hat{n}}{dt} + \frac{df}{dt} \hat{n} \right)$$

$$= \hat{f} \hat{n} \times \left( f \frac{d\hat{n}}{dt} + \frac{df}{dt} \hat{n} \right) \quad [ \because \hat{f} = f \hat{n} ]$$

এখন যদি  $f(t)$ -এর দিক্ক ফ্রবক থাকে তখন  $\bar{f}$  একক ডেক্সেরিউটির দিকও ফ্রবক হয় অর্থাৎ  $\bar{f}$  ডেক্সেরিউটি  
ক ফ্রবক হয় (যেহেতু  $\bar{f}$  এর মান ও দিক উভয়ই ফ্রবক)।

অস্তএব আগের ৬.৭-এর উপপাদ্য অনুযায়ী  $\frac{d\bar{n}}{dt} = 0$

$$\text{অতএব (i) থেকে পাওয়া যায় } \bar{f} \times \frac{d\bar{f}}{dt} = \bar{0}$$

$\Rightarrow$  শর্তটি প্রয়োজনীয়।

$$\text{আবার যদি } \bar{f} \times \frac{d\bar{f}}{dt} = \bar{0} \text{ হয় তবে (i) থেকে পাওয়া যায়}$$

$$f^2 \hat{n} \times \frac{d\hat{n}}{dt} = \bar{0}$$

$$\Rightarrow \hat{n} \times \frac{d\hat{n}}{dt} = \bar{0} \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

[  $\because f$  সর্বদা শূন্য নয় ]

এছাড়া যেহেতু  $\hat{n}$  ডেক্টরিটির মান ক্রবক (এককমান বিশিষ্ট), উপপাদ্য (A) অনুযায়ী

$$\hat{n} \cdot \frac{d\hat{n}}{dt} = 0 \dots \dots \dots \text{(iii)}$$

অতএব (ii) এবং (iii) থেকে মন্তব্য করা যায়

$$\frac{d\hat{n}}{dt} = \bar{0}$$

$\Rightarrow \hat{n}$  ডেক্টরিটি ক্রবক ডেক্টর।

$\Rightarrow \bar{f}(t)$  ডেক্টর দিক্ নির্দিষ্ট বা ক্রবক

অতএব শর্তটি যথেষ্ট।

উদাহরণ 1 : যদি  $\bar{\alpha} = (3t^2 - 1)\bar{i} - \bar{j} + 2t\bar{k}$  এবং  $\bar{\beta} = \bar{i} - t\bar{j} + t^2\bar{k}$  হয় তবে

$$\frac{d}{dt}(\bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}), \quad \frac{d}{dt}(\bar{\alpha} \times \bar{\beta}), \quad \frac{d}{dt}(\bar{\beta} \times \bar{\beta}), \text{ ইত্যাদির মান নির্ণয় করুন।}$$

সমাধান : [ প্রথমে  $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$  এর মান নির্ণয় করে তাকে  $t$ -এর সাপেক্ষে অবকলন করলে  $\frac{d}{dt}(\bar{\alpha} \cdot \bar{\beta})$ -এর

মান নির্ণয় করা যায় এবং অনুলোপ পদ্ধতিতে  $\frac{d}{dt}(\bar{\alpha} \times \bar{\beta})$  ও  $\frac{d}{dt}(\bar{\beta} \times \bar{\beta})$  এগুলিরও মান নির্ণয় করা যায়।

কিন্তু আমরা এখানে তা না করে এই এককে আলোচিত সূত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করব। ]

$$\frac{d}{dt}(\bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}) = \bar{\alpha} \cdot \frac{d\bar{\beta}}{dt} + \frac{d\bar{\alpha}}{dt} \cdot \bar{\beta}$$

$$= ((3t^2 - 1)\bar{i} - \bar{j} + 2t\bar{k}) \cdot \frac{d}{dt}(\bar{i} - t\bar{j} + t^2\bar{k}) + \frac{d}{dt}((3t^2 - 1)\bar{i} - \bar{j} + 2t\bar{k}) \cdot (\bar{i} - t\bar{j} + t^2\bar{k})$$

$$\begin{aligned}
&= \{(3t^2 - 1)\vec{i} - \vec{j} + 2t\vec{k}\} \cdot (-\vec{j} + 2t\vec{k}) + (6t\vec{i} + 2\vec{k}) \cdot (\vec{i} - t\vec{j} + t^2\vec{k}) \\
&= \{(3t^2 - 1) \cdot 0 + (-1)(-1) + (2t) \cdot (2t)\} + \{(6t) \cdot 1 + 0 \cdot (-t) + 2 \cdot t^2\} \\
&= 1 + 4t^2 + 6t + 2t^2 = 6t^2 + 6t + 1
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) = \vec{\alpha} \times \frac{d\vec{\beta}}{dt} + \frac{d\vec{\alpha}}{dt} \times \vec{\beta}$$

$$= \{(3t^2 - 1)\vec{i} - \vec{j} + 2t\vec{k}\} \times (-\vec{j} + 2t\vec{k}) + (6t\vec{i} + 2\vec{k}) \times (\vec{i} - t\vec{j} + t^2\vec{k})$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3t^2 - 1 & -1 & 2t \\ 0 & -1 & 2t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6t & -0 & 2 \\ 1 & -t & t^2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \vec{i}(-2t + 2t) + \vec{j}(0 - 2t(3t^2 - 1)) + \vec{k}((3t^2 - 1)(-1) + 0) \\
&\quad + \vec{i}(0 + 2t) + \vec{j}(2 - 6t^3) + \vec{k}(-6t^2 - 0) \\
&= 2t\vec{i} - (12t^3 - 2t - 2)\vec{j} - (9t^2 - 1)\vec{k}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}(\vec{\beta} \cdot \vec{\beta}) &= \vec{\beta} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{dt} + \frac{d\vec{\beta}}{dt} \cdot \vec{\beta} = 2\vec{\beta} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{dt} \\
&= 2(\vec{i} - t\vec{j} + t^2\vec{k}) \cdot (-\vec{j} + 2t\vec{k}) \\
&= 2\{1 \cdot 0 + (-t)(-1) + t^2 \cdot 2t\} = 2(2t^3 + t)
\end{aligned}$$

$$2. \text{ দেখান যে } \frac{d}{dt} \left( \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v} \right) = \vec{u} \times \frac{d^2\vec{v}}{dt^2} - \frac{d^2\vec{u}}{dt^2} \times \vec{v}$$

$$\begin{aligned}
\text{সমাধান : বামপক্ষ} &= \frac{d}{dt} \left( \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v} \right) = \frac{d}{dt} \left( \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \right) - \frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v} \right) \\
&= \left\{ \vec{u} \times \frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{v}}{dt} \right) + \frac{d\vec{u}}{dt} \times \frac{d\vec{v}}{dt} \right\} - \left\{ \frac{d\vec{u}}{dt} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{u}}{dt} \right) \times \vec{v} \right\} \\
&= \vec{u} \times \frac{d^2\vec{v}}{dt^2} - \frac{d^2\vec{u}}{dt^2} \times \vec{v} = \text{ডানপক্ষ!}
\end{aligned}$$

$$3. \bar{\alpha} = t^2\bar{i} + t\bar{j} + \bar{k}, \bar{\beta} = \bar{i} + t^2\bar{j} + t\bar{k}, \bar{\gamma} = t\bar{i} + \bar{j} + t^2\bar{k} \text{ হলে}$$

$\frac{d}{dt} [\bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{\gamma}]$  এর মান  $t = 2$  তে কত?

$$\text{সমাধান : } \frac{d}{dt} [\bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{\gamma}] = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta} \times \frac{d\bar{\gamma}}{dt} + \bar{\alpha} \cdot \frac{d\bar{\beta}}{dt} \times \bar{\gamma} + \frac{d\bar{\alpha}}{dt} \cdot \bar{\beta} \times \bar{\gamma}$$

$$\text{এখন } \frac{d\bar{\gamma}}{dt} = \frac{d}{dt} (t\bar{i} + \bar{j} + t^2\bar{k}) = \bar{i} + 2t\bar{k}$$

$$\frac{d\bar{\beta}}{dt} = \frac{d}{dt} (\bar{i} + t^2\bar{j} + t\bar{k}) = 2t\bar{j} + \bar{k}$$

$$\frac{d\bar{\alpha}}{dt} = \frac{d}{dt} (t^2\bar{i} + t\bar{j} + \bar{k}) = 2t\bar{i} + \bar{j}$$

$\therefore$  উপরের সূত্রে মানগুলি বসিয়ে পাই

$$\frac{d}{dt} [\bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{\gamma}] = \begin{vmatrix} t^2 & t & 1 \\ 1 & t^2 & t \\ 1 & 0 & 2t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} t^2 & t & 1 \\ 0 & 2t & 1 \\ t & 1 & t^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2t & 1 & 0 \\ 1 & t^2 & t \\ t & 1 & t^2 \end{vmatrix}$$

$$\left( \because [\bar{a} \bar{b} \bar{c}] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \right), \text{ যখন } \bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k} \\ \bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k} \\ \bar{c} = c_1\bar{i} + c_2\bar{j} + c_3\bar{k}$$

$$\begin{aligned} &= \{t^2(2t^3 - 0) + t(t - 2t) + 1(0 - t^2)\} + \{t^2(2t^3 - 1) + t(t - 0) + 1(0 - 2t^2)\} \\ &\quad + \{2t(t^4 - t) + 1(t^2 - t^2)\} \\ &= (2t^5 - t^2 - t^2) + (2t^5 - 2t^2) + (2t^3 - 2t^2) \\ &= 6t^5 - 6t^2 = 6t^2(t^3 - 1) \end{aligned}$$

$$\therefore t = 2 \text{ তে } \frac{d}{dt} [\bar{\alpha} \bar{\beta} \bar{\gamma}] \text{-এর মান} = 6 \cdot 2^2 (2^3 - 1) = 24 \times 7 = 168$$

## অনুশীলনী - 1

1. দেখান যে  $\vec{r} = \cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j} + 5\vec{k}$  ভেক্টর ফাংশনটি  $\theta = \frac{\pi}{2}$ -তে সম্পৃক্ষিত।
2.  $\vec{r} = 5t^2\vec{i} + (t^3 + 1)\vec{j} + 2t\vec{k}$  ভেক্টরটি যদি t সময়ে কোনো গতিশীল বস্তুকণার স্থান ভেক্টর হয় তবে t=1 তে  $2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$  দিক বরাবর উহার বেগের উপাংশ নির্ণয় করুন।

$$[\text{সংকেত}-::-\frac{d\vec{r}}{dt} = 10t\vec{i} + 3t^2\vec{j} + 2\vec{k}, \Rightarrow \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{(t=1)} = 10\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k} = \text{বেগ}$$

$2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$  ভেক্টর বরাবর একক ভেক্টর

$$= \frac{2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}}{|2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}|} = \frac{2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{1}{3}(2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$$

$$\therefore \text{নির্ণয় উপাংশ} = (10\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot \frac{1}{3}(2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) = \frac{1}{3}(10.2 + 3.2 + 2.1) = \frac{28}{3}$$

3.  $\vec{\alpha} = (t^2 + 1)\vec{i} + (t^2 - 1)\vec{j} + t\vec{k}, \vec{\beta} = t\vec{i} + (t^2 + 1)\vec{j} + (t^2 - 1)\vec{k}$  হলে t = 1-তে

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{\alpha}}{dt} \times \vec{\beta} \right) \text{ এর মান নির্ণয় করুন } \quad [ \text{উত্তর : } 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k} ]$$

$$4. \text{ দেখান যে } \frac{d}{dt} \left\{ \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) \right\} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) + \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right)$$

## 6.8 ভেক্টরের আধিক্যিক অবকলজ (Partial derivatives of vectors)

কেবলমাত্র একটি ক্ষেলার চলরাশি t এর উপর নির্ভরশীল না হয়ে কোনো ভেক্টর ফাংশন একাধিক ক্ষেলার চলরাশির উপর নির্ভরশীল হতে পারে। ত্রিমাত্রিক দেশে কোনো বিন্দুর স্থান ভেক্টর স্থানাংকের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। যদি কার্তিয় স্থানাংকের কথা ভাবা হয় তবে চলমান বিন্দু P(x,y,z)-এর স্থান ভেক্টর

$\vec{r} = \vec{f}(x, y, z)$  দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

এক্ষেত্রে  $x$ -এর সাপেক্ষে  $\bar{f}$ -এর আংশিক অবকলজ (আংশিক ডেরিভেটিভ) নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত :

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(x + \Delta x, y, z) - \bar{f}(x, y, z)}{\Delta x}$$

অবশ্যই এই লিমিটের অস্তিত্ব থাকতে হবে। অনুরূপে  $y$  ও  $z$  এর সাপেক্ষে

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(x, y + \Delta y, z) - \bar{f}(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\bar{f}(x, y, z + \Delta z) - \bar{f}(x, y, z)}{\Delta z}$$

এইভাবে আংশিক অবকলজগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, অবশ্যই এই ক্ষেত্রগুলিতেও লিমিটগুলির অস্তিত্ব থাকতে হবে।

অঙ্গরকলনবিদ্যার ক্ষেত্রে ফাংশনের আংশিক ডেরিভেটিভের মতই ভেষ্টের ফাংশনের ক্ষেত্রেও উচ্চতমের ডেরিভেটিভ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত হয় :

$$\frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right), \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right), \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right)$$

$$\frac{\partial^3 \bar{f}}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x^2} \right), \frac{\partial^3 \bar{f}}{\partial y \partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x^2} \right) \text{ ইত্যাদি।}$$


$$\text{এছাড়াও, } \frac{\delta^3 \bar{f}}{\delta x^3} = \frac{\delta}{\delta x} \left( \frac{\delta^2 \bar{f}}{\delta x^2} \right), \frac{\delta^3 \bar{f}}{\delta y \delta x^2} = \frac{\delta}{\delta y} \left( \frac{\delta^2 \bar{f}}{\delta x^2} \right) \text{ ইত্যাদি।}$$

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন,  $f$ -এর কমপক্ষে দ্বিতীয় ত্রৈমাত্রিক আংশিক অবকলজগুলি যদি সন্তুত হয় তবে

$\frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial y \partial x}$  হয়। ভেষ্টের ফাংশনের আংশিক অবকলজের নিয়মাবলী ক্ষেত্রে ফাংশনের আংশিক অবকলজের অনুরূপ। প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এখানে বিশদ আলোচনা করা হল না।

## 6.9 জ্যামিতিতে ডেরিভেটিভের প্রয়োগ (Application of derivative to geometry)

ধরা যাক ত্রিমাত্রিক দেশে একটি বক্ররেখার উপর বিন্দুর অবস্থান এই রেখার উপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A থেকে বক্ররেখা বরাবর দূরত্ব দিয়ে নির্গত করা হয়। যদি বক্ররেখার উপর নির্দিষ্ট বিন্দু A থেকে এই বক্ররেখার উপর অন্য যে কোনো একটি চলমান বিন্দু P এর বক্র বরাবর দূরত্ব s হয় তবে যে কোনো একটি বিন্দু O কে মূলবিন্দু ধরে P বিন্দুর অবস্থান ভেটার  $\vec{OP} = \vec{r}$  সর্বদাই s এর উপর নির্ভরশীল হবে। তাই এই ধরনের বক্ররেখার সমীকরণ  $\vec{r} = \vec{f}(s)$



চিত্র 6.2

এইভাবে সূচীত করা যায়, যেখানে s একটি ক্ষেত্রে চলরাশি।

A. স্পর্শক : নির্দিষ্ট বিন্দু A থেকে বক্ররেখা বরাবর P বিন্দুর দূরত্ব s বলে এই বিন্দুকে  $P(s)$  আরা চিহ্নিত করা হয়। ধরা যাক  $Q(s + \Delta s)$  বিন্দুটি বক্রের উপর এবং P এর খুব কাছাকাছি। যদি Q-এর অবস্থান ভেটার  $\vec{OQ} = \vec{r} + \Delta \vec{r}$  ধরা হয় তাহলে

$$\vec{PQ} = \vec{r} + \Delta \vec{r} - \vec{r} = \Delta \vec{r}$$

$$\text{এখন } \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} = \frac{\vec{PQ}}{\text{চাপ } PQ} = \frac{\vec{PQ}}{\text{জ্যা } PQ} = \frac{\text{জ্যা } PQ}{\text{চাপ } PQ} \dots \dots \dots \text{(i)} \quad [\because \Delta s = \text{চাপ } PQ]$$

$$\text{আমরা জানি } \lim_{Q \rightarrow P} \frac{\text{জ্যা } PQ}{\text{চাপ } PQ} = 1 \text{ একটি প্রতিষ্ঠিত ফল; এবং } Q \rightarrow P \text{ হলে } \frac{\vec{PQ}}{\text{জ্যা } PQ} \text{ অনুপাতটি}$$

একটি একক ডেক্সার রূপান্তরিত হতে থাকবে যার দিক P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর। এই একক ডেক্সারকে  $\vec{t}(s)$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

অতএব (i)-এর উভয়পক্ষে  $Q \rightarrow P$  এর উপর লিমিট নিয়ে পাই

$$\lim_{Q \rightarrow P} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} = \lim_{Q \rightarrow P} \frac{\vec{PQ}}{\text{জ্যা } PQ} = \lim_{Q \rightarrow P} \frac{\text{জ্যা } PQ}{\text{চাপ } PQ}$$

$$\text{or, } \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{t}(s) \cdot 1 = \vec{t}(s) \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

এই  $\vec{t}(s)$  একক ডেক্সারটি s এর বর্ধিত দিক বরাবর P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এবং এটিকে একক স্পর্শক (unit tangent) বলা হয়।

যদি বক্রের সমীকরণ

$$\vec{r} = \vec{f}(s) = x(s)\vec{i} + y(s)\vec{j} + z(s)\vec{k}$$

এইভাবে লেখা হয় তাহলে

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{dx}{ds}\vec{i} + \frac{dy}{ds}\vec{j} + \frac{dz}{ds}\vec{k}$$

সূতরাং P বিন্দুতে অঙ্কিত একক স্পর্শক  $\vec{t}$  এর দিক কোসাইনগুলি (direction cosines) হল

$$\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}, \frac{dz}{ds}$$

P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ডেক্সার সমীকরণ

$$\vec{R} = \vec{r} + \lambda \vec{t} \dots \dots \text{(iii)}$$

যেখানে স্পর্শকের উপর যে কোনো বিন্দুর স্থান ডেক্সার মূল এবং  $\vec{r}$  ও  $\vec{t}$  সমন্বয়ে আগেই বলা হয়েছে।

স্পর্শকের ডেক্সার সমীকরণ (iii)-কে কার্তিয় স্থানাংকে রূপান্তরিত করলে স্পর্শকের কার্তিয় সমীকরণ হয়—

$$\frac{X - x}{\frac{dx}{ds}} = \frac{Y - y}{\frac{dy}{ds}} = \frac{Z - z}{\frac{dz}{ds}} (= \lambda)$$

যেখানে  $\vec{R} = X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ ,  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  অর্থাৎ P বিন্দুর কার্তিয় স্থানাংশ (x,y,z) এবং স্পর্শকের উপর যে কোনো বিন্দুর স্থানাংক (X,Y,Z)

**জটিল :** একটি বক্র রেখাকে  $\vec{r} = \vec{f}(u)$ , এভাবেও লেখা যায় দেখালে u একটি বেলার চল। একেতে স্পর্শক  $\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{du} \frac{du}{ds}$  হবে।

উদাহরণ : যদি বক্ররেখার সমীকরণ  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$ ,  $z = t$  হয় তবে তার উপর যেকোন বিন্দুর অবস্থান ভেট্টার

$$\vec{r} = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + t \vec{k}$$

$$\therefore \frac{d\vec{r}}{dt} = -\sin t \vec{i} + \cos t \vec{j} + \vec{k}$$

কিন্তু  $\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \vec{t} \frac{ds}{dt}$  .....(iv) [  $t$  হল একক সংশ্লিষ্ট ভেট্টার। ]

$$\therefore \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \left| \frac{ds}{dt} \right| \quad [\because |\vec{t}| = 1]$$

$$\text{বা} \quad \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

$$\text{বা} \quad \sqrt{2} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

$$\therefore \vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt} / \left| \frac{ds}{dt} \right| \quad [(\text{iv}) \text{ থেকে}]$$

$$= (-\sin t \vec{i} + \cos t \vec{j} + \vec{k}) / \sqrt{2}$$

এই প্রসঙ্গে বলা যায়  $P$  বিন্দুগামী যে তল, স্পর্শক  $\vec{t}$  এর সাথে লম্ব ভাবে অবস্থিত তাকে অভিলম্ব তল (normal plane) বলে। অভিলম্বতলের ভেট্টার সমীকরণ :  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \vec{t} = 0$  .....(v)

(কারণ  $\vec{R} - \vec{r}$  ভেট্টারটি অভিলম্ব তলে অবস্থিত)

যখন  $\vec{R} = \text{অভিলম্ব তলের উপর যে কোনো বিন্দুর স্থান ভেট্টার} = X \vec{i} + Y \vec{j} + Z \vec{k}$

$$\text{এবং } \vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

অভিলম্ব তলের কার্তিয় স্থানাংক অনুযায়ী সমীকরণ

$$(X - x) \frac{dx}{ds} + (Y - y) \frac{dy}{ds} + (Z - z) \frac{dz}{ds} = 0$$

উদাহরণ :  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$ ,  $z = t$  বক্ররেখার উপর  $(1,0,0)$

বিন্দুতে অভিলম্ব তলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

$$\text{എখানে } \vec{r} = \cos t \hat{i} + \sin t \hat{j} + t \hat{k}; x = 1, y = 0, z = 0 \text{ (t = 0)}$$

এবং  $\ddot{t} = \frac{d\ddot{r}}{dt} / \frac{ds}{dt}$ । সুতরাং অভিজ্ঞ তলের সমীকরণ লেখা যায়

$$(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = 0$$

$$\text{तो } \{(X\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}) - (\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k})\} \cdot (\vec{j} + \vec{k}) = 0$$

$$\left[ \therefore \left( \frac{dr}{dt} \right)_{t=0} = -\sin 0\vec{i} + \cos 0\vec{j} + \vec{k} = \vec{j} + \vec{k} \right]$$

$$\text{Ans} \cdot \{(X-1)\vec{i} + Y\vec{j} + Z\vec{k}\} \cdot (\vec{j} + \vec{k}) = 0$$

$$\text{B} \quad (X-1).0 + Y.1 + Z.1 = 0$$

$$X - Y + Z = 0$$

B: মুখ্য বা প্রধান অভিলম্ব (Principal normal)

এই P বিন্দুগামী যে কোনো সরলরেখা অভিন্নতলে অবস্থিত হলে তা  $\vec{r}$  এর উপর তথা বক্ররেখার উপর P বিন্দুতে লম্ব। আবার  $\vec{t}$  একটি ধ্রুবক মান বিশিষ্ট ডেক্সের বাসে  $\frac{d\vec{t}}{ds}$  ডেক্সেরটি  $\vec{t}$  এর উপর সম্ভ তথা বক্ররেখার উপর P বিন্দুতে লম্ব।

P ବିନ୍ଦୁତେ  $\frac{d\vec{t}}{ds}$  ଏର ଦିକ୍ ବରାବର ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖାକେ ମୁୟ ଅଭିଲଶ (Principal normal) ବଲା ହୁଏ । ମୁୟ

অভিনন্দন বরাবর একক ভেট্টার ন হলো

$$\frac{d\bar{t}}{ds} = \kappa \bar{n} \dots \dots \dots \text{(vi) এইভাবে লেখা হয়।}$$

এখানে  $k$  ( $\geq 0$ ) ক্ষেত্রে রাশিটিকে  $P$  বিস্তৃত বক্রতা (Curvature) এবং  $\vec{n}$  ভেক্টরটিকে  $P$  বিস্তৃত একক মুখ্য অভিলম্ব বা প্রধান অভিলম্ব বলে।

P ବିନ୍ଦୁତେ ଯୁଧ୍ୟ ଅଭିନଷ୍ଟର ଭେଟ୍ଟର ସମୀକରଣ  $\vec{R} = \vec{r} + \lambda \vec{n}$


$$\text{iii) } (\vec{R} - \vec{r}) \times \vec{n} = \vec{0}, \dots \dots \dots \text{(vii)}$$

যেখানে  $R =$  মুখ্য অভিজ্ঞারের উপর যে কোনো একটি বিশ্বুর অবস্থান ভেষ্টির এবং  $r$  ও  $\pi$  সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।

$k \neq 0$  হলে  $\rho = \frac{1}{k}$ -কে বক্রের P বিন্দুতে বক্রতা ব্যাসার্ধ (radius of curvature) বলে।

### C. দ্বিতীয় অভিলম্ব (Binormal) :

যদি এমন একটি একক ভেস্টের ট্রি এর অবতারণা করা যায় যাতে  $\bar{t} \times \bar{n} = \bar{b}$  সম্পর্কটি সিদ্ধ হয় এবং



চিত্র 6.3

$\bar{t}, \bar{n}, \bar{b}$  ভেস্টের তিনটি পরস্পরের সাথে লম্ব দক্ষিণ-হাতের তত্ত্ব (Right-handed system) অনুযায়ী গঠিত হয় তাহলে P থেকে ট্রি-এর দিক বরাবর সরলারেখাকে দ্বিতীয় অভিলম্ব (binormal) এবং ট্রি একক ভেস্টেরটিকে একক দ্বিতীয় অভিলম্ব (Unit binormal) বলে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন  $\bar{t}, \bar{n}, \bar{b}$  দক্ষিণ-হাতের তত্ত্ব অনুযায়ী গঠিত বলে  $\bar{t} \times \bar{n} = \bar{b}$ ,  $\bar{n} \times \bar{b} = \bar{t}$  এবং  $\bar{b} \times \bar{t} = \bar{n}$ .....(viii)

যেহেতু ট্রি একটি একক ভেস্টের,  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  এর মান শূন্য না হলে তা  $\bar{b}$  এর সাথে লম্ব হবে।

এখন  $\ddot{t} = \bar{t} \times \bar{n}$  সম্পর্কটিকে s-এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{b}}{ds} &= \frac{d\bar{t}}{ds} \times \bar{n} + \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} = k\bar{n} \times \bar{n} + \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} & \left[ \because \frac{d\bar{t}}{ds} = k\bar{n} \right] \\ &= \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} & [\because \bar{n} \times \bar{n} = 0] \end{aligned}$$

অতএব  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  ভেস্টেরটি  $\bar{t}$  এর সাথেও লম্ব। কিন্তু আগে দেখান হয়েছে যে  $\frac{d\bar{b}}{ds}$ ,  $\bar{b}$  এর সাথে লম্ব।


সুতরাং  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  ভেস্টেরটি  $\bar{n}$  এর সমান্তরাল এবং তাই লেখা হয়

$$\frac{d\bar{b}}{ds} = -\tau\bar{t} \quad \dots \dots \dots \text{(ix)}$$

$k \neq 0$  হলে  $\rho = \frac{1}{k}$ -কে বক্রের P-বিন্দুতে বক্রতা ব্যাসার্ধ (radius of curvature) বলে।

### C. দ্বিতীয় অভিলম্ব (Binormal) :

যদি এমন একটি একক ভেস্টের  $\bar{b}$  এর অবতারণা করা যায় যাতে  $\bar{t} \times \bar{n} = \bar{b}$  সম্পর্কটি সিদ্ধ হয় এবং



চিত্র 6.3

$\bar{t}, \bar{n}, \bar{b}$  ভেস্টের তিনটি পরম্পরের সাথে লম্ব দক্ষিণ-হস্তের তন্ত্র (Right-handed system) অনুযায়ী গঠিত হয় তাহলে P থেকে  $\bar{b}$ -এর দিক বরাবর সরলরেখাকে দ্বিতীয় অভিলম্ব (binormal) এবং  $\bar{b}$  একক ভেস্টেরটিকে একক দ্বিতীয় অভিলম্ব (Unit binormal) বলে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন  $\bar{t}, \bar{n}, \bar{b}$  দক্ষিণহস্তের তন্ত্র অনুযায়ী গঠিত বলে  $\bar{t} \times \bar{n} = \bar{b}$ ,  $\bar{n} \times \bar{b} = \bar{t}$  এবং  $\bar{b} \times \bar{t} = \bar{n}$ .....(viii)

যেহেতু  $\bar{b}$  একটি একক ভেস্টের,  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  এর মান শূন্য না হলে তা  $\bar{b}$  এর সাথে লম্ব হবে।

এখন  $\bar{b} = \bar{t} \times \bar{n}$  সম্পর্কটিকে s-এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{b}}{ds} &= \frac{d\bar{t}}{ds} \times \bar{n} + \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} = k\bar{n} \times \bar{n} + \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} & [\because \frac{d\bar{t}}{ds} = k\bar{n}] \\ &= \bar{t} \times \frac{d\bar{n}}{ds} & [\because \bar{n} \times \bar{n} = 0] \end{aligned}$$

অতএব  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  ভেস্টেরটি  $\bar{t}$  এর সাথেও লম্ব। কিন্তু আগে দেখান হয়েছে যে  $\frac{d\bar{b}}{ds}$ ,  $\bar{b}$  এর সাথে লম্ব।

সুতরাং  $\frac{d\bar{b}}{ds}$  ভেস্টেরটি  $\bar{n}$  এর সমান্তরাল এবং তাই জেখা হয়

$$\frac{d\bar{b}}{ds} = -\tau\bar{n} .....(ix)$$

সমাধান : এখানে  $\vec{r} = 2 \cos t \vec{i} + 2 \sin t \vec{j} + t \vec{k}$

$$\therefore \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = -2 \sin t \vec{i} + 2 \cos t \vec{j} + \vec{k}$$

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + 1^2} = 3 = s$$

$$\therefore \vec{t} = \frac{\dot{\vec{r}}}{s} = -\frac{2}{3} \sin t \vec{i} + \frac{2}{3} \cos t \vec{j} + \frac{1}{3} \vec{k}$$

$$\kappa \vec{n} = \frac{d\vec{t}}{ds} = \frac{d\vec{t}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \left( -\frac{2}{3} \cos t \vec{i} - \frac{2}{3} \sin t \vec{j} + 0 \vec{k} \right) \cdot \frac{1}{s}$$

$$= -\frac{2}{9} \cos t \vec{i} - \frac{2}{9} \sin t \vec{j} \quad [\because s=3]$$

$$\therefore \kappa = \left| \frac{d\vec{t}}{ds} \right| = \sqrt{\left( -\frac{2}{9} \cos t \right)^2 + \left( \frac{2}{9} \sin t \right)^2} = \frac{2}{9} \Rightarrow \rho = \frac{1}{\kappa} = \frac{9}{2}$$

$$\text{আবার, } \vec{n} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\vec{t}}{ds} = \frac{9}{2} \left( -\frac{2}{9} \cos t \vec{i} - \frac{2}{9} \sin t \vec{j} \right)$$

$$= -(\cos t \vec{i} + \sin t \vec{j})$$

$$\vec{b} = \vec{t} \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\frac{2}{3} \sin t & \frac{2}{3} \cos t & \frac{1}{3} \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \sin t \vec{i} - \frac{1}{3} \cos t \vec{j} + \frac{2}{3} \vec{k}$$

$$\text{সরশোরে, } -\tau \vec{n} = \frac{d\vec{b}}{dt} / \left| \frac{d\vec{s}}{dt} \right| = \left( \frac{1}{3} \cos t \vec{i} + \frac{1}{3} \sin t \vec{j} + 0 \vec{k} \right) / \sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{9} \cos t \vec{i} + \frac{1}{9} \sin t \vec{j}$$

$$\therefore (-\tau) (-\cos t \vec{i} - \sin t \vec{j}) = \frac{1}{9} \cos t \vec{i} + \frac{1}{9} \sin t \vec{j}$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{1}{9} \quad \therefore \sigma = \frac{1}{\tau} = 9.$$

### অনুশীলনী-2

1. যদি  $\vec{r} = x^3yz\vec{i} + xy^2z\vec{j} + xyz^2\vec{k}$  হয় তবে (1,1,2) বিশুল্টে  $\frac{\partial \vec{r}}{\partial x}, \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial x^2}, \frac{\partial z \vec{r}}{\partial y \partial x}$  এবং

$\frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial y}$ , এর মান নির্ণয় করুন।

2.  $x = 2t, y = t^2, z = \frac{1}{3}t^3$  বক্সের (twisted cubic)  $t = 1$ -তে  $\vec{r}, \vec{n}, \vec{b}, k, \tau$  নির্ণয় করুন।

উত্তর : 1.  $4\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}, + 4\vec{i}, 4\vec{i}, 4\vec{j} + 4\vec{k}, -8\vec{i} - 8\vec{j} + 12\vec{k}$

2.  $\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}, \frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}, \frac{1}{3}\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}$

## 6.10. সারাংশ

(i) কোনো বক্সেরখার ভেট্টার সমীকরণ  $\vec{r} = \vec{f}(s)$ , যেখানে  $s$  হল ঐ রেখার উপর কোন নির্দিষ্ট বিশু থেকে রেখা বরাবর অন্য কোন বিশু  $p$  এর দূরত্ব। কখনও  $s$  ক্ষেত্রে চেরাশির পরিবর্তে অন্য প্রচল (Parameter)  $t$  -ও ব্যবহৃত হয়।

(ii) লিমিট : পূর্বনির্ধারিত যে কোন ধনাখাক সংখ্যা  $\epsilon$ -এর জন্য যদি  $\epsilon$ -এর উপর নির্ভরশীল আর একটি ধনাখাক সংখ্যা  $\delta$  পাওয়া যায় যাতে  $|\tilde{f}(t) - \tilde{t}| < \epsilon$  যখন  $|t - t_0| < \delta$  হয়, তবে  $\tilde{f}(t)$  ফাংশনটির সীমা হবে  $\tilde{t}$  এবং তখন লেখা হয়  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \tilde{t}$  এখানে  $t$  একটি ক্ষেত্রের চলরাশি।

$$(iii) \quad \tilde{f}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(t + \Delta t) - \tilde{f}(t)}{\Delta t}, \text{ এখানে } t \text{ একটি ক্ষেত্রের চলরাশি।}$$

$$(iv) \quad \tilde{f}(t) \text{ এর মান ক্রবক হলে } \tilde{f} \cdot \frac{d\tilde{f}}{dt} = 0$$

$$\tilde{f}(t) \text{ এর দিক ক্রবক হলে } \tilde{f} \times \frac{d\tilde{f}}{dt} = 0$$

$$(v) \quad \tilde{f}(x, y, z) \text{ হলে, আৎশিক অবকলজ } \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - \tilde{f}(x, y, z)}{\Delta x}$$

(vi)  $\tilde{r} = \tilde{f}(s)$  বক্ররেখার নির্দিষ্ট কোন বিন্দু থেকে যদি  $P$  বিন্দুর বক্ররেখা বরাবর দৈর্ঘ্য যদি  $s$  হয় তবে  $P$  বিন্দুতে  $s$  এর বার্ধিত দিক বরাবর একক স্পর্শক ভেস্টের

$$\tilde{t} = \frac{d\tilde{r}}{ds}$$

$$\text{একক মুখ্য অভিলম্ব } \tilde{n} = \frac{1}{k} \cdot \frac{d\tilde{t}}{ds}$$

$$\text{এবং একক বাইনরয়াল } \tilde{b} = \tilde{t} \times \tilde{n}$$

$$\frac{d\tilde{t}}{ds} = k\tilde{n}$$

$$\frac{d\tilde{b}}{ds} = -\tau\tilde{n}$$

$$\text{এখানে } k = \left| \frac{d\tilde{t}}{ds} \right| = \text{বক্রতা}, \quad \tau = \left| \frac{d\tilde{b}}{ds} \right| = \text{টরশন}$$

## 6.11. সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.(i)  $\vec{r}(t) = (2t^2 - 1)\vec{i} + (\log t + e^{2t})\vec{j} + \tan^{-1} t\vec{k}$

হলে  $\lim_{t \rightarrow 1} \vec{r}(t)$  -এর মান কত?

(ii)  $\vec{f}(t) = (1 - \cot \theta)\vec{i} + \log \sin \theta \vec{j} + \sin \theta \vec{k}$  এবং

$$\vec{g}(t) = (\cosec^2 \theta + 1)\vec{i} + (\cos \theta + 2)\vec{j} + (\sin^2 \theta + 1)\vec{k} \text{ হলে}$$

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \{\vec{f}(t) \times \vec{g}(t)\} -\text{এর মান নির্ণয় করুন।$$

(iii) যদি  $\phi(t) = \frac{e^{\sin t} - 1}{t}$  এবং  $\vec{f}(t) = \cos t\vec{i} + \sin t\vec{j} + 3\vec{k}$

হলে  $\lim_{t \rightarrow 0} \{\phi(t)\vec{f}(t)\}$  -এর মান কত?

2. (i) দেখান যে  $\vec{r}(t) = (5t^2 - 1)\vec{i} + (2t + 3)\vec{j} + 3t^2\vec{k}$  ভেট্টার ফাংশনটি  $t = 2$  বিন্দুতে সম্পত্তি।

$$[\text{সংকেত: দেখান যে } \lim_{t \rightarrow 2} \vec{r}(t) = \vec{r}(2)]$$

(ii) দেখান যে  $\vec{r}(\theta) = (2 \tan^2 \theta + 1)\vec{i} + (2 \sin^2 \theta + 1)\vec{j} + (2 \cos^2 \theta + 1)\vec{k}$  ভেট্টার ফাংশনটি

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ বিন্দুতে সম্পত্তি।}$$

3. (i)  $\vec{r} = 4 \sin^2 t\vec{i} + 4 \cos^2 t\vec{j} + 9 \cos 2t\vec{k}$  হলে

$$\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right|, \left[ \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right] \text{ এর মানগুলি নির্ণয় করুন।}$$

(ii)  $\frac{\vec{r} \times \vec{a}}{\vec{r} \cdot \vec{a}}$  ভেট্টার ফাংশনটির  $t$  ক্ষেত্রে চলারশির সাপেক্ষে অবকল নির্ণয় করুন, যেখানে  $\vec{r}$  ভেট্টারটি  $t$ -এর ফাংশন এবং  $\vec{a}$  ভেট্টারটি ছবক ভেট্টার।

(iii)  $r^2 \vec{r}$  ভেট্টার ফাংশনটির  $t$ -এর সাপেক্ষে অবকল নির্ণয় করুন যেখানে  $r = |\vec{r}|$

(iv) মান নির্ণয় করুন (a)  $\frac{d}{dt} \left[ \vec{r} \frac{d\vec{r}}{dr} \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right]$  (b)  $\frac{d^2}{dt^2} \left[ \vec{r} \frac{d\vec{r}}{dr} \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right]$

(c)  $\frac{d}{dt} \left\{ \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) \right\}$  (d)  $\frac{d^2}{dt^2} \left\{ \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) \right\}$

4. (i) যদি  $\vec{r} = x \sin y \vec{i} + y \sin x \vec{j} + (\sin x + \sin y) \vec{k}$  হয় তবে

$\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial x \partial y}$  এর মানগুলি নির্ণয় করুন এবং পরীক্ষা করে দেখুন

$$\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial x \partial y}$$

(ii)  $\vec{f}(x, y) = x^2 y^2 \vec{i} + x \log y \vec{j} + e^x y \vec{k}$  এবং

$$\vec{g}(x, y) = e^{xy} \vec{i} + x^3 y^2 \vec{j} + y \log x \vec{k} \text{ হলে } (1, 1) \text{ বিন্দুতে}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y \partial x} (\vec{f} \times \vec{g}) \text{ এর মান নির্ণয় করুন।}$$

(iii) যদি  $\vec{f} = x^2 y \vec{i} + y^2 z \vec{j} + z^2 x \vec{k}$  এবং  $\vec{g} = x^2 y z \vec{i} + x y^2 z \vec{j} + x y z^2 \vec{k}$  হলে  $(4, -2, 1)$  বিন্দুতে

$$\frac{\partial^2 \vec{f}}{\partial y^2} \times \frac{\partial^2 \vec{g}}{\partial x^2} \text{ এর মান কত?}$$

5. একটি বস্তুকণ্যা  $x = t^3, y = 2t^2 + 1, z = 3t - 2$  বজ্র বরাবর গতিশীল, যেখানে  $t$  ক্ষেপার চলরাশিট সময়কে সূচিত করে।  $t = 4$ -তে  $2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$  ভেক্টরের দিক বরাবর বস্তুকণ্যাটির বেগ ও ত্বরণ কত?

6. (i) প্রমাণ করুন যে  $\vec{r} = e^{at} (\vec{A} \cos bt + \vec{B} \sin bt)$ , (যেখানে  $\vec{A}, \vec{B}$  ফ্রেক ভেক্টর এবং  $a$  ক্ষেপার চলরাশি) ভেক্টর ফাংশনটি  $\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} - 2a \frac{d\vec{r}}{dt} + (a^2 + b^2) \vec{r} = \vec{0}$  সমীকরণকে সিদ্ধ করে।

(ii) প্রমাণ করুন যে  $\vec{r} = e^{-kx} (\vec{A} \sin ky + \vec{B} \cos ky)$ , (যেখানে  $\vec{A}, \vec{B}$  ফ্রেক ভেক্টর এবং  $k$  ক্ষেপার ফ্রেক) ভেক্টর ফাংশনটি  $\frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial y^2} = \vec{0}$  সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে।

7. (i)  $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, at \cot \beta)$  বজ্রের যে কোন বিন্দু  $t$ -তে  $\vec{r}, \vec{n}, \vec{b}, \vec{p}$  এবং  $\tau$  এর মান নির্ণয় করুন। (বজ্রটির নাম কৃত্তাকর হেলিক্স এখানে  $a$  এবং  $\beta$  ফ্রেক)।

(ii)  $\vec{r} = a(3t - t^3, 3t^3, 3t^2, 3t + t^3)$  (এখানে  $a$  ধ্রুবক) বর্তের যে কোনো বিলুপ্তে  $\vec{i}, \vec{n}, \vec{b}$ ,  
বক্রতা ব্যাসার্ক এবং টরশনের ব্যাসার্ক নির্ণয় করুন।

8. প্রমাণ করুন যে  $\frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \times \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} = \frac{\tau}{\rho^2}$

[ সংকেত :  $\frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{i}, \frac{d\vec{r}}{ds^2} = \frac{d\vec{i}}{ds} = k\vec{n}, \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} = \frac{d}{ds}(k\vec{n}) = k \frac{d\vec{n}}{ds} + \frac{dk}{ds}\vec{n}$   
 $= k(\tau\vec{b} - k\vec{i}) + \frac{dk}{ds}\vec{n}$

এখন বামপক্ষ  $= \vec{i} \cdot k\vec{n} \times \left( k\tau\vec{b} - k^2\vec{i} + \frac{dk}{ds}\vec{n} \right) = \vec{i} \cdot (k^2\tau\vec{i} + k^3\vec{b}) = k^2\tau = \frac{\tau}{\rho^2}$  ]

## 6.12 উত্তরমালা (সংকেতসহ)

1. (i)  $\vec{i} + e^t\vec{j} + \frac{\pi}{4}\vec{k}$  (ii)  $2(-\vec{i} + \vec{k})$  [ সংকেত 6.4.1 অনুচ্ছেদের B (iii) -এর সূত্র অনুযায়ী]

(iii) সংকেত:  $\lim_{t \rightarrow 0} \phi(t) = \lim_{t \rightarrow 0} e^{\sin t} \frac{-1}{\sin t} \cdot \frac{\sin t}{t} = 1 \cdot 1 = 1,$

এবং  $\lim_{t \rightarrow 0} \vec{f}(t) = \lim_{t \rightarrow 0} (\cos t\vec{i} + \sin t\vec{j} + 3\vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{k}$ , অতএব নির্ণেয় লিমিট

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \phi(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \vec{f}(t) = 1 \cdot (\vec{i} + 3\vec{k}) = \vec{i} + 3\vec{k}$$

3. (i)  $4\sin 2t\vec{i} - 4\sin 2t\vec{j} - 18\sin 2t\vec{k}, 4\cos 2t(2\vec{i} - 2\vec{j} - 9\vec{k})$

$756\sin 4t, 0, 0$  (ii) সংকেত:  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\vec{r} \times \vec{a}}{\vec{r} \cdot \vec{a}} \right) = \frac{1}{\vec{r} \cdot \vec{a}} \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{a}) + \left\{ \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\vec{r} \cdot \vec{a}} \right) \right\} \vec{r} \times \vec{a}$

[ এখানে  $\vec{r} \cdot \vec{a} =$  স্কেলার ]

$$= \frac{1}{\vec{r} \cdot \vec{a}} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{a} + \vec{r} \times \frac{d\vec{a}}{dt} \right) - \left\{ \frac{1}{(\vec{r} \cdot \vec{a})^2} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{a} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{a}}{dt} \right) \right\} \vec{r} \times \vec{a}$$

$$= \frac{1}{\vec{r} \cdot \vec{a}} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{a} \right) - \frac{1}{(\vec{r} \cdot \vec{a})^2} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{a} \right) \vec{r} \times \vec{a} \quad \left[ \because \frac{d\vec{a}}{dt} = 0 \right]$$

(iii) সংকেত:  $\frac{d}{dt} (r^5, \vec{r}) = \left( \frac{d}{dt} r^5 \right) \vec{r} + r^5 \frac{d}{dt} \vec{r} = \left( 5r^4 \frac{dr}{dt} \right) \vec{r} + r^5 \frac{d\vec{r}}{dt}$

(iv) (a)  $\left[ \vec{r} \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right] \quad (\text{সংকেত: ক্ষেত্রার ট্রিপ্ল প্রোডাস্ট-এর নিয়মানুসারে})$

(b)  $\left[ \vec{r} \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right] + \left[ \vec{r} \frac{d\vec{r}}{dt} \frac{d^4\vec{r}}{dt^4} \right] \quad (\text{c}) \quad \frac{d\vec{r}}{dt} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) + \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right)$

(d)  $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right) + 2 \frac{d\vec{r}}{dt} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right) + \vec{r} \times \left( \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \times \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right) + \vec{r} \times \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^4\vec{r}}{dt^4} \right)$

4. (i)  $\sin y \vec{i} + y \cos x \vec{j} + \cos x \vec{k}, \quad x \cos y \vec{i} + \sin x \vec{j} + \cos y \vec{k}; \quad -y \sin x \vec{j} - \sin x \vec{k},$

$-x \sin y \vec{i} - \sin y \vec{k}, \quad \cos y \vec{i} + \cos x \vec{j}, \quad \cos y \vec{i} + \cos x \vec{j}$

(ii)  $(1 - 12e) \vec{i} + (5e^2 - 4) \vec{j} + (25 - 2e) \vec{k} \quad (\text{iii}) 8 \vec{k}$

5.  $\frac{118}{3}, \frac{52}{3}$

7. (i)  $\vec{t} = \sin \beta (-\sin t, \cos t, \cot \beta), \quad \vec{n} = (-\cos t, -\sin t, 0)$

$$\vec{b} = \sin \beta (\sin t \cot \beta, -\cos t \cot \beta, 1), \rho = a \operatorname{cosec}^2 \beta, \tau = \frac{1}{2a} \sin 2\beta$$

(ii)  $\vec{t} = \frac{1}{1+t^2} \left\{ (1-t^2) \vec{i} + 2t \vec{j} + (1+t^2) \vec{k} \right\}, \quad \vec{n} = \frac{1}{1+t^2} \left\{ -2t \vec{i} + (1-t^2) \vec{j} \right\}$

$$\vec{b} = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^2)} \left\{ -(1-t^2) \vec{i} - 2t \vec{j} + (1+t^2) \vec{k} \right\}, \quad \rho = 3a(1+t^2)^2 = \sigma$$

# একক 7 □ ভেস্ট্রের সমাকলন (Vector Integration)

---

গঠন

- 7.1 প্রস্তাবনা
- 7.2 উদ্দেশ্য
- 7.3 ক্ষেত্রের চলরাশির সাপেক্ষে ভেস্ট্রের সমাকলন
- 7.4 আদর্শ সূত্রাবলী
  - 7.4.1 ভেস্ট্র অবকল সমীকরণ

অনুশীলনী - 1
- 7.5 রেখা সমাকলন
  - 7.5.1 অন্য প্রকারের রেখা সমাকল

অনুশীলনী - 2
- 7.6 তল সমাকলন
  - 7.6.1 অন্য প্রকারের তল সমাকল
- 7.7 আয়তন সমাকলন

অনুশীলনী - 3
- 7.8 সারাংশ
- 7.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
- 7.10 উত্তরমালা (সংকেত সহ)

---

## 7.1 প্রস্তাবনা

একটি বল ভেস্ট্রের দ্বারা কৃতকার্য, কোনো তলের মধ্য দিয়ে একটি ভেস্ট্রের বহিঃমুখী প্রবাহের (Out flow or flux) হার ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য ভেস্ট্রের সমাকলনের প্রয়োজন। এছাড়াও ফলিত গণিতের বিভিন্ন শাখায় সমাকলনের প্রয়োগ আছে।

ক্ষেত্রের ফাংশনের ক্ষেত্রে ঠিক যেভাবে অন্তরকলনবিদ্যার (Differential Calculus) পাশাপাশি সমাকলন বিদ্যার (Integral Calculus) আলোচনা হয়ে থাকে ভেস্ট্রের ফাংশনের ক্ষেত্রেও ভেস্ট্রের অবকলনের সাথে সমান্তরালভাবে ভেস্ট্রের সমাকলন তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আলোচিত হয়।

এখনে প্রাথমিক কিছু আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

## 7.2 উদ্দেশ্য

এই এককে ভেষ্টিরের সমাকলন বিষয়টি মোটামুটি চারটি ভাগে আলোচনা করা হবে। ভাগগুলি হল

- (a) ক্ষেত্র চলরাশির সাপেক্ষে ভেষ্টির ফাংশনের সমাকলন
- (b) রেখা সমাকলন (line integration)
- (c) তল সমাকলন (Surface integration) এবং
- (d) আয়তন সমাকলন (Volume integration)

এককাটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন —

- ভেষ্টির ফাংশনের অনিদিষ্ট সমাকলন কী
- রেখা সমাকলনের সংজ্ঞা এবং রেখা সমাকলনের পদ্ধতি
- তল সমাকলন ও সমাকলন
- আয়তন সমাকলন ও সমাকলন

## 7.3 ক্ষেত্র চলরাশির সাপেক্ষে ভেষ্টিরের সমাকলন

সংজ্ঞা 1 : যদি  $\bar{f}(t)$  এবং  $\bar{F}(t)$  ভেষ্টির ফাংশন দুটি এমনভাবে সম্পর্কিত যাহাতে  $\frac{d}{dt} \bar{F}(t) = \bar{f}(t)$  হয়,

যেখানে  $t$  একটি ক্ষেত্র চলরাশি,

তাহলে,

$$\int \bar{f}(t) dt = \int \frac{d}{dt} \bar{F}(t) dt = \bar{F}(t) + C \text{ হয়}$$

প্রসঙ্গত বলা যায় এখনে  $C$  একটি যে কোনো ফ্রেক ভেষ্টির এই  $\bar{F}(t) + C$  ভেষ্টিরটিকে  $\bar{f}(t)$  ফাংশনের অনিদিষ্ট সমাকলন (Indefinite integral) বলে। [এখনে  $\bar{f}(t)$  এর সমাকলনকে  $\int \bar{f}(t) dt$  লেখা হয়েছে ]

সংজ্ঞা 2 : মনে করি  $\bar{f}(t), t$ -এর  $[a,b]$  অন্তরালে সন্তুত ও সসীম।  $[a,b]$  অন্তরালে  $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$  বিন্দুগুলি দ্বারা  $n$  অংশে ভাগ করা হল এবং —

$$S = \bar{f}(\xi_1)(t_1 - t_0) + \bar{f}(\xi_2)(t_2 - t_1) + \dots + \bar{f}(\xi_n)(t_n - t_{n-1}) \text{ যোগফলটি নির্ণয় করা হল।}$$

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  বিন্দুগুলি যথাক্রমে  $[t_0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, t_n]$  অন্তরালের যে কোনো বিন্দু।

এখন  $n \rightarrow \infty$  করে বিভাজন সংখ্যা বাড়ান হল যাতে প্রতিটি  $[\xi_i - \xi_{i-1}]$  অন্তরালের দৈর্ঘ্য খুব ছোট হতে থাকে এবং এই অবস্থায়  $S$  এর লিমিট নেওয়া হল। অর্থাৎ  $\lim_{n \rightarrow \infty} S$  নেওয়া হল। এই লিমিটের অস্তিত্ব থাকলে  $\lim_{n \rightarrow \infty} S$  কে বলা হয়  $t = a$  থেকে  $t = b$  অব্দি  $f(t)$  এর নির্দিষ্ট সমাকল বা সীমিত সমাকল। (Definite Integral)। এই সমাকলকে  $\int_a^b f(t) dt$  এইভাবে লেখা হয়।

দ্রষ্টব্য : সীমিত সমাকলের স্বাধীন সংজ্ঞা বিশদভাবে এখান দেওয়া হল না। কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে  $a \leq t \leq b$  হলে  $\int_a^b \bar{f}(t) dt$  সীমিত সমাকলের সংজ্ঞা আছে, দেখানো যায় কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে

$$\int_a^b \bar{f}(t) dt = \phi(b) - \phi(a) \quad \text{যখন } \bar{f}(t) \text{ হল } f(t) \text{ এর অনিন্দিষ্ট সমাকল।}$$

## 7.4 আদর্শ সূত্রাবলী (Standard formulae)

নিম্নে কতিপয় আদর্শ সূত্র লিপিবদ্ধ করা হল যেগুলি মূলত সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। সূত্রে ব্যবহৃত ডেষ্টের ফাংশন দুটি  $\bar{f}(t)$  এবং  $\bar{F}(t)$ , যেখানে  $t$  একটি ক্ষেত্রের চলরাশি।

$$(i) \int \left( \bar{f} \cdot \frac{d\bar{F}}{dt} + \bar{F} \cdot \frac{d\bar{f}}{dt} \right) dt = \bar{f} \cdot \bar{F} + A, \quad \text{যেখানে } A \text{ একটি প্রবক্তৃত ক্ষেত্রের রাশি।}$$

$$\left[ \because \frac{d}{dt} (\bar{f} \cdot \bar{F}) = \bar{f} \cdot \frac{d\bar{F}}{dt} + \bar{F} \cdot \frac{d\bar{f}}{dt} \right]$$

$$(ii) (ক) \int 2\bar{f} \cdot \frac{d\bar{f}}{dt} dt = \bar{f} \cdot \bar{f} + A = |\bar{f}|^2 + A \quad A \text{ একটি প্রবক্তৃত ক্ষেত্রের রাশি।}$$

$$(খ) \int 2 \frac{d\bar{f}}{dt} \cdot \frac{d^2\bar{f}}{dt^2} dt = \left( \left| \frac{d\bar{f}}{dt} \right| \right)^2 + A$$

$$(iii) \int \vec{f} \times \frac{d^2 \vec{f}}{dt^2} dt = \vec{f} \times \frac{d\vec{f}}{dt} + \vec{c}, \quad \text{এখানে } \vec{c} \text{ একটি ফ্রিবক ভেস্টর।}$$

$$\left[ \because \frac{d}{dt} \left( \vec{f} \times \frac{d\vec{f}}{dt} \right) = \vec{f} \times \frac{d^2 \vec{f}}{dt^2} + \frac{d\vec{f}}{dt} \times \frac{d\vec{f}}{dt} = \vec{f} \times \frac{d^2 \vec{f}}{dt^2} \right]$$

$$(iv) \int \left( \frac{1}{|\vec{f}|} \frac{d\vec{f}}{dt} - \frac{d|\vec{f}|}{dt} \frac{\vec{f}}{|\vec{f}|^2} \right) dt = \frac{\vec{f}}{|\vec{f}|} + \vec{c}$$

$$\left[ \because \frac{d}{dt} \frac{\vec{f}}{|\vec{f}|} = \frac{1}{|\vec{f}|} \cdot \frac{d\vec{f}}{dt} - \frac{1}{|\vec{f}|^2} \cdot \frac{d|\vec{f}|}{dt} \vec{f} \right]$$

(vi) যদি  $\vec{a}$  একটি ফ্রিবক ভেস্টর হয় তবে

$$\int \vec{a} \times \frac{d\vec{f}}{dt} dt = \vec{a} \times \vec{f} + \vec{c}$$

(vi) যদি  $\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$  হয় তবে [এখানে  $f_1, f_2, f_3$  প্রত্যেকেই  $t$ -এর ক্ষেপার ফাংশন এবং  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  লম্ব কার্ডিয় অক্ষ বরাবর একক ভেস্টর সমূহ।]

$$\int \vec{f}(t) dt = \left\{ \int f_1(t) dt \right\} \vec{i} + \left\{ \int f_2(t) dt \right\} \vec{j} + \left\{ \int f_3(t) dt \right\} \vec{k} + \vec{c}$$

**জটিল্য:** উপরোক্ত সূত্র সমূহে সমাকলনের ফ্রিবকগুলি কখনও ক্ষেপার এবং কখনও ভেস্টর রাশি হয়। কোনো ক্ষেত্রে কেমন ফ্রিবক হবে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

### 7.4.1 ভেস্টর অবকল সমীকরণ

কোন ভেস্টর সমীকরণে যদি ভেস্টরের অবকলজ থাকে তবে তাকে ভেস্টর অবকল সমীকরণ বলে যেমন

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + n^2 \vec{r} = 0$$

এখানে  $\vec{r}(t)$  হল ভেস্টর ফাংশন, ক্ষেপার ক্যালকুলাসের মতো ভেস্টর কলনবিদ্যাতেও, অবকল সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করা হয়। এখানে বিশদ আলোচনা করা হল না। উদাহরণও অনুসরণ করলে অবকল সমীকরণের ধারণা পাবেন।

উদাহরণ 1. যদি  $\vec{f}(t) = \sin t\vec{i} + \cos t\vec{j} + t\vec{k}$  হয় তবে

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\vec{f}}{dt} \cdot \frac{d^2\vec{f}}{dt^2} dt - এর মান নির্ণয় করুন।$$

সমাধান : স্থানস্থারে  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \frac{d\vec{f}}{dt} \cdot \frac{d^2\vec{f}}{dt^2} dt = \left[ \left( \left| \frac{d\vec{f}}{dt} \right| \right)^2 + A \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$

$$= \left[ (\cos t\vec{i} - \sin t\vec{j} + \vec{k})^2 + A \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left[ (\cos^2 t + \sin^2 t + 1) + A \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= [2 + A]_0^{\frac{\pi}{2}} = (2 + A) - (2 + A) = 0$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\vec{f}}{dt} \cdot \frac{d^2\vec{f}}{dt^2} dt = 0$$

2. সময়  $t = 0$  তে কোনো চলমান বিদ্যুর অবস্থান ভেক্টর  $\vec{r} = \vec{0}$  এবং  $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{u}$  হলে

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{a} \quad (\vec{a} \text{ শুরুক ভেক্টর})$$

সমীকরণটি সমাধান করুন।

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ  $\frac{d}{dt} \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \vec{a}$

$$\therefore \int d \left( \frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \int \vec{a} dt + \vec{c} \quad [\text{সমাকলন করে}]$$

$$\text{বা } \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{a}t + \vec{c}$$

বা প্রাথমিক শর্তানুযায়ী,  $\vec{u} = \vec{a} \cdot 0 + \vec{c} \Rightarrow \vec{c} = \vec{u}$

$$\therefore \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{a}t + \vec{u}$$

$$\therefore \int d\vec{r} = \int \vec{a}tdt + \int \vec{u}dt + \vec{D} \quad [ \text{সমাকলন করে } ]$$

$$\text{বা } \vec{r} = \vec{a} \frac{t^2}{2} + \vec{u}t + \vec{D}$$

আবার  $\vec{r} = \vec{0}$ , যখন  $t = 0 \Rightarrow \vec{0} = \vec{D}$

$$\therefore \vec{r} = \vec{u}t + \vec{a} \frac{t^2}{2}$$

$$3. \vec{f}(t) = 5t^2\vec{i} + 2t\vec{j} + (3t^2 - 1)\vec{k} \quad \text{হলে (i) } \int \vec{f}(t)dt \text{ এবং}$$

$$(ii) \int_1^2 \vec{f}(t)dt \text{-এর মান নির্ণয় করুন।}$$

$$\text{সমাধান : (i) } \int \vec{f}(t)dt = \int \{5t^2\vec{i} + 2t\vec{j} + (3t^2 - 1)\vec{k}\}dt = 5\frac{t^3}{3}\vec{i} + 2\frac{t^2}{2}\vec{j} + \left(3\frac{t^3}{3} - t\right)\vec{k} + \vec{c}$$

$$(ii) \int_1^2 \vec{f}(t)dt = \left[ 5\frac{t^3}{3}\vec{i} + t^2\vec{j} + (t^3 - t)\vec{k} \right]_1^2 = \left( \frac{40}{3}\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k} \right) - \left( \frac{5}{3}\vec{i} + \vec{j} + 0\vec{k} \right)$$

$$= \frac{35}{3}\vec{i} + 3\vec{j} + 6\vec{k}$$

## অনুশীলনী - 1

1. যদি  $\vec{f}(t) = 5t^4\vec{i} + (3t^2 + 2t)\vec{j} - 4t^3\vec{k}$  তাহলে

- (i)  $\int \vec{f}(t)dt$  এবং (ii)  $\int_1^3 \vec{f}(t)dt$ -এর মান নির্ণয় করুন।

[উত্তর (i)  $t^5\vec{i} + (t^3 + t^2)\vec{j} - t^4\vec{k}$  (ii)  $242\vec{i} + 34\vec{j} - 80\vec{k}$ ]

2. যদি  $\vec{f}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + (t^3 - 1)\vec{k}$  এবং  $\vec{F}(t) = t^2\vec{i} - t\vec{j} + 4\vec{k}$  হয়

তবে দেখান যে (i)  $\int_0^1 \vec{f} \cdot \vec{F} dt = -3$  (ii)  $\int_0^1 \vec{f} \times \vec{F} dt = \frac{31}{30}\vec{i} - \frac{13}{6}\vec{j} - \frac{8}{15}\vec{k}$

3. দেখান যে  $\int_1^2 \vec{f} \times \frac{d^2 \vec{f}}{dt^2} dt = 12\vec{i} + 32\vec{j} - 174\vec{k}$

যখন  $\vec{f}(t) = (t^3 + 1)\vec{i} + (2t + 3)\vec{j} + (t^2 - 1)\vec{k}$

4. যদি  $t$  সময়ে কোনো বস্তুকণার স্থান  $\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \sin t \vec{i} + 3 \cos t \vec{j} + 4 \sec^2 t \vec{k}$  হয় এবং  $t=0$  তে

বেগ  $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{0}$  এবং  $\vec{r} = \vec{0}$  তবে দেখান যে যে কোনো সময়  $t$ -তে

$$\vec{v} = 2(1 - \cos t)\vec{i} + 3 \sin t \vec{j} + 4 \tan t \vec{k} \text{ এবং স্থান } \vec{r} = 2(t - \sin t)\vec{i} + 3(1 - \cos t)\vec{j} + 4 \log \sec t \vec{k}$$

$$\text{সংকেত : } \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = 2 \sin t \vec{i} + 3 \cos t \vec{j} + 4 \sec^2 t \vec{k},$$

$$\text{সমাকলন করলে } \vec{v} = -2 \cos t \vec{i} + 3 \sin t \vec{j} + 4 \tan t \vec{k} + \vec{c}$$

## 7.5 রেখা সমাকলন

যদি কোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  এর  $x, y, z$  স্থানাঙ্কগুলি একটি ক্ষেত্রে চলায় তাহলি  $t$ -এর উপর নির্ভরশীল হয়। অর্থাৎ ঐ বিন্দুর স্থান ভেট্টের  $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$  হয় তখন  $\vec{r} = \vec{r}(t)$  দ্বারা একটি বক্ররেখা নির্মিত হয়। এখানে  $t$ -এর জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন মানের জন্যে বক্রের উপর বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান ভেট্টের পাওয়া যায়।


আমরা জানি  $\frac{d\vec{r}}{dt}$  হল বক্ররেখার উপর  $\vec{r}$  বিন্দুতে স্পর্শক ভেট্টের।  $t$ -এর জন্য নির্ধারিত এবং প্রয়োজনীয় অন্তরালে ( $t_1 \leq t \leq t_2$ ) সমস্ত বিন্দুতে যদি  $\vec{r}$  এবং  $\vec{r}$  এর প্রথম ত্রিমের অবকলজ সন্তুত হয় তবে  $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$  বক্ররেখার ঐ অংশকে (যে বিন্দুর স্থান ভেট্টের  $\vec{r}(t_1)$  স্থান থেকে যে বিন্দুর স্থান ভেট্টের  $\vec{r}(t_2)$  সেই বিন্দু পর্যন্ত) সূব্রহ্ম (smooth) বলা হয়। আমরা এই পর্যায়ে বক্ররেখা বলতে এই রূপম সূব্রহ্ম বক্ররেখার কথা অধ্যা কথনও করেক্তি সূব্রহ্ম বক্রাংশ পরপর যুক্ত করে যে বক্ররেখা তৈরি করা যায় তার কথা বুঝব।

ধরা যাক  $\vec{r} = \vec{r}(s)$  একটি সূব্রহ্ম বক্ররেখা। এখানে  $s$  হল ঐ বক্রের কোনো একটি বিন্দু  $L$  থেকে অন্য যে কোনো বিন্দু  $P$ -এর বক্ররেখা বরাবর দূরত্ব। আরও ধরা যাক  $s = s_1$ -এর জন্য রেখাটির উপর  $A$  বিন্দু এবং  $s = s_2$  এর জন্য  $B$  বিন্দুর স্থান ভেট্টের পাওয়া যায়। এখন যদি ঐ বক্ররেখার  $AB$  অংশকে  $C$  দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং যদি  $C$ -এর সমস্ত বিন্দুতে অন্য একটি ভেট্টের  $\vec{r}$  সংজ্ঞায়িত থাকে তবে  $C$ -এর যে কোন বিন্দুতে একক স্পর্শক  $\vec{t}$  বরাবর  $\vec{r}$  এর উপাংশ  $\vec{r}_C$  হয় এবং  $\vec{F}, \vec{r}$   $s$  এর ফাংশন থাকে। এখন  $s = s_1$ , থেকে  $s = s_2$  অব্দি  $\vec{F}, \vec{r}$  এর  $s$  এর সাপেক্ষ নির্দিষ্ট সমাকলকে  $\vec{r}_C$  ভেট্টের ফাংশনটির  $C$  এর উপর রেখা সমাকল বলে। এই রেখা সমাকলের  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s}$  লেখা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_C \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} ds$$

$$\left[ \because t = \frac{d\vec{r}}{ds} \right]$$

$$= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ হল, } C \text{-এর উপর } \vec{r} \text{-এর রেখা সমাকল বা স্পর্শক বরাবর রেখা সমাকল (Tangen-$$



চিত্র 7.1

যদি  $\vec{F}$  ভেস্টর ফাংশনটিকে কার্ডিয় স্থানাঙ্ক অনুযায়ী

$$\vec{F} = F_1(x, y, z)\vec{i} + F_2(x, y, z)\vec{j} + F_3(x, y, z)\vec{k}$$

এইভাবে সেখা হয় এবং  $\vec{r}(s) = x(s)\vec{i} + y(s)\vec{j} + z(s)\vec{k}$  হয়

$$\text{তবে } \int_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_c (F_1\vec{i} + F_2\vec{j} + F_3\vec{k}) \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$= \int_c (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz) = \int_{s_1}^{s_2} \left( F_1 \frac{dx}{ds} + F_2 \frac{dy}{ds} + F_3 \frac{dz}{ds} \right) ds$$

আবার যদি প্রচল  $s$ -এর পরিবর্তে  $t$  হয় তাহলে

$$\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \left( F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt$$

যেখানে  $t$ -এর মান  $t_1$  এবং  $t_2$ -র জন্য  $C$  এর প্রান্ত বিস্তৃতয়ের স্থান-ভেস্টর পাওয়া যায়।

**মন্তব্য :** যদি  $C$  একটি সরল বক্ররেখা (simple closed curve) হয় অর্থাৎ যদি বক্র বক্ররেখাটি নিজেকে নিজে ছেদ না করে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু  $A$  থেকে শুরু হয়ে আবার  $A$  তে শেষ হয় তখন সমাকলনটিকে সেখা হয়  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ । তখন উপরিউক্ত সমাকলনের প্রকাশ নিম্নরূপ হয় :

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz)$$

বক্ররেখার এই সমাকলনকে সারকুলেশন বলে।

**মন্তব্য :** যদি  $\vec{F}$  ভেস্টরটি বলকে নির্দেশ করে তাহলে  $\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}$  হল বক্রের উপর  $\vec{r}$  বিস্তৃতে স্পর্শক বরাবর বাসের উপাংশ এবং  $\left( F_1 \frac{dx}{ds} + F_2 \frac{dy}{ds} + F_3 \frac{dz}{ds} \right) ds = \vec{F} \cdot d\vec{r}$  হল বক্র বরাবর  $ds$  সরণের জন্য কৃতকার্য। অতএব  $C$  বরাবর মোট দৈর্ঘ্যই যদি সরণ হয় তবে মোট সাধিত কার্য =  $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ , এখানে অবশ্যই সরণের দিক বরাবর সমাকলন করতে হবে।

**উদাহরণ :** 1. যদি  $C$  বক্ররেখাটি  $xy$  তলে  $y = 4x^2$  হয় এবং

$\vec{F} = 2x^2\vec{i} + (3x^2 - y^2)\vec{j}$  হয় তবে রেখাটির  $(0,0)$  বিন্দু থেকে  $(1,4)$  পর্যন্ত অংশে  $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$  এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $y = 4x^2$ -এর প্রচল সমীকরণ  $x = t$ ,  $y = 4t^2$ , অতএব

$$\begin{aligned}\vec{F} \cdot d\vec{r} &= \{2t^2\vec{i} + (3t^2 - 16t^4)\vec{j}\} \cdot \{dt\vec{i} + 8t dt\vec{j}\} \\ &= 2t^2 dt + (3t^2 - 16t^4) \cdot 8t dt\end{aligned}$$

(0,0) ও (1,4) বিন্দুতে যথাক্রমে t-এর মান  $t = 0$  এবং  $t = 1$

$$\begin{aligned}\therefore \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \{2t^2 + 8t(3t^2 - 16t^4)\} dt \\ &= \left[ 2 \cdot \frac{t^3}{3} + 24 \cdot \frac{t^4}{4} - 128 \cdot \frac{t^6}{6} \right]_0^1 = \frac{2}{3} + 6 - \frac{64}{3} = -\frac{44}{3}\end{aligned}$$

2. যদি বল ভেষ্টির  $\vec{F} = (x+y)\vec{i} + (2y-x)\vec{j}$  হয় তাহলে  $y = 2x-4$  সরলরেখা বরাবর (2,0) থেকে (3,2) বিন্দু পর্যন্ত যেতে কৃতকার্য কত?

$$\begin{aligned}\text{সমাধান : সাধিত কার্য } &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy) \\ &= \int_{x=2}^3 [\{x + (2x-4)\}dx + \{2(2x-4) - x\}2dx] \quad [\because y = 2x-4 \text{ এবং} \\ &\qquad \qquad \qquad \frac{dy}{dx} = 2dx]\end{aligned}$$

$$= \int_2^3 (9x-20)dx = \left[ 9 \frac{x^2}{2} - 20x \right]_2^3 = \frac{5}{2}$$

3. যদি  $\vec{F} = (x^2 + 2y^2)\vec{i} + 5y^2\vec{z}\vec{j} - 6yz^2\vec{k}$  হয় তাহলে  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  এর মান (0,0,0) থেকে (1,1,1) পর্যন্ত বার করুন,

যথন (i)  $x = t$ ,  $y = t^2$ ,  $z = t^3$  হল বক্ররেখা C-এর সমীকরণ

(ii) C কয়েকটি সকলরেখাশের সমষ্টি : (0,0,0) থেকে (1,1,0) এবং তারপরে (1,1,0) থেকে (1,1,1)

সমাধান : (i)  $x = t$ ,  $y = t^2$ ,  $z = t^3$  বক্ররেখায় (0,0,0) ও (1,1,1) বিন্দুতে t-এর মান যথাক্রমে  $t = 0$ ,  $t = 1$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 \left[ (x^2 + 2y^2)dx + 5y^2zdy - 6yz^2dz \right] \\
 &= \int_{t=0}^1 \left[ (t^2 + 2t^4)dt + 5t^4 \cdot t^3 d(t^2) - 6t^2 \cdot t^6 d(t^3) \right] \\
 &= \int_0^1 (t^2 + 2t^4)dt + 5t^7 \cdot 2t dt - 6t^8 \cdot 3t^2 dt \\
 &= \int_0^1 (t^2 + 2t^4 + 10t^8 - 18t^{10})dt \\
 &= \left[ \frac{t^3}{3} + 2 \frac{t^5}{5} + 10 \frac{t^9}{9} - 18 \frac{t^{11}}{11} \right]_0^1 = \frac{103}{495}
 \end{aligned}$$

(ii)  $(0,0,0)$  ও  $(1,1,0)$  বিন্দুসময়গামী সরলরেখার সমীকরণ

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{1-0} = \frac{z-0}{0-0} = t \text{ (ধরি) অর্থাৎ } x = t, y = t, z = 0$$

$\therefore (0,0,0)$  থেকে  $(1,1,0)$  পর্যন্ত নির্ণয় সমাকলের অংশ

$$\begin{aligned}
 &= \int_{t=0}^1 \left[ (t^2 + 2t^4)dt + 5t^2 \cdot 0dt - 6 \cdot t \cdot 0 \cdot 0 \right], \quad [\because x = t, y = t, z = 0] \\
 &= \left[ 3 \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = 1
 \end{aligned}$$

আবার  $(1,1,0)$  ও  $(1,1,1)$  বিন্দুসময় সংযোগকারী সরলরেখার বিশেষত  $x=1, y=1$  এবং  $z$ -এর মান 0 থেকে 1 পর্যন্ত পরিবর্তনশীল। অতএব এই রেখাখণ্ডে নির্ণয় সমাকলের অংশ

$$\begin{aligned}
 &= \int_{z=0}^1 (1^2 + 2 \cdot 1^2)0 + 5 \cdot 1^2 \cdot z \cdot 0 - 6 \cdot 1 \cdot z^2 dz \quad [\because x = 1, y = 1 \text{ এবং } z \text{ পরিবর্তনশীল} \\
 &\quad dx=0, dy=0 \text{ ইত্যাদি}] \\
 &= - \int_0^1 6z^2 dz = - \left[ 6 \cdot \frac{z^3}{3} \right]_0^1 = -2
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমাকল} = 1 - 2 = -1$$

## 7.5.1 অন্যপ্রকারের রেখা সমাকল

(i)  $\int_c \vec{F} \times d\vec{r}$     (ii)  $\int_c \phi d\vec{r}$ , যেখানে  $\vec{F}$  এবং  $\phi$  উভয়ই সজ্ঞত কিন্তু  $\vec{F}$  ভেষ্টির ফাংশন এবং  $\phi$  হেলার ফাংশন।

$$(i) \text{আগের মতই } \int_c \vec{F} \times d\vec{r} = \int_c \vec{F} \times \frac{d\vec{r}}{ds} ds = \int_c \vec{F} \times \vec{t} ds$$

$$\text{আবার যদি } \vec{F} = F_1 \vec{i} + F_2 \vec{j} + F_3 \vec{k} \text{ এবং } \vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \text{হয় তখন } \int_c \vec{F} \times d\vec{r} &= \int_c (F_1 \vec{i} + F_2 \vec{j} + F_3 \vec{k}) \times (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= \vec{i} \int_c (F_2 dz - F_3 dy) + \vec{j} \int_c (F_3 dx - F_1 dz) \\ &\quad + \vec{k} \int_c (F_1 dy - F_2 dx) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (ii) \text{এখানে } \int_c \phi d\vec{r} &= \int_c \phi (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= i \int_c \phi dx + j \int_c \phi dy + k \int_c \phi dz \end{aligned}$$

**উদাহরণ :** 1. যদি  $\phi = xy + yz + zx$ ,  $\vec{F} = x \vec{i} + y^2 \vec{j} + z^2 \vec{x} \vec{k}$  এবং বক্র রেখাগুচ্ছ  $C: x=t^2, y=2t, z=t^3$  এর  $t=0$  থেকে  $t=1$  হয় তবে

$$(i) \int_c \phi d\vec{r} \text{ এবং } (ii) \int_c \vec{F} \times d\vec{r} \text{ এর মান নির্ণয় করুন।}$$

$$\text{সমাধান (i) } C \text{ বরাবর } \phi = xy + yz + zx = t^2 \cdot 2t + 2t \cdot t^3 + t^3 \cdot t^2 = 2t^3 + 2t^4 + t^5$$

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j} + t^3 \vec{k} \Rightarrow d\vec{r} = (2t \vec{i} + 2 \vec{j} + 3t^2 \vec{k}) dt$$

$$\therefore \int_c \phi d\vec{r} = \vec{i} \int_0^1 (2t^3 + 2t^4 + t^5) 2t dt + \vec{j} \int_0^1 (2t^3 + 2t^4 + t^5) 2 dt + \vec{k} \int_0^1 (2t^3 + 2t^4 + t^5) 3t^2 dt$$

$$= 2\vec{i} \left[ 2 \frac{t^5}{5} + 2 \cdot \frac{t^6}{6} + \frac{t^7}{7} \right]_0^1 + 2\vec{j} \left[ 2 \frac{t^4}{4} + 2 \frac{t^5}{5} + \frac{t^6}{6} \right]_0^1 + 3\vec{k} \left[ 2 \frac{t^6}{6} + 2 \frac{t^7}{7} + \frac{t^8}{8} \right]_0^1$$

$$= \frac{184}{105} \vec{i} + \frac{32}{45} \vec{j} + \frac{125}{56} \vec{k}$$

$$(ii) \text{ বরাবর } \vec{F} = t^4 \cdot 2t\vec{i} + 4t^2 \cdot t^3\vec{j} + t^6 \cdot t^2\vec{k} = 2t^5\vec{i} + 4t^5\vec{j} + t^8\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\therefore \vec{F} \times d\vec{r} &= (2t^5\vec{i} + 4t^5\vec{j} + t^8\vec{k}) \times (2t\vec{i} + 2\vec{j} + 3t^2\vec{k}) \\&= [(12t^7 - 2t^8)\vec{i} + (2t^9 - 6t^7)\vec{j} + (4t^5 - 8t^6)\vec{k}]dt \\ \therefore \int_c \vec{F} \times d\vec{r} &= \vec{i} \int_0^1 (12t^7 - 2t^8) dt + \vec{j} \int_0^1 (2t^9 - 6t^7) dt + \vec{k} \int_0^1 (4t^5 - 8t^6) dt \\&= 2\vec{i} \left[ 6 \cdot \frac{t^8}{8} - \frac{t^9}{9} \right]_0^1 + 2\vec{j} \left[ \frac{t^{10}}{10} - 3 \cdot \frac{t^8}{8} \right]_0^1 + 4\vec{k} \left[ \frac{t^6}{6} - 2 \cdot \frac{t^7}{7} \right]_0^1 \\&= \frac{23}{18}\vec{i} - \frac{11}{20}\vec{j} - \frac{10}{21}\vec{k}\end{aligned}$$

## অনুশীলনী - 2

1. যদি  $\vec{F} = xy\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j}$  হলে  $(0,0)$  থেকে  $(1,1)$  পর্যন্ত  $y = x^3$  বরাবর  $\vec{r}$  এর রেখা সমাকল নির্ণয় করুন।

সংকেত: এখানে  $x = t$ ,  $y = t^3$  অতএব  $dx = dt$ ,  $dy = 3t^2 dt$ ,  $\vec{F} = t^4\vec{i} + (t^2 + t^6)\vec{j}$

$$\therefore \int_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t=0}^1 \left\{ t^4 dt + (t^2 + t^6) 3t^2 dt \right\} = \left[ 4 \cdot \frac{t^5}{5} + 3 \cdot \frac{t^9}{9} \right]_0^1 = \frac{17}{15}$$

2. যদি  $\vec{F} = (x^2 + y)\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j}$  এবং  $y = x^2 + 1$  বক্ররেখা বরাবর  $(1,2)$  থেকে  $(2,5)$  বিশ্ব পর্যন্ত রেখাগংশ  $c$  হয় তাহলে  $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$  এর মান নির্ণয় করুন।

$$\begin{aligned}[\text{সংকেত: }] \int_c \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_c (x^2 + y) dx + (x^2 + y^2) dy = \int_{x=1}^2 \{x^2 + (x^2 + 1)\} dx \\&\quad + \int_{y=2}^5 \{(y-1) + y^2\} dy = \left[ 2 \frac{x^3}{3} + x \right]_1^2 + \left[ \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} - y \right]_2^5 = \frac{313}{6}\end{aligned}$$

3.  $\vec{F} = (2-x)\vec{i} - y\vec{j} + xyz\vec{k}$  এবং  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z=0$  বৃত্তি  $c$  হলে  $c$  এর বেটনীতে  $\vec{F}$  এর সারকুলেশন (Circulation) নির্ণয় করুন।

[ সংকেত: যৃত্যের সমীকরণ  $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 0 \Rightarrow dx = -2 \sin t dt, dy = 2 \cos t dt, dz = 0$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সারকুলেশন} = \oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t=0}^{2\pi} \left\{ (2 - 2 \cos t)(-2 \sin t dt) - 2 \sin t \cdot 2 \cos t dt + 2 \cos t \cdot 0 \cdot 0 \right\}$$


$$= \int_0^{2\pi} (-4 \sin t) dt$$

$$= +4 \times 0 = 0 ]$$

4.  $\vec{F} = (x^2 + y^2)\vec{i} - 2xy\vec{j}$  এবং  $xy$  তলে  $y = 0, x = a, y = b, x = 0$  সরলরেখাগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ  
আয়তক্ষেত্র  $C$  হলে  $\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$  এর মান কত?

[ সংকেত: এখানে  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}; z = 0$

$$\therefore \oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C \left\{ (x^2 + y^2)dx - 2xydy \right\}$$



চিত্র-7.2

এখন  $OP$  বরাবর  $y=0, dy=0$  এবং  $x$ -এর মান 0 থেকে  $a$  পর্যন্ত পরিবর্তনশীল

$PQ$  বরাবর  $x=a, dx=0$  এবং  $y$ -এর মান 0 থেকে  $b$  পর্যন্ত পরিবর্তনশীল

$QR$  বরাবর  $y=b, dy=0$  এবং  $x$ -এর মান  $a$  থেকে 0 পর্যন্ত পরিবর্তনশীল

$RO$  বরাবর  $x=0, dx=0$  এবং  $y$ -এর মান  $b$  থেকে 0 পর্যন্ত পরিবর্তনশীল

$$\text{অতএব, } \oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^a x^2 dx + \int_0^b (-2ay) dy + \int_a^0 (x^2 + b^2) dk + \int_b^0 0 dy$$

$$= -2ab^2 ]$$


## 7.6 তল সমাকলন

যদি একটি তল  $s$  এমন হয় যে ঐ তলের প্রত্যেক বিন্দুতে কেবলমাত্র একটি করে অভিলম্ব অঙ্কন করা যায় এবং ঐ অভিলম্বের দিক্ক সন্ততভাবে তলের বিন্দুগুলির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে ঐ তল  $s$  কে সূক্ষ্ম তল (Smooth Surface) বলা হয়।

সূক্ষ্ম নয় এমন কোনো তলকে যদি কতকগুলি সমীম সংখ্যক সূক্ষ্ম তলে বিভক্ত করা যায় তাহলে ঐ তলকে খণ্ডভাবে (piecewise) সূক্ষ্মতল বলে।

[ উদাহরণ : একটি গোলকের তল সূষ্ম এবং একটি আতঙ্কনের তল খণ্ডভাবে সূষ্ম।]

ধরা যাক সীম ক্ষেত্রফল যুক্ত একটি তল  $s$  এর উপর বিন্দুগুলিতে সংজ্ঞাত  $f(x, y, z)$  একটি একমান বিলিট (Single valued) ক্ষেত্রের ফাংশন। এই  $s$  তলকে  $n$  সংখাক খণ্ডে বিভক্ত করা হল যাদের ক্ষেত্রফল  $\Delta s_1, \Delta s_2, \Delta s_3, \dots, \Delta s_n$ । ধরা যাক এদের প্রত্যেক অংশ  $\Delta s_r$ -এ একটি করে ইচ্ছামত (arbitrary) বিন্দু  $p_r$  নেওয়া হল যার স্থানাঙ্ক  $(x_r, y_r, z_r)$ । এখন



চিত্র-7.3

$$\sum_{r=1}^n f(P_r) \Delta s_r, \text{ যেখানে } f(P_r) = f(x_r, y_r, z_r),$$

এই যোগফলটি গঠন করে এমনভাবে লিমিট নেওয়া হল যেন  $n \rightarrow \infty$  হলে উপরোক্ত ক্ষেত্রফল  $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$  গুলির মধ্যে বৃহত্তম ক্ষেত্রফলটি  $\rightarrow 0$  হয়।

যদি এই লিমিটের অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে

$$\iint_s f(x, y, z) ds$$

ধারা চিহ্নিত করা হয় এবং একে  $s$  তলের উপরে  $f$  এর তল সমাকল বলে।

সাধারণভাবে যদি  $s$  তলটি সূষ্ম বা খণ্ডভাবে সূষ্ম ও  $f(x, y, z)$  ফাংশনটি  $s$  তলে সন্তু হয় তাহলে উপরোক্ত লিমিটের অস্তিত্ব থাকে।

### অভিলম্ব তল সমাকল (Normal surface integral)

উপরের ক্ষেত্রের ফাংশন  $f(x, y, z)$ -এর পরিবর্তে যদি ডেক্সের ফাংশন  $\bar{F}(x, y, z)$  নেওয়া যায়, যেখানে  $\bar{F}(p_r) = \bar{F}(x_r, y_r, z_r)$  এবং  $\Delta s_r$ -এর উপর  $p_r$  বিন্দুতে ধনাত্মক দিকে অক্তিত একক অভিলম্ব যদি  $\bar{n}_r$  হয়, তাহলে

$$\sum_{r=1}^n \bar{F}(P_r) \cdot \bar{n}_r \Delta s_r$$

এইভাবে গঠিত যোগফলের একইভাবে লিমিট নিলে ঐ লিমিটকে (যদি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়) S-এর উপর F-এর অভিস্থ বরাবর উপাংশের তল সমাকল বলে। উক্ত মানকে

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds$$

এই আকারে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে S একটি সূযম বা খণ্ডভাবে সুষ্মতল এবং F একটি সন্তু ভেক্টর ফাংশন।

এখানে ds হল S তলের একটি ছোট অংশের ক্ষেত্রফল এবং n ঐ ছোট অংশ ds-এর উপর একক অভিস্থ।

$\therefore \vec{n} ds = d\vec{s}$  = ভেক্টর ক্ষেত্রফল যার ক্ষেত্রফল ds

$$\therefore \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

এই তল সমাকলকে S এর মধ্য দিয়ে F এর flux (মাত্র) বলা হয়।

মন্তব্য 1. যদি S তলের উপর p বিন্দুতে ধনাত্মক দিকে অঙ্গিত একক অভিস্থ n যথাক্রমে x, y ও z অক্ষের সাথে  $\alpha, \beta$  ও  $\gamma$  কোন করে, তবে  $\vec{n} = \cos\alpha\vec{i} + \cos\beta\vec{j} + \cos\gamma\vec{k}$  আবার  $\vec{F} = F_1\vec{i} + F_2\vec{j} + F_3\vec{k}$  হলে  $\vec{F} \cdot \vec{n} = F_1 \cos\alpha + F_2 \cos\beta + F_3 \cos\gamma$  এবং  $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_S (F_1 \cos\alpha + F_2 \cos\beta + F_3 \cos\gamma) ds$

মন্তব্য 2. আমরা জানি  $\Delta s_r$ , ক্ষেত্রে xy -তলে লম্ব অভিক্ষেপ (Projection) হল  $|(\vec{n}, \Delta s_r) \cdot \vec{k}|$  বা  $|\vec{n}_r \cdot \vec{k}| \Delta s_r$ , (যেহেতু xy তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর  $\vec{k}$ )। এই লম্ব অভিক্ষেপক  $\Delta x, \Delta y$ , দ্বারা চিহ্নিত করলে পাই:

$$| \vec{n}_r \cdot \vec{k} | \Delta s_r = \Delta x_r \Delta y_r$$

$$\therefore \Delta s_r = \frac{\Delta x_r \Delta y_r}{| \vec{n}_r \cdot \vec{k} |}$$

$$\therefore \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \vec{F}(p_r) \cdot \vec{n}_r \Delta s_r$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \vec{F}(p_r) \cdot \vec{n}_r \frac{\Delta x_r \Delta y_r}{| \vec{n}_r \cdot \vec{k} |}$$

$$= \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdy}{| \vec{n} \cdot \vec{k} |}$$

যেখানে xy-তলে S-এর লম্ব অভিক্ষেপ R.

মন্তব্য 3. যদি কোনো তলের সমীকরণ  $f(x, y, z) = c$ ; তাহলে ঐ তলের কোন বিন্দু  $(x, y, z)$ -তে

$$\text{একক অভিলম্ব } \vec{n} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}}{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \right|}$$

( একক 8-এর 8.3.2 অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।)

### 7.6.1 অন্য প্রকারের তল সমাকল

যদি  $\vec{F} = F_1 \vec{i} + F_2 \vec{j} + F_3 \vec{k}$  একটি ভেস্টের ফাংশন এবং  $\phi(x, y, z)$  একটি ক্ষেপার ফাংশন হয় তাহলে

$$(a) \iint_s \vec{F} ds = \vec{i} \iint_s F_1 ds + \vec{j} \iint_s F_2 ds + \vec{k} \iint_s F_3 ds$$

$$(b) \iint_s \vec{F} \times \vec{n} ds = \vec{i} \iint_s (F_2 n_3 - F_3 n_2) ds + \vec{j} \iint_s (F_3 n_1 - F_1 n_3) ds + \vec{k} \iint_s (F_1 n_2 - F_2 n_1) ds$$

$$[\because \vec{F} \times \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ F_1 & F_2 & F_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix}] \text{ যখন } \vec{n} = n_1 \vec{i} + n_2 \vec{j} + n_3 \vec{k}$$

$$= \vec{i} (F_2 n_3 - F_3 n_2) + \vec{j} (F_3 n_1 - F_1 n_3) + \vec{k} (F_1 n_2 - F_2 n_1)]$$

$$(c) \iint_s \phi ds = \iint_s \phi \vec{n} ds$$

উদাহরণ 1 যদি  $\vec{F} = z \vec{i} + xz \vec{j} + (x+y) \vec{k}$  হয় এবং  $s$  তলটি যদি প্রথম অষ্টমাংশে (First octant)

অবস্থিত  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলকের তল হয় তবে  $\iint_s \vec{F} \cdot \vec{n} ds$  -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : এখানে তল  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$  অতএব

$$\vec{n} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}}{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \right|} = \frac{2x \vec{i} + 2y \vec{j} + 2z \vec{k}}{\left| 2x \vec{i} + 2y \vec{j} + 2z \vec{k} \right|}$$

$$= \frac{x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad [x^2 + y^2 + z^2 = 1]$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n} = \{z\vec{i} + x\vec{j} + (x+y)\vec{k}\} \cdot (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k})$$

$$= xz + xyz + z(x+y) = z(2x + y + xy)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot \vec{k} = z$$

$$\therefore \iint_s \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdy}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|} \text{ এখানে } R \text{ হল } x^2 + y^2 = 1, z=0, x \geq 0, y \geq 0$$

$$= \iint_R z \frac{(2x + y + xy)}{z} dxdy$$

$$= \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^1 (2r \cos \theta + r \sin \theta + r^2 \sin \theta \cos \theta) \cdot r d\theta dr$$

[ $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  এব়ে ]

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ 2 \cos \theta \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^1 + \sin \theta \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^1 + \sin \theta \cos \theta \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \right\} d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{2}{3} \cos \theta + \frac{1}{3} \sin \theta + \frac{1}{8} \sin 2\theta \right) d\theta$$

$$= \left[ \frac{2}{3} \sin \theta - \frac{1}{3} \cos \theta - \frac{1}{16} \cos 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \left( \frac{2}{3} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{1}{16} \cos \pi \right) - \left( \frac{2}{3} \sin 0 - \frac{1}{3} \cos 0 - \frac{1}{16} \cos 0 \right)$$

$$= \left( \frac{2}{3} - 0 + \frac{1}{16} \right) - \left( 0 - \frac{1}{3} - \frac{1}{16} \right)$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{16} + \frac{1}{3} + \frac{1}{16} = \frac{9}{8}$$

2. যদি  $\vec{F} = y^2\vec{i} + x\vec{j} - zx\vec{k}$  হয় এবং  $s$  তলাটি যদি  $x^2 + y^2 = 4$  বেলনের সৈই অংশ যা প্রথম অক্ষমাংশে অবস্থিত এবং  $z = 0$  ও  $z = 2$  তলাদ্বয়ের অন্তর্বর্তী হয়, তবে  $\iint_s \vec{F} \cdot \vec{n} ds$  এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : এখানে  $\vec{n} = s$  তলের  $(x, y, z)$  বিন্দুতে একক অভিস্থ

$$= \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}}{\left| \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \right|}, \quad \text{যখন } f = x^2 + y^2$$

$$= \frac{2x\vec{i} + 2y\vec{j}}{|2x\vec{i} + 2y\vec{j}|} = \frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2}(x\vec{i} + y\vec{j}) \quad [\because x^2 + y^2 = 4]$$

এখানে  $s$  তলাটি যেহেতু  $xy$  তলের সাথে মূল সেইজন্য ঐ তলে  $s$  এর লম্ব অভিক্ষেপ নেওয়া যাবে না।  
যদি অন্য একটি স্থানান্তর তল  $xz$ -এ  $s$  এর লম্ব অভিক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে

$$\iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdz}{|\vec{n} \cdot \vec{j}|}, \quad \text{যেখানে } xz\text{-তলে } s \text{ এর লম্ব অভিক্ষেপ } R.$$

$$\text{এখন } \vec{F} \cdot \vec{n} = (y^2\vec{i} + x\vec{j} - zx\vec{k}) \cdot \frac{1}{2}(x\vec{i} + y\vec{j}) = \frac{1}{2}(xy^2 + xy)$$

$$\vec{n} \cdot \vec{j} = \frac{1}{2}(x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot \vec{j} = \frac{1}{2}y$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{নির্ণেয় তল সমাকল} &= \iint_R \frac{1}{2}(xy^2 + xy) \cdot \frac{dxdz}{\frac{1}{2}y} = \int_{x=0}^2 \int_{z=0}^2 x(y+1) dxdz \\ &= 2 \int_{x=0}^2 x \left( \sqrt{4-x^2} + 1 \right) dx \\ &= 2 \int_2^0 t(-tdt) + 2 \cdot \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2 \quad [4-x^2 = t^2 \text{ ধরে}] \\ &= 2 \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^2 + 4 = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3} \end{aligned}$$

## 7.7 আয়তন সমাকলন

ধরা যাক  $v$  তলদ্বারা আবক্ষ অঞ্চলের আয়তন  $V$  এবং  $V$  এর সকল বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত  $f(x, y, z)$  একটি এক মান বিশিষ্ট ক্ষেত্রের ফাংশন। এই  $V$  আয়তনকে  $n$  সংখ্যক স্কুল ক্ষুদ্র আয়তন  $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$ -এ বিভক্ত করা হল। ধরা যাক এদের প্রত্যেক অংশ  $\Delta v_i$ -তে একটি করে ইচ্ছামতো বিন্দু  $p_i(x_i, y_i, z_i)$  নিয়ে  $\sum_{i=1}^n f(p_i) \Delta v_i$ , যেখানে  $f(p_i) = f(x_i, y_i, z_i)$ ,

এই যোগফলটি নেওয়া হল এবং যোগফলটির এমন ভাবে লিমিট নেওয়া হল যেন  $n \rightarrow \infty$  হলে উপরোক্ত ক্ষুদ্র আয়তন  $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$  গুলির মধ্যে বৃহত্তম আয়তন  $\rightarrow 0$  হয়।

যদি এই লিমিটের অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাকে

$$\iiint_v f(x, y, z) dv$$

দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং একে  $V$ -এর উপর  $f$ -এর আয়তন সমাকল বলে।

সাধারণভাবে যদি  $v$  তলাটি সূষ্ম বা খঙ্গভাবে সূষ্ম এবং  $f$  ফাংশনটি  $V$ -এর সব বিন্দুতে সন্তুত হয় তাহলে উপরোক্ত লিমিটের অস্তিত্ব থাকে। এক্ষেত্রে আয়তন  $V$ -এর উপ বিভিন্নিকরণ এবং প্রত্যেক উপবিভাগে একটি করে বিন্দু  $p_i$  এর পছন্দের উপর লিমিটের মান নির্ভর করে না।

$$\text{যদি } \vec{F}(x, y, z) = F_1(x, y, z)\vec{i} + F_2(x, y, z)\vec{j} + F_3(x, y, z)\vec{k}$$

ভেক্টর ফাংশনটি  $V$  এর সববিন্দুতে একমান বিশিষ্ট এবং সন্তুত হয় তবে  $\vec{F}$  এর আয়তন সমাকলকে নিম্নলিখিত ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

$$\iiint_v \vec{F} dv = i \iiint_v F_1 dv + j \iiint_v F_2 dv + k \iiint_v F_3 dv$$

**উদাহরণ 1.** আয়তবন  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$ -এর ক্ষেত্রে  $\vec{F} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  ভেক্টর ফাংশনটির আয়তন সমাকল নির্ণয় করুন।

**সমাধান :** এখানে  $dv = dx dy dz$  ধরে নির্ণেয় সমাকল

$$\iiint_v \vec{F} dv = i \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c x dx dy dz + j \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c y dx dy dz + k \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c z dx dy dz \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন, } \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c x dx dy dz = \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b x[z]_0^c dx dy = c \int_{x=0}^a x[y]_0^b dx$$

$$= bc \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{a^2 bc}{2}$$

$$\text{অনুরূপে } \int_{x=a}^b \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c y dx dy dz = \frac{ab^2c}{2}$$

$$\text{अवृ} \int_{x=a}^a \int_{y=b}^b \int_{z=c}^c z dx dy dz = \frac{abc^3}{2}$$

$$\therefore \iiint_v \vec{F} dv = \frac{1}{2} abc (a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}) \quad [ \text{(i) নং-এ মান বসিয়ে } ]$$

2. যদি  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 0$ ,  $z = 2$  দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে  $v$  হয় তবে  $\iiint_v \vec{F} dv$ -এর মান নির্ণয় করন  
যখন  $\vec{F} = xy\vec{i} + z\vec{j} + y\vec{k}$ .

$$\begin{aligned} \text{এখন } & \int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{z=0}^2 xy \, dx \, dy \, dz = \int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} xy [z]_0^2 \, dx \, dy = 2 \int_{x=-2}^2 x \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \, dx \\ & = \int_{-2}^2 x \cdot 0 \, dx = 0 \end{aligned}$$

$$\int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{z=0}^2 z \, dx \, dy \, dz = \int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{z=0}^2 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^2 \, dx \, dy = 2 \int_{-2}^2 [y]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \, dx \\ = 4 \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} \, dx = 4.2 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} \, dx$$

[  $\because \sqrt{4-x^2}$  জোড় অপেক্ষক ]

$$\text{অনুরূপে } \int_0^2 \int_{z=0}^{4-x^2} \int_0^2 v dx dy dz = 0$$

$$\therefore \iiint \vec{F} dv = \vec{i}.0 + \vec{j}.8\pi + \vec{k}.0 = 8\pi\vec{j}$$

### অনুশীলনী-3

1.  $\bar{F}(x, y, z) = 2x\bar{i} + yz\bar{j} + z^2\bar{k}$  এবং S তলটি  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z=0$ ,  $z=2$  তলগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে  $\iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds$  এর মান কত?

$$[\text{সংকেত: } z=0 \text{ তলের জন্য } \bar{n} = -\bar{k}, \iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds = - \iint_S \bar{F} \cdot \bar{k} ds = \iint_S 0 ds \quad [z=0 \text{ বসিয়ে}]$$

$$\begin{aligned} z=2 \text{ তলের জন্য } \bar{n} = \bar{k}, \iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds &\approx \iint_S \bar{F} \cdot \bar{k} ds = \iint_S 4 ds \quad [z=2 \text{ বসিয়ে}] \\ &= 4.4\pi \end{aligned}$$

$$[\because \pi r^2 = \pi 2^2 = 4\pi]$$

$$\text{এবং সর্বশেষে } x^2 + y^2 = 4 \text{ বক্রতলের জন্য } \bar{n} = \frac{2x\bar{i} + 2y\bar{j}}{\sqrt{2x^2 + 2y^2}} = \frac{1}{2}(x\bar{i} + y\bar{j})$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds &= \iint_{y^2+z^2=4} \frac{2x^2+y^2z}{2} \cdot \frac{dy dz}{\bar{n} \cdot \bar{i}} = \frac{1}{2} \int_y \left[ 2x^2[z]^2_0 + y^2 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^2 \right] \frac{dy}{\frac{1}{2}x} \\ &= \int \frac{(4x^2+2y^2)dy}{x} = \int_0^{2\pi} \frac{(4 \cdot 4 \cos^2 \theta + 2 \cdot 4 \sin^2 \theta)2 \cos \theta d\theta}{2 \cos \theta} \end{aligned}$$

$$[x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \cos \theta]$$

$$y = 2 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi ]$$

$$= \int_0^{2\pi} (8 + 8 \cos^2 \theta) d\theta = 24\pi$$

$$\therefore \iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds = 0 + 16\pi + 24\pi = 40\pi$$

2. আয়তনেন  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq b$ ,  $0 \leq z \leq c$  এর ক্ষেত্রে  $\iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} ds$ -এর মান নির্ণয় করুন, যখন

$$\bar{F} = (x^2 - yz)\bar{i} + (y^2 - zx)\bar{j} + (z^2 - xy)\bar{k}$$

[সংকেত: আয়তনের মোট ছয়টি তলের জন্য সমাকলের অংশগুলি নির্ণয় করে যোগ করতে হবে উদাহরণস্বরূপ যে কোনো একটি তল ধরি  $x=a$  তলের ক্ষেত্রে

$$\text{সমাকল} = \iint_{\text{বর্ণ}} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_{\text{বর্ণ}} \vec{F} \cdot \vec{i} ds = \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c (a^2 - yz) dy dz = a^2 bc - \frac{b^2 c^2}{4}$$

নির্ণেয় মান = এইরূপ ছয়টি অংশের সমষ্টি =  $abc(a+b+c)$

3.  $\vec{F} = y\vec{i} + z\vec{j} + x\vec{k}$  হলে এবং অক্ষতলগতিও  $x+y+z=a$  দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল V হলে  $\iiint_V \vec{F} dv$ -এর মান নির্ণয় করুন।

$$[\text{সংকেত}: \iiint_V \vec{F} dv = \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} \int_{z=0}^{a-x-y} (y\vec{i} + z\vec{j} + x\vec{k}) dx dy dz \\ = \frac{a^4}{24} (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) ]$$

## 7.8 সারাংশ

(i)  $\int \vec{f}(t) dt = \vec{\phi}(t) + \vec{c}$ , যখন  $\frac{d}{dt} \vec{\phi}(t) = \vec{f}(t)$ ,  $\vec{c}$  সমাকলের ফ্রেক ভেট্টের।

(ii) আদর্শ সূত্রাবলীর জন্য 7.8 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(iii)  $\vec{F}(x, y, z) = F_1\vec{i} + F_2\vec{j} + F_3\vec{k}$  এবং  $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  হলে  $c$  রেখা বরাবর রেখা সমাকল

$$= \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz)$$

$$(iv) \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{i} \int (F_2 dz - F_3 dy) + \vec{j} \int (F_3 dx - F_1 dz) + \vec{k} \int (F_1 dy - F_2 dx)$$

$$(v) \int \phi d\vec{r} = \vec{i} \int \phi dx + \vec{j} \int \phi dy + \vec{k} \int \phi dz$$

(vi) সুষম বা খণ্ডভাবে সুষম তল  $s$ -কে  $n$  ভাগে বিভক্ত করলে যদি  $\Delta s_i$  ক্ষেত্রফলযুক্ত  $i$ -তম খণ্ডের উপর একটি বিন্দু  $p_i$ -এ অভিলম্ব  $\vec{n}_i$  হয় তবে

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \vec{F}(p_i) \cdot \vec{n}_i \Delta s_i = \iint_s \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ , যখানে  $s$ -তলে  $(x, y, z)$  বিন্দুতে অভিলম্ব  $\vec{n}$ ,  $\vec{F}(x, y, z)$  একটি সন্তুষ্ট ভেট্টের ফাংশন।

$$(vii) \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdy}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}, \text{ যেখানে } xy \text{ তলে } S \text{ এর অভিস্কেপ } R.$$

$$(viii) \iint_S \vec{F} \cdot ds = \vec{i} \iint_S F_1 ds + \vec{j} \iint_S F_2 ds + \vec{k} \iint_S F_3 dx$$

$$(ix) \iint_S \vec{F} \times \vec{n} ds = \vec{i} \iint_S (F_3 n_3 - F_2 n_2) ds + \vec{j} \iint_S (F_1 n_3 - F_3 n_1) ds + \vec{k} \iint_S (F_2 n_1 - F_1 n_2) ds$$

যথন  $\vec{n} = n_1 \vec{i} + n_2 \vec{j} + n_3 \vec{k}$

$$(x) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n f(p_r) \Delta v_r = \iiint_V f(x, y, z) dv$$

$$(xi) \iiint_V \vec{F} dv = \vec{i} \iiint_V F_1 dv + \vec{j} \iiint_V F_2 dv + \vec{k} \iiint_V F_3 dv$$

যথন  $\vec{F}(x, y, z) = F_1 \vec{i} + F_2 \vec{j} + F_3 \vec{k}$ .

## 7.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. দেখান যে  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin t \vec{i} + 5 \cos t \vec{j} + \sin 2t \vec{k}) dt = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$

2. যদি  $\vec{u} = 2t\vec{i} - \vec{j} + 3t\vec{k}$ ,  $v = \vec{i} + 2t\vec{j} - 5\vec{k}$ ,  $w = 3\vec{i} + 2\vec{j} + t\vec{k}$  হয়

তবে i)  $\int_a^b \vec{u} \cdot \vec{v} \times \vec{w} dt$  এবং ii)  $\int_0^1 \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) dt$ -এর মান নির্ণয় করুন।

3. যদি  $\vec{f} = 2t^2 \vec{i} + \vec{j} + 2t\vec{k}$  হয় তবে  $\int_1^2 \left( \frac{1}{|\vec{f}|} \frac{d\vec{f}}{dt} - \frac{d|\vec{f}|}{dt} \frac{\vec{f}}{|\vec{f}|^2} \right) df$  এর মান নির্ণয় করুন।

4. যদি C বক্রটি  $y = x^2$  অধিবৃত্তের  $(0,0)$  থেকে  $(1,1)$  পর্যন্ত হয় তবে  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ -এর মান নির্ণয় করুন  
যথন  $\vec{F} = 3x^2 \vec{i} + 4y^3 \vec{j}$ .

5.  $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ -এর মান নির্ণয় করুন যথন  $\vec{F} = (x+y)\vec{i} + (2x-y)\vec{j}$  এবং C হল  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$   
উপবৃত্তের  $(2,0)$  বিন্দু থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিন।

6.  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $z = 2$  বক্রের ধনাঘাত দিকে  $(0,1,2)$  থেকে  $(1,0,2)$  পর্যন্ত অংশকে  $c$  ধরে এবং  
 $\bar{F} = (xz^2 + y)\bar{i} + (z - y)\bar{j} + (xy - z)\bar{k}$  হলে  $\int \bar{F} \cdot d\bar{r}$  এর মান নির্ণয় করুন।

7. যদি  $\bar{F} = (2x + 3y^2)\bar{i} - 5yz\bar{j} + (2x^2 - y)\bar{k}$  হয় এবং  $(0,0,0)$  ও  $(1,1,1)$  বিন্দুবয় সংযোগকারী  
 সরলরেখাংশ  $c$  হয় তবে  $\int \bar{F} \cdot d\bar{r}$ -এর মান কত?

8. প্রথম অষ্টমাংশে  $x + y + z = a$  তলের অংশ  $s$  হলে এবং  $\bar{F} = xy\bar{i} + yz\bar{j} + zx\bar{k}$  হলে  $\iint \bar{F} \cdot \bar{n} ds$   
 এর মান কত?

9. যদি  $s$  তস্তি প্রথম অষ্টমাংশে  $z = 4$  তলারা ছেদিত  $2x + y = 6$  তল এবং  $\bar{F} = y\bar{i} + 2x\bar{j} - t\bar{k}$   
 হয় তবে  $\iint \bar{F} \cdot \bar{n} ds$  এর মান নির্ণয় করুন।

10. যদি  $s$  তস্তি প্রথম অষ্টমাংশে  $y = 4$  এবং  $z = 6$  দ্বারা সীমাবদ্ধ  $y^2 = 8x$ -এর তল হয় এবং  
 $\bar{F} = 2y\bar{i} - z\bar{j} + x^2\bar{k}$  হয় তবে  $\iint \bar{F} \cdot \bar{n} ds$ -এর মান কত?

11. যদি  $v$  অঞ্চলটি  $z = 4 - x^2$  চোঙ এবং  $x = 0, y = 0, y = 2, z = 0$  তলগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়  
 এবং  $\phi = 5xy^2$  হয় তবে  $\iiint_v \phi dv$ -এর মান নির্ণয় করুন।

## 7.10 উত্তরমালা (সংকেতসহ)

2.(i) 52 (ii)  $\frac{1}{2}(49\bar{i} + 37\bar{j} - 10\bar{k})$

3.  $\frac{2}{9}(\bar{i} - \bar{j} - \bar{k})$  [ সংকেত: 9.8 অনুচ্ছেদের (iv) নং সূত্র ব্যবহার করুন ]

4. 2

5.  $2\pi$  [ সংকেত: এখানে  $x = 2\cos t, y = \sin t$  এবং  $t = 0$  থেকে  $t = 2\pi$  পর্যন্ত সমাকল  
 করতে হবে ]

6.  $\frac{1}{4}(\pi + 2)$  [ সংকেত:  $c: x = \cos t, y = \sin t, z = 2$  বক্রের  $t = \frac{\pi}{2}$  থেকে  $t = 0$  ]

7.  $\frac{1}{2}$

8. সংকেত: এখানে  $\vec{n} = \frac{\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{3}}$ , নির্ণয় সমাকল  $= \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdy}{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}$

[  $R: x = 0, y = 0, x + y = a$  আরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ]

$$= \iint_R \frac{1}{\sqrt{3}} (xy + yz + zx) \frac{dxdy}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \int_{y=0}^a \int_{x=0}^{a-y} \{xy + (x+y)(a-x-y)\} dxdy = \frac{1}{8} a^4$$

9. সংকেত: এখানে  $\vec{n} = \frac{2\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{5}}$ ,  $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dxdz}{|\vec{n} \cdot \vec{j}|}$ , যখন  $xz$ -তলে  $s$  এর লম্ব অভিক্ষেপ

$R$  ( $s$  তলটি  $xy$  তলের সাহিত লম্ব বলে প্রি তলে অভিক্ষেপ নেওয়া গেল না)

$$R = \iint_R \frac{2}{\sqrt{5}} (y+x) \frac{dxdz}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 2 \iint_R (6 - 2x + x) dxdz = 2 \int_{z=0}^1 \int_{x=0}^3 (6-x) dxdz = 108$$

10. 132 [ সংকেত:  $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_R \vec{F} \cdot \vec{n} \frac{dydz}{|\vec{n} \cdot \vec{i}|}$ , যখন  $yz$ -তলে  $s$  -এর লম্ব অভিক্ষেপ  $R$ , এইভাবে অগ্রসর হতে হবে ]

11.  $\frac{160}{3}$  [ সংকেত: এখানে  $\iiint_V \phi dv = \int_{x=0}^2 \int_{y=0}^2 \int_{z=0}^{4-x^2} 5xy^2 dx dy dz = \dots \dots$ ,

বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন  $z = 4 - x^2$  বক্রে  $z = 0$  হলে  $x = 2$  হয় তাই  $x$ -এর লিমিট 0 থেকে 2 নিয়ে হবে ]

---

## একক ৪ □ গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল (Gradient, Divergence and Curl)

---

গঠন

- 8.1 প্রস্তাৱনা
- 8.2 উদ্দেশ্য
- 8.3 স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন এবং ভেট্টুর পয়েন্ট ফাংশন
  - 8.3.1 লেভেল তল
  - 8.3.2 দিশা অবকলজ
- 8.4 স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন-এর গ্রেডিয়েন্ট
  - 8.4.1 গ্রেডিয়েন্টের কতিপয় ধৰ্ম
  - 8.4.2 গ্রেডিয়েন্টের জ্যামিতিক তাৎপৰ্য
  - 8.4.3 গ্রেডিয়েন্ট সক্রান্ত উপপাদ্য
- 8.5 তলের উপর কোনো বিন্দুতে স্পৰ্শকতল ও অভিলম্বের সমীকৰণ
  - 8.5.1 দুটি তল দ্বারা ছেদিত বক্ররেখার কোনো বিন্দুতে স্পৰ্শক (সরলরেখা) ও লম্ব তলের সমীকৰণ
- 8.6 ডাইভারজেন্স ও কার্ল
  - 8.6.1 ডাইভারজেন্স ও কার্ল সক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রাবলী
  - 8.6.2 দ্বিতীয় ত্রৈমাণিক ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর
- 8.7  $\operatorname{div} f$  এবং  $\operatorname{curl} f$ -এর ব্যবহারিক বিষয়ে আলোচনা
- 8.8 সারাংশ
- 8.9 প্রশ্নাবলী
- 8.10 উন্নতমালা

---

### 8.1 প্রস্তাৱনা

---

আমরা এই এককে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা কৰব সেগুলি হল গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল, তাদের জ্যামিতিক তাৎপৰ্য, বিভিন্ন ধৰ্ম ইত্যাদি। জ্যামিতি, ফলিত গণিতের বিভিন্ন শাখা ইত্যাদিতে এগুলির প্রয়োগ আছে।

আলোচনার মূলপর্বে পৌছানোর আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় বিশেষ করে জানা প্রয়োজন, সেগুলি হল  
 (ক) স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন (Scalar point function) (খ) ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন (Vector point function)  
 (গ) লেভেল স্লেব (Level surface) (ঘ) দিশা অবকল (Directional derivative) ইত্যাদি; আমরা এখানে এই  
 বিষয়গুলি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আলোচনা করব এবং পরে মূল বিষয়ে যাব।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, আমরা এখানে ভেক্টর ফাংশনকে মেটা অক্ষরে (Bold face) প্রকাশ করব।

## 8.2 উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন, ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন ও ফিল্ড কী।
- দিশা অবকলজ কী এবং কীভাবে নির্ণয় হয়।
- স্কেলার ফাংশনের গ্রেডিয়েন্ট, তার ধর্ম এবং জ্যামিতিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারবেন।
- তলের স্পর্শকতল, অভিলম্বের সমীকরণ কীভাবে নির্ণয় করা যায়।
- ভেক্টর ডাইভারজেন্স ও কার্ল সমূহকে জানতে পারবেন। ডাইভারজেন্স ও কার্ল বিষয়ক সূত্রাবলী ও ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহার বুঝতে পারবেন।

## 8.3 স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন এবং ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন

ধরা যাক ত্রিমাত্রিক দেশ (Three dimensional space)-এর একটি অঞ্চল (Region) D-তে P একটি বিন্দু  
 যার কার্ডিয় স্থানাঙ্ক ( $x, y, z$ ); স্থানাঙ্ক অক্ষ বরাবর একক ভেক্টরগুলি i, j, k হলে P বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  
 (Position Vector)  $r = xi + yi + zk$  লেখা হয়। যদি ত্রিমাত্রিক দেশের D-অঞ্চলের যেকোনো বিন্দু P-এর  
 জন্য একটি ফাংশন  $f(x, y, z)$  বা  $f(P)$  বা  $f(r)$  এমন ভাবে সংজ্ঞায়িত থাকে যেন ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি বিন্দুর  
 জন্য  $f(x, y, z)$ -এর নির্দিষ্ট স্কেলার মান পাওয়া যায়, তবে  $f(x, y, z)$ -কে একটি স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন বলে।  
 এক্ষেত্রে আমরা বলি D অঞ্চলে একটি স্কেলার ফিল্ড (Scalar field) সংজ্ঞায়িত আছে।

**উদাহরণ :** (i) যদি D অঞ্চলের কোনো বিন্দু  $P(x, y, z)$ -তে তাপমাত্রা  $f(x, y, z)$  হয় তবে আমরা বলব D  
 অঞ্চলে তাপমাত্রার স্কেলার ফিল্ড সংজ্ঞায়িত আছে।

(ii) যদি একটি তরলপূর্ণ পাত্রে তরলের বিভিন্ন বিন্দু  $(x, y, z)$ -তে ঘনত্বের মান  $f(x, y, z)$  ঘরা নির্ণীত হয়  
 তবে এক্ষেত্রেও তরলটিতে ঘনত্বের একটি স্কেলার ফিল্ড আছে বলে ধরা হয়।

আবার যদি D অঞ্চলের যে কোন বিন্দু  $P(x, y, z)$ -এর জন্য একটি ফাংশন  $F(x, y, z)$  বা  $F(P)$  বা  $F(r)$   
 এমনভাবে সংজ্ঞায়িত থাকে যেন ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য  $F(x, y, z)$ -এর নির্দিষ্ট ভেক্টর মান পাওয়া  
 যায় তবে  $F(x, y, z)$ -কে একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন বলা হয়। আগের মত এক্ষেত্রে আমরা বলি D অঞ্চলে  
 একটি ভেক্টর ফিল্ড (Vector field) সংজ্ঞায়িত আছে।

**উদাহরণ :** (i) কোনো গতিশীল তরলের বিশেষ অঞ্চল D-এর প্রত্যেক বিন্দুর বেগের মান সমূহ একটি  
 ভেক্টর ফিল্ড গঠন করে।

(ii) কোনো বস্তুর বিশেষ অঞ্চল D-এর প্রত্যেক বিন্দুতে ক্রিয়ারত অভিকর্ষ জনিত বলসমূহ অন্য একটি  
 ভেক্টর ফিল্ডের উদাহরণ।

### 8.3.1 সেভেল তল

ধরা যাক  $D$ -অঞ্চলে  $f(x, y, z)$  একটি ফ্লোর ফিল্ড আছে। তাহলে  $f(x, y, z) = c$  সমীকরণটি  $f$ -এর সংজ্ঞার অঞ্চলে  $D$ -তে একটি তল বোঝায়।  $c$ -এর বিভিন্ন মানের জন্য একগুচ্ছ বিভিন্ন তল সৃষ্টি হয়। তদগুলিকে সেভেল তল বলা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ  $c$  এর ইচ্ছামত (arbitrary) মানের জন্য

$$(i) x^2 + y^2 + z^2 = c \text{ (বিভিন্ন বাসার্ধের একগুচ্ছ গোলকের তল)}$$

$$(ii) \alpha x + \beta y + \gamma z = c \text{ (বিভিন্ন সমান্তরাল তলসমূহ যারা } n = (\alpha, \beta, \gamma) \text{ ডেক্টরের সাথে সম্পৃক্ষ হয়)}$$

ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক এক গুচ্ছ সেভেল তলকে সৃষ্টি করে।

### 8.3.2 দিশা অবকলজ

ধরা যাক স্কেলার পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z)$ -এর সংজ্ঞার অঞ্চল  $D$ -তে  $A(x, y, z)$  একটি বিন্দু এবং  $A$  থেকে অঙ্কিত  $S$  ডেক্টরের উপর  $A$ -এর খুব কাছে  $P(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z)$  আর একটি বিন্দু।  $AP$ -কে কর্ণ ধরে এবং বাহুগুলি অঙ্কগুলির সমান্তরাল করে অঙ্কিত (চিত্র-8.1) আয়তবনের বাহুগুলি  $AL = \Delta x$ ,  $AM = \Delta y$  এবং  $AN = \Delta z$ , অতএব  $AP = \Delta s$   $= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$  এবং  $S$  ডেক্টরের দিক্ক কোসাইনগুলি (Direction Cosines)  $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$  হলে

$$\cos\alpha = \frac{\Delta x}{\Delta s}, \cos\beta = \frac{\Delta y}{\Delta s} \text{ এবং } \cos\gamma = \frac{\Delta z}{\Delta s}$$

এখানে আরও ধরা যাক  $f(x, y, z)$  ফাংশনটি সন্তুত (Continuous) এবং ফাংশনটির সন্তুত অবকল সহগ আছে। বহুস (Several variables) ফাংশনের অবকলনযোগ্যতার (Differentiability) শর্ত অনুযায়ী বলা যায় যেহেতু  $f(x, y, z)$  ফাংশনটির  $A(x, y, z)$  বিন্দুতে অবকলজ আছে অতএব


$$f = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \phi_1 \Delta x + \phi_2 \Delta y + \phi_3 \Delta z$$

যখন  $\phi_1, \phi_2, \phi_3$ , প্রত্যেক  $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ -এর ফাংশন এবং  $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0, 0, 0)$  হলে এরা প্রত্যেকে শূন্যের সমীপবর্তী (approach) হয়। উপরোক্ত সম্পর্কটির উভয়পক্ষকে  $\Delta s$  দ্বারা ভাগ করে পাই

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f}{\Delta s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta s} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta s} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta s} + \phi_1 \frac{\Delta x}{\Delta s} + \phi_2 \frac{\Delta y}{\Delta s} + \phi_3 \frac{\Delta z}{\Delta s} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma + \phi_1 \cos\alpha + \phi_2 \cos\beta + \phi_3 \cos\gamma \end{aligned}$$

$$\text{or, } \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left[ \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma + \phi_1 \cos\alpha + \phi_2 \cos\beta + \phi_3 \cos\gamma \right]$$

[উভয় পক্ষে সিমিট্রি  $\Delta s \rightarrow 0$  করে]



$$\text{or, } \nabla_s f = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma \dots \text{ (i)}$$

[ $\because \Delta s \rightarrow 0$  হলে  $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0,0,0)$  হয় এবং তখন  $\phi_1, \phi_2, \phi_3$  প্রত্যক্ষে  $\rightarrow 0$  হয়]

$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta s}$  বা  $\nabla_s f$  কে S ভেষ্টনের দিকে A(x, y, z) বিন্দুতে, f(x, y, z)-এর দিশা অবকলজ বলে।

এখন দিক্ক কোসাইনগুলিকে l, m, n ধারা প্রকাশ করলে f(x,y,z)-এর দিশা অবকলজ নিম্নরূপ :

$$\nabla_s f = l \frac{\partial f}{\partial x} + m \frac{\partial f}{\partial y} + n \frac{\partial f}{\partial z} \dots \text{ (ii)}$$

$$= (il + jm + kn). (if_x + jf_y + kf_z)$$

$$= a. (if_x + jf_y + kf_z) \dots \text{ (iii)}$$

যখন  $a = AP$  বরাবর একক ভেষ্টন এবং  $if_x + jf_y + kf_z$  একটি ভেষ্টন ফাংশন।

**মন্তব্য 1 :** যখন s-ভেষ্টনের দিক্ক x-অক্ষের ধনায়ক দিকের সাথে সমান্তরাল তখন l, m, n-এর মান 1, 0, 0 এবং (ii) নং সূত্র অনুযায়ী x-অক্ষের দিশা বরাবর f(x,y,z)-এর দিশা অবকলজ  $\nabla_x f = \frac{\partial f}{\partial x}$  অনুরূপে y-অক্ষ এবং z-অক্ষের ধনায়ক দিক বরাবর f(x,y,z) ফাংশনটির দিশা অবকলজ যথাক্রমে  $\frac{\partial f}{\partial y}$  এবং  $\frac{\partial f}{\partial z}$

$$\text{আবার (i) নং থেকে } \nabla_s f = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{ds} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{ds} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{ds} = \frac{df}{ds}$$

[ $\because \Delta s \rightarrow 0$  হলে  $\cos\alpha = \frac{dx}{ds}$  ইত্যাদি]

**মন্তব্য 2 :** যদি f(x, y, z) ভেষ্টন পয়েন্ট ফাংশনটিকে উপাংশে f(x,y,z) = if<sub>1</sub>(x, y, z) + jf<sub>2</sub>(x,y,z) + kf<sub>3</sub>(x, y, z) এইভাবে সেখা হয়, যখন f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub>, f<sub>3</sub> প্রত্যক্ষে ক্ষেপণ পয়েন্ট ফাংশন, তখন একইভাবে AP দিক অর্থে s-ভেষ্টনের দিক বরাবর f(x,y,z) ভেষ্টন পয়েন্ট ফাংশনটির দিশা অবকলজ

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta s}$$

$$= i \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{f_1(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f_1(x, y, z)}{\Delta s} + j \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{f_2(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f_2(x, y, z)}{\Delta s}$$

$$+ k \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{f_3(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f_3(x, y, z)}{\Delta s}$$

$$= i \left( l \frac{\partial f_1}{\partial x} + m \frac{\partial f_1}{\partial y} + n \frac{\partial f_1}{\partial z} \right) + j \left( l \frac{\partial f_2}{\partial x} + m \frac{\partial f_2}{\partial y} + n \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + k \left( l \frac{\partial f_3}{\partial x} + m \frac{\partial f_3}{\partial y} + n \frac{\partial f_3}{\partial z} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= l \left( i \frac{\partial f_1}{\partial x} + j \frac{\partial f_2}{\partial x} + k \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + m \left( i \frac{\partial f_1}{\partial y} + j \frac{\partial f_2}{\partial y} + k \frac{\partial f_3}{\partial y} \right) + n \left( i \frac{\partial f_1}{\partial z} + j \frac{\partial f_2}{\partial z} + k \frac{\partial f_3}{\partial z} \right) \\
 &= l \frac{\partial f}{\partial x} + m \frac{\partial f}{\partial y} + n \frac{\partial f}{\partial z}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ :

1.  $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$  হলে  $y$ -অক্ষের দিক বরাবর  $f$ -এর দিশা অবকলজ নির্ণয় করন।

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি } y\text{-অক্ষের দিক বরাবর } f\text{-এর দিশা অবকলজ} &= \frac{\partial f}{\partial y} \\
 \therefore \text{নির্ণেয় দিশা অবকলজ} &= \frac{\partial}{\partial y} (x^3 + y^3 + z^3) \\
 &= 0 + 3y^2 + 0 = 3y^2
 \end{aligned}$$

2.  $f(x, y, z) = xy^2 + yz^2 + zx^2$  হলে  $(1, -2, 5)$  বিন্দুতে

(ক)  $x$ -অক্ষের দিকে (খ)  $2i + j - 3k$  ভেক্টরের দিকে দিশা অবকলজ নির্ণয় করন।

সমাধান :

$$f(x, y, z) = xy^2 + yz^2 + zx^2$$

$$\therefore \frac{\partial f}{\partial x} = y^2 + 2zx, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + z^2, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2yz + x^2$$

$$\therefore \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(1, -2, 5)} = (-2)^2 + 2 \cdot 5 \cdot 1 = 4 + 10 = 14$$

$$\therefore \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_{(1, -2, 5)} = 2 \cdot 1 \cdot (-2) + (5)^2 = 21$$

$$\left( \frac{\partial f}{\partial z} \right)_{(1, -2, 5)} = 2 \cdot (-2) \cdot 5 + (1)^2 = -19$$

এবং  $2i + j - 3k$  ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলি

$$\frac{2}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2}}, \quad \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2}}, \quad \frac{-3}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-3)^2}}$$

বা,  $\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-3}{\sqrt{14}}$ । অতএব

$$(a) x\text{-অক্ষের দিক বরাবর } (1, -2, 5) \text{ বিন্দুতে f-এর দিশা অবকলজ } = \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(1,-2,5)} = 14$$

(b)  $2i + j - 3k$  ভেক্টরের দিক বরাবর  $(1, -2, 5)$  বিন্দুতে f-এর দিশা অবকলজ

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\sqrt{14}} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(1,-2,5)} + \frac{1}{\sqrt{14}} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_{(1,-2,5)} + \frac{(-3)}{\sqrt{14}} \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right)_{(1,-2,5)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{14}} \cdot 14 + \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot 21 - \frac{3}{\sqrt{14}} \cdot (-19) \\ &= \frac{1}{\sqrt{14}} (28 + 21 + 57) = \frac{106}{\sqrt{14}} = \frac{53\sqrt{14}}{7} \end{aligned}$$

3.  $f(x,y,z) = x^2i + yzj - zk$  ভেক্টর ফাংশনটির

$(0, 2, -1)$  বিন্দুতে  $2i - j + 2k$  ভেক্টরের দিকে দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$2i - j + 2k$  ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলি

$$\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \quad (\text{যেহেতু } \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3)$$

$$\begin{aligned} \text{আবার } \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (x^2i + yzj - zk) = 2xi + 0j + 0k \\ &= 2xi \end{aligned}$$

$$\text{অনুরাগে } \frac{\partial f}{\partial y} = zj \text{ এবং } \frac{\partial f}{\partial z} = yj - k$$

$$\begin{aligned} \therefore f\text{-এর দিশা অবকলজ} &= l \frac{\partial f}{\partial x} + m \frac{\partial f}{\partial y} + n \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= \frac{2}{3} \cdot (2xi) - \frac{1}{3} (zj) + \frac{2}{3} (yj - k) \\ &= \frac{4}{3} xi + \frac{1}{3} (2y - z) j - \frac{2}{3} k \end{aligned}$$

$\therefore (0, 2, -1)$  বিন্দুতে নির্ণ্য দিশা অবকল

$$= \frac{4}{3} \cdot 0i + \frac{1}{3} (2 \cdot 2 + 1) j - \frac{2}{3} k = \frac{1}{3} (5j - 2k)$$

## 8.4 ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন-এর গ্রেডিয়েন্ট

$f(x, y, z)$  যদি একটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন হয় তবে পূর্ববর্তী 8.3.2 অনুচ্ছেদে (iii) নং সূত্রে বর্ণিত  $i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z}$  ভেষ্টের ফাংশনটিকে ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f}(x, y, z)$ -এর গ্রেডিয়েন্ট বলে এবং একে  $\text{grad } f$  বা  $\nabla f$  দ্বারা সূচিত করা হয়। এখানে  $\nabla \equiv i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}$ । স্বভাবতই  $\text{grad } f$  একটি ভেষ্টের রাশি। অপারেটর  $\nabla$ -কে ডেলটা বা ন্যাবলা বলা হয়।

তাহলে  $\text{grad } f$ -এর সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে 8.3.2 অনুচ্ছেদের (iii) নং সূত্রটিকে প্রকাশ করা যায় :

যে ভেষ্টেরের দিক কোসাইনগুলি  $l, m, n$  সেই দিক্বরাবর  $f(x, y, z)$  এর দিশা অবকলজ নির্ণিত হচ্ছে সেই দিকের একক ভেষ্টের।

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = (il + jm + kn) \cdot \text{grad } f \dots\dots (i)$$

=  $a \cdot \text{grad } f$ , হল,  $a$  যেদিকে দিশা অবকলজ নির্ণিত হচ্ছে সেই দিকের একক ভেষ্টের।

### 8.4.1 গ্রেডিয়েন্টের ক্রিপ্তপয় ধর্ম :

(a) যদি  $f(x, y, z) =$  ক্রিপ্ত হয় তবে  $\frac{\partial f}{\partial x} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$  সুতরাং  $\text{grad } f = 0$  হয়। আবার বিপরীত ক্রমে যদি  $\text{grad } f = 0$  হয় তবে  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$  প্রত্যেকের মানই শূন্য হবে এবং সেই কারণে  $f(x, y, z)$  ক্রিপ্ত হতে বাধ্য।

অতএব  $\text{grad } f = 0$  শর্তটি  $f(x, y, z) =$  ক্রিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট (necessary and sufficient) শর্ত।

(b) যদি  $f(x, y, z)$  এবং  $g(x, y, z)$  দুটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন হয় তবে

$$(i) \quad \text{grad} (f \pm g) = \text{grad } f \pm \text{grad } g$$

$$(ii) \quad \text{grad} (fg) = f \text{ grad } g + g \text{ grad } f$$

$$(iii) \quad \text{grad} \left( \frac{f}{g} \right) = \frac{g \text{ grad } f - f \text{ grad } g}{g^2}$$

$$\text{প্রমাণ : (i)} \quad \text{grad} (f + g) = i \frac{\partial}{\partial x} (f + g) + j \frac{\partial}{\partial y} (f + g) + k \frac{\partial}{\partial z} (f + g)$$

$$= i \left( \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial x} \right) + j \left( \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) + k \left( \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial z} \right)$$

$$= \left( i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \right) + \left( i \frac{\partial g}{\partial x} + j \frac{\partial g}{\partial y} + k \frac{\partial g}{\partial z} \right)$$

$$= \text{grad } f + \text{grad } g$$

অনুরূপে প্রমাণ করা যায়  $\text{grad}(f - g) = \text{grad } f - \text{grad } g$

অর্থাৎ  $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad \text{grad}(fg) &= \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) (fg) \\
 &= f \left( i \frac{\partial g}{\partial x} + j \frac{\partial g}{\partial y} + k \frac{\partial g}{\partial z} \right) + g \left( i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\
 &= f \text{ grad } g + g \text{ grad } f
 \end{aligned}$$

$$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad \text{grad} \left( \frac{f}{g} \right) &= \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \frac{f}{g} = i \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{f}{g} \right) + j \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{f}{g} \right) + k \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{f}{g} \right) \\
 &= i \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2} + j \frac{g \frac{\partial f}{\partial y} - f \frac{\partial g}{\partial y}}{g^2} + k \frac{g \frac{\partial f}{\partial z} - f \frac{\partial g}{\partial z}}{g^2} \\
 &= \frac{1}{g^2} \left[ g \left( i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \right) - f \left( i \frac{\partial g}{\partial x} + j \frac{\partial g}{\partial y} + k \frac{\partial g}{\partial z} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{g^2} [g \nabla f - f \nabla g]
 \end{aligned}$$

উদাহরণ :

- ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন  $f = xy + yz + zx$ -এর  $(1, 1, 1)$  বিন্দুতে  $\text{grad } f$  এর মান নির্ণয় করুন এবং সেখান থেকে  $i + k$  ডেক্সের দিকে  $f$ -এর দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{grad } f &= i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \\
 &= i(y+z) + j(x+z) + k(y+x) \quad [\because f = xy + yz + zx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = y + z \text{ ইত্যাদি}]
 \end{aligned}$$

$\therefore (1, 1, 1)$  বিন্দুতে  $\text{grad } f$ -এর মান

$$\begin{aligned}
 (\nabla f)_{(1,1,1)} &= i(1+1) + j(1+1) + k(1+1) \\
 &= 2(i + j + k)
 \end{aligned}$$

$$\text{আবার } i+k \text{ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর = } \frac{i+k}{|i+k|} = \frac{i+k}{\sqrt{1^2+1^2}}$$

$$= \frac{i+k}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় দিশা অবকলজ } = \frac{1}{\sqrt{2}}(i+k) \cdot 2(i+j+k)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}}(1.1 + 0.1 + 1.1) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

**জটিল :** যেহেতু এই মানটি ধনাত্মক, প্রদত্ত দিক বরাবর ফুরুজ্জিত হয় এবং ফুরুজ্জির হার  $2\sqrt{2}$ .

$$2. \nabla r^{10} \text{-এর মান নির্ণয় করুন যখন } r = |r|$$

**সমাধান :**

$$\text{যেহেতু } r = xi + yj + zk, \text{ অতএব } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\Rightarrow r^{10} = \left\{ (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \right\}^{10} = (x^2 + y^2 + z^2)^5$$

$$\therefore \frac{\partial}{\partial x} r^{10} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2 + z^2)^5 = 5(x^2 + y^2 + z^2)^{5-1} \cdot 2x \\ = 10x(x^2 + y^2 + z^2)^4$$

$$\text{অনুজ্ঞাপে } \frac{\partial r^{10}}{\partial y} = 10y(x^2 + y^2 + z^2)^4 \text{ এবং } \frac{\partial r^{10}}{\partial z} = 10z(x^2 + y^2 + z^2)^4$$

$$\therefore \nabla r^{10} = i \frac{\partial r^{10}}{\partial x} + j \frac{\partial r^{10}}{\partial y} + k \frac{\partial r^{10}}{\partial z}$$

$$= i 10x(x^2 + y^2 + z^2)^4 + j 10y(x^2 + y^2 + z^2)^4 + k 10z(x^2 + y^2 + z^2)^4$$

$$= 10(x^2 + y^2 + z^2)^4 (xi + yi + zk)$$

$$= 10 \left\{ (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} \right\}^8 r$$

$$= 10r^8 r$$

৩. দুটি বিন্দু  $(\alpha, \beta, \gamma)$  ও  $(x, y, z)$ -এর দূরত্ব যদি  $r$  হয় অর্থাৎ যদি  $r = (x - \alpha)i + (y - \beta)j + (z - \gamma)k$ .

যখন  $r = |r|$  হয়, তাহলে দেখান যে  $\nabla r = \frac{r}{r}$

সমাধান :

$$\text{প্রান্তিকভাবে } r = \sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2}$$

$$\therefore \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2} \left\{ (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 \right\}^{\frac{1}{2}-1} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left\{ (x - \alpha)^2 \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 \right\}^{-\frac{1}{2}} \cdot 2(x - \alpha)$$

$$= \frac{x - \alpha}{\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2}}$$

$$\text{অনুরূপে } \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y - \beta}{\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2}}, \text{ এবং } \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z - \gamma}{\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2}}$$

$$\therefore \nabla r = i \frac{\partial r}{\partial x} + j \frac{\partial r}{\partial y} + k \frac{\partial r}{\partial z}$$

$$= \frac{(x - \alpha)i + (y - \beta)j + (z - \gamma)k}{\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2}} \quad \left[ \frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \text{ এর মান বসিয়ে \right]$$

$$= \frac{r}{r} \quad [\text{জটিল : } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}] \text{ হলেও } \nabla r = \frac{r}{r}, \alpha = \beta = \gamma = 0 \text{ বসিয়ে ]$$

## 8.4.2 ফেডিয়েল্টের জ্যামিতিক তাৎপর্য :

আমরা জানি  $f(x, y, z) = c$  লেভেল তলের উপর কোন বিন্দু  $P(x, y, z)$ -এর অবস্থান ভেক্টর (Position Vector)  $r = xi + yj + zk$  হলে  $dr = dx i + dy j + dz k$

ভেক্টরটি লেভেল তলটির  $P$  বিন্দুতে অক্ষিত স্পর্শক তলের উপর অবস্থিত হয়।

$$\text{আবার, } \text{grad } f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$\text{অতএব, } dr \cdot \text{grad } f = (dx i + dy j + dz k) \cdot \left( i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

= df [আংশিক অবকলের সূত্র অনুযায়ী ]


= 0, যেহেতু  $f(x, y, z) = c$  == ক্ষেত্র।

অতএব  $\text{grad } f$ -এর  $dr$  ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব অর্থাৎ  $\text{grad } f$  ভেক্টরটি  $f(x, y, z) = c$  তলের অভিলম্বের (normal) দিক বরাবর নির্দেশিত। এখানে আমরা  $\text{grad } f$  ভেক্টরের দিকটির জ্যামিতিক তাৎপর্যে দেখলাম। এবার দুটি উপপাদ্যের সাহায্যে  $\text{grad } f$ -এর মান সম্পর্কিত জ্যামিতিক ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

### 8.4.3 প্রেডিয়েন্ট সংক্রান্ত উপপাদ্য

উপপাদ্য 1 : যদি  $f(x, y, z) = c$  লেভেল তলের উপর কোনো বিন্দু  $P(x, y, z)$ -তে অভিলম্বের দিক বরাবর একক ভেক্টর  $n$  এবং একই দিক বরাবর কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু  $A$  থেকে  $P$ -এর দূরত্ব  $r$  হয় তবে,

$$\text{grad } f = \frac{df}{dn} n$$



চিত্র : 8.2

প্রমাণ :  $\text{grad } f$ -এর জ্যামিতিক তাৎপর্যতে আমরা দেখেছি  $\text{grad } f$  ভেক্টরটির দিক  $f(x, y, z) = c$  তলের অবিলম্ব  $n$ -এর দিকবরাবর নির্দেশিত।

$$\text{grad } f = |\text{grad } f| n \dots\dots (ii)$$

আমরা জানি  $n$ -এর দিকে  $f$ -এর দিশা অবলকজ্ঞ

$$\text{বা, } \frac{df}{dn} = \text{grad } f \cdot n \quad [\because \nabla n, 8.3.2 \text{ অনুচ্ছেদের থেকে}]$$

$$\text{বা, } \frac{df}{dn} = |\text{grad } f| n \cdot n \quad [(ii) \text{ নথেকে}]$$

$$= |\text{grad } f| \quad [\because n \cdot n = 1]$$

$$\therefore \text{grad } f = \frac{df}{dn} n \quad \text{বা, } |\text{grad } f| = \frac{df}{dn}$$

অর্থাৎ  $|\text{grad } f|$  হল  $f = c$  লেভেল তলের  $B$  লম্বের দিকের বৃক্ষিক হার।

উপাদ্য 2 : ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z)$ -এর দিশা অবকলজ  $\nabla_s f$  বা,  $\frac{\partial f}{\partial s}$  এর চরম (Maximum) মান  $f(x, y, z) = c$  লেভেল তলের অভিলম্বের দিকে। অর্থাৎ  $\text{grad } f$  ভেক্টরটি যেদিকে নির্দেশিত সেই দিক বরাবর  $\frac{df}{ds}$ -এর মান চরম।

প্রমাণ : আমরা জানি  $f(x, y, z)$  ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশনটির সংজ্ঞার অঠলে যে ডেক্ট্রিটির দিক কোসাইনগুলি  $i, m, n$  সেইদিক বরাবর দিশা অবকলজ

$$\frac{df}{ds} = \nabla_s f = a \cdot \text{grad } f, \text{ যখন } a = i\hat{i} + j\hat{j} + k\hat{k}$$

$$= a \cdot \frac{df}{dn} n \quad [ \text{আগের উপপাদ্য অনুযায়ী } ]$$

$$= \frac{df}{dn} \cos \theta \quad [ \because |a| = 1 = |n| \text{ যখন } a \text{ এর অন্তবর্তী কোন } \theta ]$$

যেহেতু  $\frac{df}{dn}$ -এর মান নির্দিষ্ট  $\frac{df}{ds}$ -এর মান চরম হবে যদি  $\cos \theta$ -এর মান চরম হয়;

অর্থাৎ যদি  $\cos \theta = 1$  হয়,

অর্থাৎ যদি  $\theta = 0$  হয়

অর্থাৎ যদি  $a$  ডেক্ট্রিটি  $n$ -এর দিকে নির্দেশিত হয়।

মন্তব্য : ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন  $f(p)$  অক্ষতন্ত্র নিরপেক্ষ।  $f(p) = c$  এই সেভেল তলটি অক্ষতন্ত্র নিরপেক্ষ জ্যামিতিক তল। আমরা দেখলাম তলটির উপর কোন  $p$  বিন্দুতে  $\text{grad } f$  হল এমন ডেক্ট্রির যার দিক তলটির অভিলম্বের দিকে এবং যার মান  $\frac{df}{ds}$  এর চরম মান। এই জ্যামিতিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়  $\text{grad } f$  হল অক্ষতন্ত্র নিরপেক্ষ। (যদিও 8.4 অনুচ্ছেদে  $\text{grad } f$ -এর কোনো অক্ষতন্ত্র সাপেক্ষে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে)।

উদাহরণ :

1. গ্রেডিয়েন্টের দিক বা অভিলম্বের দিক বরাবর  $f(x, y, z) = 4x^2 - 3y^2 + 2z^2$  ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশনটির  $(0,0,4)$  বিন্দুতে অবকল সহগ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$$\text{আমরা জানি } \text{grad } f = \frac{df}{dn} n$$

$$\therefore \frac{df}{dn} = |\text{grad } f|$$

$$\text{এখন } \text{grad } f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$= i(8x) + j(-6y) + k(4z)$$

$$\therefore (\text{grad } f)_{(0,0,4)} = i \cdot 0 + j \cdot 0 + k \cdot 4 \cdot 4 \\ = 16k$$

$\therefore \frac{df}{dn} = |16k| = 16$ ,  $(0,0,4)$  বিন্দুতে  $f$  বর্ধিত হওয়ার সর্বোচ্চ হার হল 16।

2. দেখান যে  $f(x, y, z) = x^3 y^2 z$  ক্ষেপার পয়েন্ট ফাংশনটির  $(-1,1,2)$  বিন্দুতে দিশা অবকলজ,  $6i - 4j - k$  ভেক্টরের দিকে চরম এবং এই চরম মান  $\sqrt{53}$ ।

সমাধান :

$$\nabla f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \quad (\nabla f \text{ হল } \text{grad } f) \\ = i(3x^2y^2z) + j(2x^3yz) + k(x^3y^2) \quad [\because f = x^3y^2z]$$

$$\therefore (\nabla f)_{(-1,1,2)} = i(3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2) + j(2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 2) + k(-1 \cdot 1) \\ = 6i - 4j - k$$

$\therefore$  নির্গেয় দিশা অবকলজ  $6i - 4j - k$  এর দিকে চরম।

$$\text{আবার দিশা অবকলজের চরম মান} = |(\nabla f)_{(-1,1,2)}| \\ = |6i - 4j - k| \\ = \sqrt{6^2 + (-4)^2 + (-1)^2} \\ = \sqrt{36 + 16 + 1} = \sqrt{53}$$

অতএব  $(-1, 1, 2)$  বিন্দুতে  $f$  ফাংশনটির বর্ধিত হওয়ার সর্বোচ্চ হার  $\sqrt{53}$

3.  $x^2 + y^2 + z^2 = 14$  লেভেল তলের উপর  $(1,2,3)$  বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$$\text{এখানে } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \frac{\partial f}{\partial z} = 2z$$

$$\therefore \nabla f = i 2x + j 2y + k 2z$$

$$(\nabla f)_{(1,2,3)} = 2i + 4j + 6k, \text{ এই ভেক্টরটি অভিলম্বের দিকে।}$$

$$\therefore \text{নির্ণয় ডেক্সের} = \pm \frac{2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}|}$$

$$= \pm \frac{1}{\sqrt{56}} (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k})$$

$$= \pm \frac{1}{\sqrt{14}} (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$$

4.  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  এবং  $z = x^2 + y^2 - 3$  তলাদ্বয়ের মধ্যে  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে কোণ নির্ণয় করুন  
সমাধান :

আমরা জানি  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে পদ্ধতি তলাদ্বয়ের অভিলম্বাদ্বয়ের অঙ্গীকৃত কোণই নির্ণয় কোণ।

যদি  $f_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$  এবং  $f_2(x, y, z) = x^2 + y^2 - z - 3 = 0$  হয়।

$$\text{তবে } \nabla f_1 = i \frac{\partial f_1}{\partial x} + j \frac{\partial f_1}{\partial y} + k \frac{\partial f_1}{\partial z} = i 2x + j 2y + k 2z$$

$\therefore f_1(x, y, z) = 0$  তলের  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে অভিলম্ব

$$(\nabla f_1)_{(2, -1, 2)} = i 2.2 + j 2.(-1) + k 2.2$$

$$= 4i - 2j + 4k$$

$$\text{আবার } \nabla f_2 = i \frac{\partial f_2}{\partial x} + j \frac{\partial f_2}{\partial y} + k \frac{\partial f_2}{\partial z} = i 2x + j 2y + k (-1)$$

$\therefore f_2(x, y, z) = 0$  তলের  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে অভিলম্ব

$$(\nabla f_2)_{(2, -1, 2)} = i 2.2 + j 2.(-1) - k = 4i - 2j - kk$$

$$\therefore \text{নির্ণয় কোণ } \theta \text{ হলো } \theta = \cos^{-1} \frac{(4i - 2j - k) \cdot (4i - 2j + 4k)}{|4i - 2j - k| |4i - 2j + 4k|}$$

$$= \cos^{-1} \frac{4.4 + (-2).(-2) + (-1).4}{\sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-1)^2} \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 4^2}}$$

$$= \cos^{-1} \frac{16}{\sqrt{21}.6} = \cos^{-1} \frac{8\sqrt{21}}{63}$$

## 8.5 তলের উপর কোনো বিন্দুতে স্পর্শকতল ও অভিলম্বের সমীকরণ

ধরা যাক  $f(x,y,z) = c$  তলের উপর  $p(x,y,z)$  একটি বিন্দু যার অবস্থান ভেক্টর  $r = xi + yj + zk$  (এখানে  $f(x,y,z)$  ক্ষেত্রটির জন্য  $f(x,y,z)=c$  একটি সেডেল তল) তাহলে আমরা জানি—

$$\text{grad } f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} = \nabla f \quad \text{ভেক্টরটি উক্ত তলের উপর } p \text{ বিন্দুতে অভিলম্বের দিকে নির্দেশিত।}$$

অতএব  $\nabla f$  ভেক্টরটি  $p$  বিন্দুতে স্পর্শকতলের উপর সম। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত উপায়ে  $p$  বিন্দুতে  $f(x, y, z) = c$  তলটির স্পর্শকতল ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করা যায় :

**স্পর্শকতল :** যদি নির্ণয় স্পর্শক তলে যেকোনো একটি বিন্দু  $Q(x, y, z)$ -এর হান ভেক্টর  $R = Xi + Yj + Zk$  হয় তবে  $R - r = \vec{PQ}$  ভেক্টরটি স্পর্শকতলে অবস্থিত হয় এবং উপরের তথ্য অনুযায়ী তলটি  $\nabla f$  ভেক্টরের সাথে সম। অতএব  $P$  বিন্দুতে  $f(x, y, z) = c$  তলের উপর স্পর্শকতলের সমীকরণ

$$(R - r) \cdot \nabla f = 0$$

স্পর্শকতলের এই সমীকরণটিকে কার্তিয় হানাকে ঝাপান্তরিত করে নিম্নলিখিত রূপে লেখা যায় :

$$\text{বা, } \{(X-x)i + (Y-y)j + (Z-z)k\} \cdot \left\{ i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \right\} = 0$$

$$\text{বা, } (X-x) \frac{\partial f}{\partial x} + (Y-y) \frac{\partial f}{\partial y} + (Z-z) \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

**অভিলম্ব :** যদি  $Q(X, Y, Z)$  বিন্দুটি  $P$  বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের উপর যেকোনো বিন্দু হয় এবং  $R = Xi + Yj + Zk$  হয় তাহলে  $R - r = \vec{PQ}$  ভেক্টরটি অভিলম্বের দিক বরাবর নির্দেশিত হয়। কিন্তু তা  $\nabla f$ -এর-মুক্ত। অতএব  $P$  বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ

$$(R - r) \times \nabla f = 0$$

$$R - r = (X - x)i + (Y - y)j + (Z - z)k \text{ এবং}$$

$$\nabla f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z} \quad \text{ভেক্টর মূটি একই দিকে নির্দেশিত,}$$

সমান্তরাল হওয়ার শর্ত থেকে পাই,

$$\frac{X-x}{\frac{\partial f}{\partial x}} = \frac{Y-y}{\frac{\partial f}{\partial y}} = \frac{Z-z}{\frac{\partial f}{\partial z}}$$

এটি একটি সরলরেখার সমীকরণ যা  $P$  বিন্দুতে  $f(x, y, z) = c$  তলের উপর অভিলম্ব।

### 8.5.1 দুটি তল দ্বারা ছেদিত বক্ররেখার কোন বিন্দুতে স্পর্শক ও লম্ব তলের সমীকরণ

$f(x,y,z) = 0$  এবং  $g(x,y,z) = 0$  তল দুটি যে বক্ররেখায় ছেদিত হয় তার উপর  $p(x,y,z)$  বিন্দুতে স্পর্শক (সরলরেখা) ও লম্বতলের সমীকরণ :

যদি স্পর্শক সরলরেখার উপর যে কোন বিন্দু  $Q(X,Y,Z)$ -এর অবস্থান ভেক্টর  $R = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k}$  এবং  $P(x,y,z)$  বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর  $r = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  তবে সার্ভিকভাবেই  $R - r = \vec{PQ}$  ভেক্টরটি  $\nabla f$  এবং  $\nabla g$  উভয় ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে। অতএব  $\vec{PQ}$  ভেক্টরটি  $\nabla f \times \nabla g$  এর সাথে সমান্তরাল হবে।

$$\therefore (R - r) \times (\nabla f \times \nabla g) = 0 \text{ হল স্পর্শকের সমীকরণ।}$$

$R - r$  এবং  $\nabla f \times \nabla g$  ভেক্টরদ্বয়ের সমান্তরাল হওয়ার শর্ত থেকে পাই

$$\frac{X-x}{f_y g_z - f_z g_y} = \frac{Y-y}{f_z g_x - f_x g_z} = \frac{Z-z}{f_x g_y - f_y g_x}$$

এটাই নির্ণয় স্পর্শকের সমীকরণ।

আবার যদি  $Q(X, Y, Z)$  বিন্দুটি  $P(x, y, z)$  বিন্দুতে লম্বতলের উপর অবস্থিত হয় তবে  $R - r$  এবং  $(\nabla f \times \nabla g)$  ভেক্টরদ্বয় লম্ব হবে। অতএব লম্বতলের সমীকরণ

$$(R - r) \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$$

$$\text{বা, } (X-x)(f_y g_z - f_z g_y) + (Y-y)(f_z g_x - f_x g_z) + (Z-z)(f_x g_y - f_y g_x) = 0$$

উদাহরণ :

১. তল  $x^2 - y^2 + 2z^2 = 2$  এর উপর  $(1, 1, 1)$  বিন্দুতে স্পর্শকতল ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$$\text{ধরা যাক } f(x, y, z) = x^2 - y^2 + 2z^2 - 2 = 0$$

$$\therefore \nabla f = i \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) + j \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) + k \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right) = i(2x) + j(-2y) + k(4z)$$

$$(\nabla f)_{(1,1,1)} = 2i - 2j + 4k$$

এখন  $(1, 1, 1)$  বিন্দুতে স্পর্শক তলে যেকোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  নিলে  $(x-1)\mathbf{i} + (y-1)\mathbf{j} + (z-1)\mathbf{k}$  ভেক্টরটি স্পর্শক তলে অবস্থিত থাকায় তা  $(\nabla f)_{(1,1,1)}$  এর সাথে লম্ব হবে। অতএব নির্ণয় স্পর্শকতলের সমীকরণ

$$[(x-1)\mathbf{i} + (y-1)\mathbf{j} + (z-1)\mathbf{k}] \cdot (2i - 2j + 4k) = 0$$

$$\text{বা, } 2(x-1) - 2(y-1) + 4(z-1) = 0$$

$$\text{বা, } (x-1) - (y-1) + 2(z-1) = 0$$

$$\text{বা, } x - y + 2z - 2 = 0$$

आवार  $(1, 1, 1)$  विन्दुगामी अभिलम्बेर उपर  $(x, y, z)$  येकोन एकटि विन्दु हले  $(x - 1)\mathbf{i} + (y - 1)\mathbf{j} + (z - 1)\mathbf{k}$  डेस्ट्रोटि  $(\nabla f)_{(1,1,1)}$  एवं साथे समान्तराल हवे। आतेव निर्णय अभिलम्बेर समीकरण

$$[(x-1)\mathbf{i} + (y-1)\mathbf{j} + (z-1)\mathbf{k}] \times (2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}) = 0$$

$$\text{वा, } \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{4} \quad [\text{समान्तराल होयार शर्त देके}]$$

$$\text{वा, } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$$

2:  $yz + zx + 2xy = 0$  एवं  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$  तलधयेर देदित बजेचे उपर  $(1, 1, -1)$  विन्दूते स्पर्शकरेखा ओ लम्बत्तेलेर समीकरण निर्णय कळून।

समाधान :

यदि  $f(x, y, z) = yz + zx + 2xy = 0$  एवं  $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3 = 0$  हय तबे  $f_x = z + 2y$ ,  $f_y = z + 2x$ ,  $f_z = y + x$ ,  $g_x = 2x$ ,  $g_y = 2y$ ,  $g_z = 2z$  एवं  $(1, 1, -1)$  विन्दूते एगुलिर मान  $f_x = 1$ ,  $f_y = 1$ ,  $f_z = 2$ ,  $g_x = 2$ ,  $g_y = 2$ ,  $g_z = -2$ .

$$\therefore \text{निर्णय स्पर्शकेर समीकरण } \frac{x-1}{1.(-2)-2.2} = \frac{y-1}{2.2-(-2).1} = \frac{z+1}{1.2-1.2}$$

$$\text{वा, } \frac{x-1}{-6} = \frac{y-1}{6} = \frac{z+1}{0}$$

$$\text{वा, } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1}, z+1=0$$

$$\text{निर्णय लम्बत्तेलेर समीकरण } (x-1).(-6) + (y-1).6 + (z+1).0 = 0$$

$$\text{वा, } x - y = 0$$

## 8.6 डाइडारजेस एवं कार्ल

(A) डाइडारजेस : धरा याकृ  $f(x, y, z)$  एकटि डेस्ट्रोट पयेस्ट फांशन यार सन्तुत आंशिक अवकलज आहे।

$i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$  फांशनाटिके  $f$  फांशनेर डाइडारजेस वले। एटि एकटि क्षेलार पयेस्ट फांशन एवं एके  $\operatorname{div} f$  वा  $\nabla f$  द्वारा सूचित करा हय।

$$\therefore \operatorname{div} f = i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$$

$$= \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) f$$

$$= \nabla \cdot f$$

আবার  $\mathbf{f}$ -কে উপাংশে বিশ্লেষণ করে

$$\mathbf{f}(x, y, z) = f_1(x, y, z) \mathbf{i} + f_2(x, y, z) \mathbf{j} + f_3(x, y, z) \mathbf{k},$$

(যখন  $f_1, f_2, f_3$  ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন), এইভাবে লিখলে

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (if_1 + jf_2 + kf_3)$$

$$= \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \quad [\because i.i = j.j = k.k = 1 \text{ এবং } i.j = j.k = k.i = 0]$$

**সোলেনয়ডাল (Solenoidal)** ভেক্টর : যদি  $\operatorname{div} \mathbf{f} = 0$  হয় তবে ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f}$ -কে সোলেনয়ডাল ভেক্টর বলে।

(B) কার্ল : সম্পৃক্ত আংশিক অবকলজ আছে এমন একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f}(x, y, z) = if_1(x, y, z) + jf_2(x, y, z) + kf_3(x, y, z)$  (যখন  $f_1, f_2, f_3$  ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন) এর জন্য

$$i \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + j \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + k \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z}$$

ফাংশনটিকে  $\mathbf{f}$ -এর কার্ল বলে। এটি একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন এবং একে  $\operatorname{curl} \mathbf{f}$  বা  $\nabla \times \mathbf{f}$  বা  $\operatorname{rot} \mathbf{f}$  ধারা সূচিত করা হয়।

$$\therefore \operatorname{curl} \mathbf{f} = i \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + j \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + k \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} = \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \times \mathbf{f} = \nabla \times \mathbf{f}$$

আবার  $\mathbf{f}$ -কে উপাংশে বিশ্লেষণ করে লিখলে

$$\operatorname{curl} \mathbf{f} = \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (if_1 + jf_2 + kf_3)$$

$$= i \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + j \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + k \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

**অনাবর্তনশীল (Irrotational)** ভেক্টর : যদি  $\operatorname{curl} \mathbf{f} = 0$  হয় তবে ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f}$ -কে অনাবর্তনশীল ভেক্টর বলে।

### 8.6.1 ডাইভারজেন্স এবং কার্ল সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রাবলী :

(A) যদি  $f(x, y, z)$  এবং  $g(x, y, z)$  দুটি অবকলনযোগ্য ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন হয় তবে

$$\operatorname{div}(f \pm g) = \operatorname{div} f \pm \operatorname{div} g$$

$$\operatorname{curl}(f \pm g) = \operatorname{curl} f \pm \operatorname{curl} g$$

$$\text{প্রমাণ: } \operatorname{div}(f \pm g) = i \cdot \frac{\partial}{\partial x}(f \pm g) + j \cdot \frac{\partial}{\partial y}(f \pm g) + k \cdot \frac{\partial}{\partial z}(f \pm g)$$

$$= \left( i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z} \right) \pm \left( i \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial g}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial g}{\partial z} \right)$$

$$= \operatorname{div} f \pm \operatorname{div} g.$$

$$\operatorname{curl}(f \pm g) = i \times \frac{\partial}{\partial x}(f \pm g) + j \times \frac{\partial}{\partial y}(f \pm g) + k \times \frac{\partial}{\partial z}(f \pm g)$$

$$= \left( i \times \frac{\partial f}{\partial x} + j \times \frac{\partial f}{\partial y} + k \times \frac{\partial f}{\partial z} \right) \pm \left( i \times \frac{\partial g}{\partial x} + j \times \frac{\partial g}{\partial y} + k \times \frac{\partial g}{\partial z} \right)$$

$$= \operatorname{curl} f \pm \operatorname{curl} g$$

(B) যদি  $u(x, y, z)$  একটি ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন এবং  $f(x, y, z)$  একটি ভেস্টের পয়েন্ট ফাংশন হয় এবং  
যদি উভয়েই অবকলনযোগ্য হয় তবে

$$\operatorname{div}(uf) = (\operatorname{grad} u) \cdot f + u \operatorname{div} f$$

$$\operatorname{curl}(uf) (\operatorname{grad} u) \times f + u \operatorname{curl} f$$

$$\text{প্রমাণ: } \operatorname{div}(uf) = i \cdot \frac{\partial}{\partial x}(uf) + j \cdot \frac{\partial}{\partial y}(uf) + k \cdot \frac{\partial}{\partial z}(uf)$$

$$= i \cdot \left( \frac{\partial u}{\partial x} f + u \frac{\partial f}{\partial x} \right) + j \cdot \left( \frac{\partial u}{\partial y} f + u \frac{\partial f}{\partial y} \right) + k \cdot \left( \frac{\partial u}{\partial z} f + u \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

$$= \left( i \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial u}{\partial y} + k \frac{\partial u}{\partial z} \right) \cdot f + u \left( i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

$$= (\operatorname{grad} u) \cdot f + u \operatorname{div} f$$

$$\operatorname{curl}(uf) = i \times \frac{\partial}{\partial x}(uf) + j \times \frac{\partial}{\partial y}(uf) + k \times \frac{\partial}{\partial z}(uf)$$

$$= \sum i \times \frac{\partial}{\partial x}(uf)$$

$$= \sum i \times \left( \frac{\partial u}{\partial x} f + u \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$= \left( \sum i \frac{\partial u}{\partial x} \right) \times f + u \left( \sum i \times \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$= (\text{grad } u) \times f + u \text{curl } f$$

(c) যদি  $f(x, y, z)$  এবং  $g(x, y, z)$  দুটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন হয় তবে

$$\text{grad}(f \cdot g) = f \times \text{curl } g + g \times \text{curl } f + (f \cdot \nabla)g + (g \cdot \nabla)f$$

$$\text{div}(f \times g) = (\text{curl } f) \cdot g - f \cdot \text{curl } g$$

$$\text{curl}(f \times g) = f \text{div } g - g \text{div } f + (g \cdot \nabla)f - (f \cdot \nabla)g$$

প্রমাণ :  $\text{grad}(f \cdot g) = i \frac{\partial}{\partial x}(f \cdot g) + j \frac{\partial}{\partial y}(f \cdot g) + k \frac{\partial}{\partial z}(f \cdot g) \dots \dots \text{(i)}$

$$\text{এখন প্রথম পদ} = i \frac{\partial}{\partial x}(f \cdot g) = i \left( f \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot g \right)$$

$$= i \left( f \cdot \frac{\partial g}{\partial x} \right) + i \left( \frac{\partial f}{\partial x} \cdot g \right)$$

$$= \left( f \cdot \frac{\partial g}{\partial x} \right) i + \left( g \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \right) i$$

$$= \left[ f \times \left( i \times \frac{\partial g}{\partial x} \right) + (f \cdot i) \frac{\partial g}{\partial x} \right] + \left[ g \times \left( i \times \frac{\partial f}{\partial x} \right) + (g \cdot i) \frac{\partial f}{\partial x} \right]$$

$$[\because a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c \Rightarrow (a \cdot c)b = a \times (b \times c) + (a \cdot b)c]$$

$$= f \times \left( i \times \frac{\partial g}{\partial x} \right) + g \times \left( i \times \frac{\partial f}{\partial x} \right) + (f \cdot i) \frac{\partial g}{\partial x} + (g \cdot i) \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$= \mathbf{j} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}) = \mathbf{f} \times \left( \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{g} \times \left( \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \right) + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + (\mathbf{g} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y}$$

এবং তৃতীয় পদ

$$= \mathbf{k} \cdot \frac{\partial}{\partial z} (\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}) = \mathbf{f} \times \left( \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) + \mathbf{g} \times \left( \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} + (\mathbf{g} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z}$$

এই মানগুলি (i) নং-এ বসিয়ে পাই

$$\begin{aligned} \text{grad}(\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}) &= \mathbf{f} \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) + \mathbf{g} \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) \\ &\quad + \left[ (\mathbf{f} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right] + \left[ (\mathbf{g} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + (\mathbf{g} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + (\mathbf{g} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right] \\ &= \mathbf{f} \times \text{curl } \mathbf{g} + \mathbf{g} \times \text{curl } \mathbf{f} + (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g} + (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} \\ &\left[ \because (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{i} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + \mathbf{f} \cdot \mathbf{j} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + \mathbf{f} \cdot \mathbf{k} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} = (\mathbf{f} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + (\mathbf{f} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \text{ ইত্যাদি } \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{div}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) &= \mathbf{i} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{j} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{k} \cdot \frac{\partial}{\partial z} (\mathbf{f} \times \mathbf{g}) \\ &= \mathbf{i} \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) + \mathbf{j} \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{k} \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \\ &= \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} + \mathbf{j} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} + \mathbf{k} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} \right) + \left( \mathbf{i} \cdot \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \\ &= \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \cdot \mathbf{g} \right) - \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \cdot \mathbf{f} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \cdot \mathbf{f} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \cdot \mathbf{f} \right) \\ &\left[ \because \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \text{ এবং } \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{b}) = -(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} \right] \end{aligned}$$

$$= \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) \cdot \mathbf{g} - \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \cdot \mathbf{f}$$

$$= (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{g} - (\operatorname{curl} \mathbf{g}) \cdot \mathbf{f}$$

$$\operatorname{curl}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) = \mathbf{i} \times \frac{\partial}{\partial x}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{j} \times \frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{k} \times \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{f} \times \mathbf{g})$$

$$= \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) + \mathbf{j} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{k} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right)$$

$$= \left\{ \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} \right) + \mathbf{j} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} \right) + \mathbf{k} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} \right) \right\} + \left\{ \mathbf{i} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) + \mathbf{j} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{k} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \right\}$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} \right) + \sum \mathbf{i} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right)$$

$$= \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \mathbf{g} \right) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} - \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) \mathbf{g} \right\} + \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) \mathbf{f} - \left( \mathbf{i} \cdot \mathbf{f} \right) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right\}$$

$$[\because \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}]$$

$$= \sum (\mathbf{g} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} - \sum \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) \mathbf{g} + \sum \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) \mathbf{f} - \sum (\mathbf{f} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x}$$

$$= (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\operatorname{div} \mathbf{f}) \mathbf{g} + (\operatorname{div} \mathbf{g}) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g}$$

$$\left[ \because (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{j} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{k} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} = \sum (\mathbf{g} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right]$$

$$= \mathbf{f} \operatorname{div} \mathbf{g} - \mathbf{g} \operatorname{div} \mathbf{f} + (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g}$$

## 8.6.2 ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମେର ଡିଫାରେଲିଆଲ ଅପାରେଟର (Second Order Differential Operator) :

যদি  $\phi(x, y, z)$  କ୍ଷେତ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ ଏবଂ  $f(x, y, z)$  ଭେଟ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ ହୁଏ ତବେ  $\text{grad } \phi$  ଏବଂ  $\text{curl } f$  ଉଭୟେଇ ଭେଟ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ; ତାହା ଏହି ଉଭୟ ଫାଂଶନେରେଇ ଡାଇଭାରଜେଲ ଏବଂ କାର୍ଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଆବାର ଯେହେତୁ  $\text{div } f$  ଏକଟି କ୍ଷେତ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ  $\text{grad} (\text{div } f)$  ଏହି ଭେଟ୍ରର ଫାଂଶନଟିରେ ଅନ୍ତିତ ଥାକିଲେ ପାରେ । ଏହି ଫାଂଶନଟିଲିର ଜନ୍ମ ସୃଦ୍ଧ ବା ମାନ ଏଥିନ ଆମରା ଏକେ ଏକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।

$$\begin{aligned}
 (A) \quad \text{div grad } \phi &= \nabla \cdot (\nabla \phi) = \text{div} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= i \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + j \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \cdot \frac{\partial}{\partial z} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \sum i \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \sum \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + 0 + 0 \right) \quad [ \because i \cdot i = 1, i \cdot j = 0 = i \cdot k \text{ ଇତ୍ୟାଦି } ] \\
 &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \nabla^2 \phi \\
 \therefore \quad \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}
 \end{aligned}$$

ଏହି  $\nabla^2$  ଅପାରେଟରଟିକେ ଲ୍ୟାପଲାସେର ଅପାରେଟର (Laplace's Operator) ବା Laplacian ବିଲେ ।

$\nabla^2 \phi = 0$  ସମୀକରଣଟିକେ ଲ୍ୟାପଲାସେର ସମୀକରଣ ବଲା ହୁଏ ।

$$\therefore \text{div} (\text{grad } \phi) = \nabla^2 \phi$$

$$\begin{aligned}
 (B) \quad \text{curl} (\text{grad } \phi) &= \text{curl} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= i \times \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + j \times \frac{\partial}{\partial y} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \times \frac{\partial}{\partial z} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \left( k \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - j \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} \right) + \left( -k \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} + i \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} \right) + \left( j \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} - i \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} \right) \\
 &\quad [ \because i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j \quad j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j ]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 \quad \left[ \because \text{ଏଥାନେ } \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} \text{ ଇତ୍ୟାଦି } \right]
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{curl} (\text{grad } \phi) = 0$$

$$(c) \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{f})$$

$$= \nabla \cdot \left\{ \mathbf{i} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \mathbf{k} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \right\}$$

$\because \mathbf{f} = f_1 \mathbf{i} + f_2 \mathbf{j} + f_3 \mathbf{k}$  হলে  $\nabla \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned} &= \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) \left\{ \mathbf{i} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \mathbf{k} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \right\} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

$$= 0 \quad [\because \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \text{ এবং } \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0]$$

$$\therefore \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = 0$$

$$(D) \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{f}) = \nabla \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right)$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \frac{\partial}{\partial x} \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right)$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} + \mathbf{j} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right)$$

$$= \sum \left[ \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right) \mathbf{i} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right\} + \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{j} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right\} + \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{k} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right\} \right]$$

$$= \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right) \mathbf{i} + \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{j} + \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{k} \right\} - \sum \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2}$$

$$= (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xx}) \mathbf{i} + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xy}) \mathbf{j} + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xz}) \mathbf{k} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yx}) \mathbf{i} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yy}) \mathbf{j} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yz}) \mathbf{k}$$

$$+ (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{zx}) \mathbf{i} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{zy}) \mathbf{j} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{xz}) \mathbf{k} - \sum \mathbf{f}_{xx} \quad \left[ \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} = \mathbf{f}_{xx}, \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} = \mathbf{f}_{xy} \text{ ইত্যাদি নিখে} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= i \left\{ (i \cdot f_{xx} + j \cdot f_{yx} + k \cdot f_{zz}) \right\} + j \left\{ (i \cdot f_{yy}) + (j \cdot f_{yy}) + (k \cdot f_{yy}) \right\} \\
&\quad + k \left\{ (i \cdot f_{zz}) + (j \cdot f_{yz}) + (k \cdot f_{zz}) \right\} - \sum f_{ii} \\
&= i \frac{\partial}{\partial x} (i \cdot f_{xx} + j \cdot f_{xy} + k \cdot f_{zz}) + j \frac{\partial}{\partial y} (i \cdot f_{xy} + j \cdot f_{yy} + k \cdot f_{yz}) + k \frac{\partial}{\partial z} (i \cdot f_{zz} + j \cdot f_{yz} + k \cdot f_{yy}) - \sum f_{ii} \\
&\quad \quad \quad [\because f_{xy} = f_{yz}] \\
&= i \frac{\partial}{\partial x} (\operatorname{div} \mathbf{f}) + j \frac{\partial}{\partial y} (\operatorname{div} \mathbf{f}) + k \frac{\partial}{\partial z} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f} \quad \left[ \because \sum f_{ii} = \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial z^2} = \nabla^2 \mathbf{f} \right] \\
&= \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}
\end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}$$

**ঝষ্টব্য :** আমরা জানি  $\nabla^2 \phi = \operatorname{div} (\operatorname{grad} \phi)$  যখন  $\phi$  ক্ষেত্রের ফাংশন।  $\nabla^2 \mathbf{f} = \operatorname{div} (\operatorname{grad} \mathbf{f})$  লিখলে তা সংজ্ঞায়িত হয় না যেহেতু  $\mathbf{f}$  একটি ভেষ্টের ফাংশন।

(E) উপরোক্ত আলোচনা (D)-এর সূত্র থেকে পাই—

$$\operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}$$

$$\therefore \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) = \operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) + \nabla^2 \mathbf{f}$$

## 8.7 $\operatorname{div} \mathbf{f}$ এবং $\operatorname{curl} \mathbf{f}$ -এর ব্যবহারিক বিষয়ে আলোচনা

(A) যদি একটি দৃঢ় বস্তু (Rigid body) কোনো বিন্দুর চারদিকে  $w$  কৌণিক বেগে আবর্তিত হতে থাকে তবে যে বস্তুকণার হান ভেষ্টের  $r$  তার বৈধিক বেগ  $v$  হলে গতিবিদ্যার সূত্র থেকে আমরা জানি

$$v = w \times r,$$

এখানে  $v$  ভেষ্টেরটি বিভিন্ন অবস্থানের বস্তুকণার জন্য বিভিন্ন, অর্থাৎ  $v$  একটি ভেষ্টের পয়েন্ট ফাংশন কিন্তু  $w$  ভেষ্টেরটি সকল বস্তুকণার জন্য একই।

$$\text{অঙ্গএব } \operatorname{curl} v = \operatorname{curl} (w \times r)$$

$$\begin{aligned}
&= i \times \frac{\partial}{\partial x} (w \times r) + j \times \frac{\partial}{\partial y} (w \times r) + k \times \frac{\partial}{\partial z} (w \times r) \\
&= i \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial x} \right) + j \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial y} \right) + k \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial z} \right) \quad [\because w \text{ একটি ফ্রেক ভেষ্টের}] \\
&= i \times (w \times i) + j \times (w \times j) + k \times (w \times k)
\end{aligned}$$

$$= \sum i \times (w \times i)$$

$$= \sum \{(i \cdot i) w - (i \cdot w)i\}$$

[ ভেস্টের গুণনের নিয়মানুযায়ী ]

$$= \sum \{(i \cdot i) w - (i \cdot w)i\}$$

$$= 3w - w$$

$$[\because (i \cdot i) w = (i \cdot i) w + (j \cdot j) \cdot w + (k \cdot k) w]$$

$$= 2w$$

$$\text{এবং } \sum (i \cdot w) i = w_1 i + w_2 j + w_3 k = w$$


যদি  $w = w_1 i + w_2 j + w_3 k$  হলে  $(i \cdot w) = w_1$  ইত্যাদি ]

অতএব কোনো আবর্তনশীল দৃঢ় বস্তুর কোনো কণার রৈখিক বেগের curl বস্তুটির কৌণিক বেগের দিশের সমান। সেইভাবে কোনো ভেস্টের ফাঁশনের curl-কে rotation বা সংক্ষেপে rot দিয়েও চিহ্নিত করা হয়।

(B) ধরা যাক কোনো গতিশীল তরলের কোনো বিন্দু  $P(x, y, z)$ -তে গতির ফিল্ড  $U(x, y, z) = u_1(x, y, z)i + u_2(x, y, z)j + u_3(x, y, z)k$ . এই  $P$  বিন্দুকে কেন্দ্রস্থলে রেখে খুব ছোট একটি আয়তন কঙ্গনা করা হল যার ধারণানি (edges) হালাক অক্ষগুলির মধ্যে সমান্তরাল এবং তাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে  $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ । গতি ভেস্টের যেভাবে ধরা হয়েছে সেই অনুযায়ী EFGH তল দিয়ে যে গতিতে তরল বহিগত হচ্ছে তা

$$u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \text{ এবং একক সময়ে ঐ তলদিয়ে যে পরিমাণ তরল বহিগত হচ্ছে তা } u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \Delta x \cdot \Delta z$$

$$\text{তার আয়তন } \left[ u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) + \frac{\Delta y}{2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z, \Delta y \text{ এর দ্বিতীয় }$$



চিত্র : 8.3

এবং তার অধিক ঘাত বিশিষ্ট পদগুলিকে অগ্রহ্য করে। আবার ঠিক একই ভাবে, যেহেতু ABCD তলে তরলের গতি  $u_2 \left( x, y - \frac{\Delta y}{2}, z \right)$  একক সময়ে ঐ তল দিয়ে যে পরিমাণ তরল ঐ আয়তঘনের ভিতরে থাবে করছে তার আয়তন  $\left[ u_2 \left( x, y, z \right) - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z$

$$= \left[ u_2 (x, y, z) + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial}{\partial y} u_2 (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z - \left[ u_2 (x, y, z) - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z$$

অতএব ঐ দুটি তল দিয়ে মোট যে পরিমাণ তরল বেরিয়ে যায় তার মোট আয়তন

$$= \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$= \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$$

অনুসরে অন্য দুই জোড়া তল দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তরল বেরিয়ে যায় তার আয়তন  
 $\frac{\partial u_3}{\partial z}(x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$  এবং  $\frac{\partial u_1}{\partial x}(x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$

অতএব একক সময়ে মোট নির্গত তরলের আয়তন

$$= \left( \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial u_3}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z = (\operatorname{div} u) \Delta x \Delta y \Delta z$$

$\therefore \Delta x \Delta y \Delta z$  দিয়ে ভাগ করে এবং  $\Delta x \Delta y \Delta z \rightarrow 0$  লিমিট নিয়ে পাই

একক সময়ে একক আয়তন থেকে নির্গত তরলের আয়তন =  $\operatorname{div} u$

উদাহরণ :

1. যদি  $\mathbf{f}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$  হয় তবে নিম্নলিখিত মানগুলি নির্ণয় করুন :

- (a)  $\operatorname{div} \mathbf{f}$ , (b)  $\operatorname{curl} \mathbf{f}$ , (c)  $\operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f})$ , (d)  $\operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f})$

সমাধান :

$$(a) \operatorname{div} \mathbf{f} = \left( \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k})$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(zx)$$

$$= y + z + x$$

$$(b) \operatorname{curl} \mathbf{f} = \left( \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k})$$

$$= \mathbf{i} \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(zx) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right\} + \mathbf{j} \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(xy) - \frac{\partial}{\partial x}(zx) \right\} + \mathbf{k} \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right\}$$

$$= \mathbf{i}(0 - y) + \mathbf{j}(0 - z) + \mathbf{k}(0 - x)$$

$$= -(y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k})$$

$$(c) \quad \text{grad}(\text{div } \mathbf{f}) = \text{grad}(x + y + z) \quad [(a) \text{ থেকে } \text{div } \mathbf{f} = x + y + z]$$

$$\begin{aligned} &= i \frac{\partial}{\partial x} (x + y + z) + j \frac{\partial}{\partial y} (x + y + z) + k \frac{\partial}{\partial z} (x + y + z) \\ &= i \cdot 1 + j \cdot 1 + k \cdot 1 \\ &= i + j + k \end{aligned}$$

$$(d) \quad \text{curl}(\text{curl } \mathbf{f}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & -z & -x \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= i \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(-z) \right\} + j \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(-y) - \frac{\partial}{\partial x}(-x) \right\} + k \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(-z) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) \right\} \\ &= i(0+1) + j(0+1) + k(0+1) \\ &= i + j + k \end{aligned}$$

2.  $\mathbf{f} = y \sin x \mathbf{i} + z \sin y \mathbf{j} + x \sin z \mathbf{k}$  হলে  $\left( \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$  বিন্দুতে  $\text{div } \mathbf{f}$  এবং  $\text{curl } \mathbf{f}$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $\text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial}{\partial x}(y \sin x) + \frac{\partial}{\partial y}(z \sin y) + \frac{\partial}{\partial z}(x \sin z)$

$$= y \cos x + z \cos y + x \cos z$$

$$\left( \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \text{ বিন্দুতে } \text{div } \mathbf{f} \text{ এর মান} = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}$$

$$= 3 \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\begin{aligned} &= i \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(x \sin z) - \frac{\partial}{\partial z}(z \sin y) \right\} + j \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(y \sin x) - \frac{\partial}{\partial x}(x \sin x) \right\} + k \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(z \sin y) - \frac{\partial}{\partial y}(y \sin x) \right\} \\ &= i(0 - \sin y) + j(0 - \sin z) + k(0 - \sin x) \\ &= -(i \sin y + j \sin z + k \sin x) \end{aligned}$$

$\therefore (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$  বিশুলে curl  $\mathbf{f}$  এর মান

$$= -(\mathbf{i} \sin \frac{\pi}{2} + \mathbf{j} \sin \frac{\pi}{2} + \mathbf{k} \sin \frac{\pi}{2}) \\ = -(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

3. যদি  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  হয় তবে দেখান যে

(a)  $\operatorname{div} \mathbf{r} = 3$  এবং (b)  $\operatorname{curl} \mathbf{r} = 0$

সমাধান : (a)  $\operatorname{div} \mathbf{r} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1+1+1=3$

$$= i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(y) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(x) - \frac{\partial}{\partial x}(z) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial y}(x) \right] \\ = 0$$

4. যদি  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  এবং  $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$  (ক্রবক ভেক্টর) হয় তবে দেখান যে

(a)  $\operatorname{div}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = 0$  (b)  $\operatorname{curl}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = -2\mathbf{a}$

সমাধান :

$$\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = i(a_3y - a_2z) + j(a_1z - a_3x) + k(a_2x - a_1y)$$

$$(a) \operatorname{div}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = \frac{\partial}{\partial x}(a_3y - a_2z) + \frac{\partial}{\partial y}(a_1z - a_3x) + \frac{\partial}{\partial z}(a_2x - a_1y) \\ = 0+0+0=0$$

$$(b) \operatorname{curl}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_1y - a_2z & a_1z - a_3x & a_2x - a_1y \end{vmatrix} \\ = i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(a_1x - a_1y) - \frac{\partial}{\partial z}(a_1z - a_3x) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(a_1y - a_2z) - \frac{\partial}{\partial x}(a_2x - a_1y) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(a_1z - a_3x) - \frac{\partial}{\partial y}(a_2y - a_2z) \right] \\ = i(-a_1 - a_1) + j(-a_2 - a_2) + k(-a_3 - a_3) \\ = -2a_1\mathbf{i} - 2a_2\mathbf{j} - 2a_3\mathbf{k} = -2(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) = -2\mathbf{a}$$

5.  $\mathbf{f}(x, y, z) = (x + y^2)\mathbf{i} + (ay + z^2)\mathbf{j} + (az + x^2)\mathbf{k}$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হলে a-এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $\mathbf{f}$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হওয়ার শর্ত  $\operatorname{div} \mathbf{f} = 0$

$$\text{বা, } \frac{\partial}{\partial x}(x + y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(ay + z^2) + \frac{\partial}{\partial z}(az + x^2) = 0$$

$$\text{বা, } 1 + a + a = 0 \quad \text{বা, } a = -\frac{1}{2}$$

6. দেখান যে  $\mathbf{f}(x, y, z) = (xe^x + y^2 \cos x)\mathbf{i} + (2y \sin x + z)\mathbf{j} + (y + \log z)\mathbf{k}$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল (irrotational)।

সমাধান : প্রদত্ত ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হবে যদি  $\operatorname{curl} \mathbf{f} = 0$  হয়।

$$\begin{aligned} \text{এখন } \operatorname{curl} \mathbf{f} &= \mathbf{i} \left[ \frac{\partial}{\partial y} (y + \log z) - \frac{\partial}{\partial z} (2y \sin x + z) \right] + \mathbf{j} \left[ \frac{\partial}{\partial z} (xe^x + y^2 \cos x) - \frac{\partial}{\partial x} (y + \log z) \right] \\ &\quad + \mathbf{k} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (2y \sin x + z) - \frac{\partial}{\partial y} (xe^x + y^2 \cos x) \right] \\ &= \mathbf{i}[1 - 1] + \mathbf{j}[2y \cos x - 2y \cos x] \\ &= \mathbf{i} \cdot 0 + \mathbf{j} \cdot 0 + \mathbf{k} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore \mathbf{f}$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল।

7. যদি  $\phi(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$  হয় তবে  $\operatorname{div} \operatorname{grad} \phi$  এবং  $\operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi$  এর মান নির্ণয় করুন।

$$\text{সমাধান : } \operatorname{grad} \phi = \mathbf{i} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$= \mathbf{i}(3x^2 - 3yz) + \mathbf{j}(3y^2 - 3xz) + \mathbf{k}(3z^2 - 3xy)$$

$$\begin{aligned} \therefore \operatorname{div}(\operatorname{grad} \phi) &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 3yz) + \frac{\partial}{\partial y}(3y^2 - 3xz) + \frac{\partial}{\partial z}(3z^2 - 3xy) \\ &= 6x + 6y + 6z \\ &= 6(x + y + z), \end{aligned}$$

$$\text{এবং } \operatorname{curl}(\operatorname{grad} \phi) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x^2 - 3yz & 3y^2 - 3xz & 3z^2 - 3xy \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{i} \left[ \frac{\partial}{\partial y} (3z^2 - 3xy) - \frac{\partial}{\partial z} (3y^2 - 3xz) \right] + \mathbf{j} \left[ \frac{\partial}{\partial z} (3x^2 - 3yz) - \frac{\partial}{\partial x} (3z^2 - 3xy) \right] \\
 &\quad + \mathbf{k} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (3y^2 - 3xz) - \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 - 3yz) \right] \\
 &= \mathbf{i}(-3x + 3x) + \mathbf{j}(-3y + 3y) + \mathbf{k}(-3z + 3z) \\
 &= \mathbf{i} \cdot 0 + \mathbf{j} \cdot 0 + \mathbf{k} \cdot 0 = 0
 \end{aligned}$$

8. যখন  $\mathbf{r} = xi + yi + zk$  এবং  $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  তখন দেখান যে  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r^n) = \nabla^2 r^n$   
 $n(n+1)r^{n-2}$  এবং  $\operatorname{curl}(\operatorname{grad} r^n) = 0$

সমাধান : যেহেতু  $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$ ,  $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}-1} \cdot 2x$

$$= \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{r}$$

$$\therefore \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

$$\text{আবার, } \frac{\partial}{\partial x} (r^n) = nr^{n-1} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = nr^{n-1} \cdot \frac{x}{r} = nxr^{n-2}$$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2} (r^n) = n \cdot 1 \cdot r^{n-2} + nx(n-2)r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial x}$$

$$= n \left[ r^{n-2} + x(n-2)r^{n-3} \cdot \frac{x}{r} \right]$$

$$= nr^{n-2} [1 + (n-2)x^2 \cdot r^{-2}]$$

$$\text{অনুসরণে } \frac{\partial^2}{\partial y^2}(r^n) = nr^{n-2} [1 + (n-2)y^2 \cdot r^{-2}] \text{ এবং } \frac{\partial^2}{\partial z^2}(r^n) = nr^{n-2} [1 + (n-2)z^2 r^{-2}]$$

$$\therefore \operatorname{div}(\operatorname{grad} r^n) = \nabla^2(r^n) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(r^n) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(r^n) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(r^n)$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)r^{-2}(x^2 + y^2 + z^2)]$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)r^{-2} \cdot r^2]$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)] = n(n+1)r^{n-2}$$

$$\text{এখন } \operatorname{grad}(r^n) = i \frac{\partial}{\partial x}(r^n) + j \frac{\partial}{\partial y}(r^n) + k \frac{\partial}{\partial z}(r^n)$$

$$= i nxr^{n-2} + j ny r^{n-2} + k nz r^{n-2}$$

$$\therefore \operatorname{curl}(\operatorname{grad} r^n) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ nxr^{n-2} & ny r^{n-2} & nz r^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(nzr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial z}(nyr^{n-2}) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(nxr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial x}(nzr^{n-2}) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(nyr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial y}(nxr^{n-2}) \right]$$

$$= i \left[ nz(n-2)r^{n-3} \left( \frac{y}{r} \right) - ny(n-2)r^{n-3} \left( \frac{z}{r} \right) \right] + j \left[ nx(n-2)r^{n-3} \left( \frac{z}{r} \right) - nz(n-2)r^{n-3} \left( \frac{x}{r} \right) \right]$$

$$+ k \left[ ny(n-2)r^{n-3} \frac{x}{y} - nx(n-2)r^{n-3} \frac{y}{x} \right]$$

$$\left. \quad \quad \quad \left[ \because \frac{\partial r^{n-2}}{\partial y} = (n-2)r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = (n-2)r^{n-3} \cdot \frac{y}{r} \right] \right]$$

$$= n(n-2)r^{n-4} [i(yz - yz) + j(zx - zx) + k(xy - xy)]$$

$$= n(n-2)r^{n-4} [i \cdot 0 + j \cdot 0 + k \cdot 0]$$

$$= 0$$

9. যদি  $f$  এবং  $g$  ভেক্টর দুটি অনাবর্তনশীল (irrotational) হয় তবে প্রমাণ করুন যে  $f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল।

প্রমাণ : শর্তানুসারে  $\operatorname{curl} f = 0$  এবং  $\operatorname{curl} g = 0$ .

$f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হতে হলে  $\operatorname{div}(f \times g) = 0$  হতে হবে।

এখন, সূত্র থেকে পাই

ইত্যাদি

$$\operatorname{div}(f \times g) = (\operatorname{curl} f) \cdot g - (\operatorname{curl} g) \cdot f$$

$$= 0 - 0 \quad [\because \operatorname{curl} f = 0 \text{ এবং } \operatorname{curl} g = 0]$$

$$= 0$$

অতএব  $f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল।

10. যদি  $f(x, y, z) = (2x - ay + 3z)i + (4x - 5y + bz)j + (cx - 7y + 6z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হয় তবে  $a, b, c$  এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $f$  ভেক্টর অনাবর্তনশীল হওয়ার শর্ত  $\operatorname{curl} f = 0$

$$\text{বা, } \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - ay + 3z & 4x - 5y + bz & cx - 7y + 6z \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{বা, } i \left[ \frac{\partial}{\partial y} (cx - 7y + 6z) - \frac{\partial}{\partial z} (4x - 5y + bz) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z} (2x - ay + 3z) - \frac{\partial}{\partial x} (cx - 7y + 6z) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x} (4x - 5y + bz) - \frac{\partial}{\partial y} (2x - ay + 3z) \right] = 0$$

$$\text{বা, } i(-7 - b) + j(3 - c) + k(4 + a) = 0$$

$$\therefore -7 - b = 0, 3 - c = 0 \text{ এবং } 4 + a = 0$$

$$\therefore b = -7, c = 3, a = -4.$$

11. দেখান যে  $\nabla^2 f(r) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r)$ , যখন  $f(r)$  ক্ষেপার ফাংশনটির সম্মত অবকল্প সহগ আছে।

$$\frac{\partial}{\partial x} f(r) = \frac{\partial}{\partial r} f(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \cdot \frac{x}{r} \quad \left[ \because r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow 2r \frac{\partial r}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(r) = \frac{\partial}{\partial x} \left[ f'(r) \cdot \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{\left\{1.f'(r) + x f''(r) \cdot \frac{x}{r}\right\}r - x f'(r) \cdot \frac{x}{r}}{r^2} \quad \left[ \because \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{f'(r)}{r} + \frac{x^2 f''(r)}{r^2} - \frac{x^2 f'(r)}{r^3}$$

অনুরূপে  $\frac{\partial^2 f(r)}{\partial y^2} = \frac{f'(r)}{r} + \frac{y^2 f''(r)}{r^2} - \frac{y^2 f'(r)}{r^3}$

এবং  $\frac{\partial^2 f(r)}{\partial z^2} = \frac{f'(r)}{r} + \frac{z^2 f''(r)}{r^2} - \frac{z^2 f'(r)}{r^3}$

$$\therefore \nabla^2 f(r) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(r)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f(r)}{\partial z^2} = \frac{3f'(r)}{r} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^2} f''(r) - \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} f'(r)$$

$$= \frac{3f'(r)}{r} + \frac{r^2}{r^2} f''(r) - \frac{r^2}{r^3} f'(r) = \frac{3f'(r)}{r} + f''(r) - \frac{1}{r} f'(r)$$

$$= \frac{2}{r} f'(r) + f''(r)$$

12. দেখান যে  $(f \cdot \nabla)\phi = f(\nabla\phi)$ , যখন  $f(x, y, z) = if_1(x, y, z) + jf_2(x, y, z) + kf_3(x, y, z)$

এবং  $\phi$  একটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন।

সমাধান : বামপক্ষ :  $(f \cdot \nabla)\phi = \left[ (if_1 + jf_2 + kf_3) \cdot \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \right] \phi$

$$= \left[ f_1 \frac{\partial}{\partial x} + f_2 \frac{\partial}{\partial y} + f_3 \frac{\partial}{\partial z} \right] \phi$$

$$= f_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + f_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + f_3 \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad \begin{aligned} & [\because i.i = j.j = k.k = 1 \text{ এবং} \\ & i.j = j.k = k.i = 0] \end{aligned}$$

আবার, ডানপক্ষ

$$= f \cdot (\nabla\phi)$$

$$= (if_1 + jf_2 + kf_3) \cdot \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

$$= f_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + f_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + f_3 \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

অতএব বামপক্ষ = ডানপক্ষ

$$13. \text{ দেখান যে } \operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left\{ r^2 f(r) \right\}$$

$$\text{সমাধান : } \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} = \frac{f(r)}{r} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = \frac{f(r)}{r} x\mathbf{i} + \frac{f(r)}{r} y\mathbf{j} + \frac{f(r)}{r} z\mathbf{k}$$

$$\therefore \operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x f(r)}{r} \right\} + \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{y f(r)}{r} \right\} + \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{z f(r)}{r} \right\} \dots\dots (i)$$

$$\text{এখন } \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x f(r)}{r} \right\} = \frac{\left\{ 1.f(r) + x f'(r) \cdot \frac{x}{r} \right\} r - x f(r) \cdot \frac{x}{r}}{r^2} \quad \left[ \because \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{f(r)}{r} + \frac{x^2}{r^2} f'(r) - \frac{x^2}{r^3} f(r)$$

অনুরূপে

$$\frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{y f(r)}{r} \right\} = \frac{f(r)}{r} + \frac{y^2}{r^2} f'(r) - \frac{y^2}{r^3} f(r) \text{ এবং } \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{z f(r)}{r} \right\} = \frac{f(r)}{r} + \frac{z^2}{r^2} f'(r) - \frac{z^2}{r^3} f(r)$$

এই মানগুলি (i)-এ বসিয়ে পাই

$$\operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = 3 \frac{f(r)}{r} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^2} f'(r) - \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} f(r)$$

$$= \frac{3f(r)}{r} + \frac{r^2}{r^2} f'(r) - \frac{r^2}{r^3} f(r) = \frac{3f(r)}{r} + f'(r) - \frac{f(r)}{r}$$

$$= \frac{2f(r) + rf'(r)}{r} = \frac{2rf(r) + r^2 f'(r)}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left\{ r^2 f(r) \right\}$$

14. যদি  $\mathbf{f}(x, y, z) = x e^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}$ , এবং  $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  হয় তবে  $(\mathbf{f} \times \nabla)\phi = \mathbf{f} \times (\nabla \phi)$  সম্পর্কটির সত্ত্বতা যাচাই করুন।

$$\text{সমাধান : বামপক্ষ } (\mathbf{f} \times \nabla) \phi = \left[ (xe^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}) \times \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \right] \phi$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ xe^x & y^2 z & z \log x \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \phi$$

$$= \left[ i \left( y^2 z \frac{\partial}{\partial z} - z \log x \frac{\partial}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial}{\partial x} - xe^x \frac{\partial}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \phi$$

$$= \left[ i \left( y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial z} - z \log x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial \phi}{\partial x} - xe^x \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial \phi}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right]$$

$$= 2(y^2 z^2 - yz \log x) \mathbf{i} + 2(zx \log x - zx e^x) \mathbf{j} + 2(xy e^x - xy^2 z) \mathbf{k}$$

$$= 2yz(zy - \log x) \mathbf{i} + 2zx(\log x - e^x) \mathbf{j} + 2xy(e^x - yz) \mathbf{k}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = \mathbf{f} \times \nabla \phi = (xe^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}) \times \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ xe^x & y^2 z & z \log x \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{vmatrix}$$

$$= i \left( y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial z} - z \log x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial \phi}{\partial x} - xe^x \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial \phi}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)$$

$$= i(y^2 z \cdot 2z - z \log x \cdot 2y) + j(z \log x \cdot 2x - xe^x \cdot 2z) + k(xe^x \cdot 2y - y^2 z \cdot 2x)$$

$$= 2yz(yz - \log x) \mathbf{i} + 2zx(\log x - e^x) \mathbf{j} + 2xy(e^x - yz) \mathbf{k}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ}$$

15. যদি  $\phi(x, y, z)$ ,  $u(x, y, z)$  দুটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন এবং  $f = u \operatorname{grad} \phi$  হয়

তবে দেখান যে  $f \cdot \operatorname{curl} f = 0$

সমাধান :  $\operatorname{curl} f = \operatorname{curl}(u \operatorname{grad} \phi) \quad [\text{প্রদত্ত শর্তাবলীর }]$

$$= u \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi + (\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi)$$

$[\because \operatorname{curl}(uf) = u \operatorname{curl} f + \operatorname{grad} u \times f \text{ যখন } u \text{ ক্ষেত্রার এবং } f \text{ ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন}]$

$$= (\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi) \quad [\because \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi = 0]$$

$$\therefore f \cdot \operatorname{curl} f = (u \operatorname{grad} \phi) \cdot ((\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi))$$

$= u [\operatorname{grad} \phi \operatorname{grad} u \operatorname{grad} \phi] = 0 \quad [\text{তিনটি ভেক্টরের ক্ষেত্রার গুণনের নিয়ম অনুযায়ী}]$

## 8.8 সারাংশ

1.  $s$  ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলি  $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$  হলে  $s$  এর দিকে  $f(x, y, z)$  ক্ষেত্রারতির মিশা অবকলজ হবে  $\frac{df}{ds} = \nabla_s f = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma$

2. একক ভেক্টর  $a$  এর দিকে  $f$ -এর দিশা অবকলজ হবে  $\nabla_a f = l \frac{\partial f}{\partial x} + m \frac{\partial f}{\partial y} + n \frac{\partial f}{\partial z}$  এখানে  $a = li + mj + nk$

3.  $\operatorname{grad} f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z}$  যখন  $f$  একটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন।

4. ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন  $f$ -এর দিশা অবকলজ  $\frac{df}{ds}$ -এর চরম মান  $f(x, y, z) = c$  লেভেল তলের অভিসহের দিকে অর্থাৎ  $\operatorname{grad} f$  ভেক্টরটি যেসকলে নিরৌপিত সেই দিকে।

5.  $f(x, y, z) = c$  তলের ক্ষেত্রে  $(R - r)$ .  $\nabla f = 0$  স্পষ্টক তলের সমীকরণ এবং  $(R - r) \times \nabla f = 0$  অভিসহের সমীকরণ  $(x, y, z)$  বিদ্যুতে যার অবস্থান ভেক্টর  $r = xi + yi + zk$

6. (i)  $\operatorname{div} f = i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$ ,  $f$ -একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন। এবং  $\operatorname{div} f$  একটি ক্ষেত্রার।

(ii)  $\operatorname{curl} f = i \times \frac{\partial f}{\partial x} + j \times \frac{\partial f}{\partial y} + k \times \frac{\partial f}{\partial z}$ ,  $f$ -একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন। এবং  $\operatorname{curl} f$  হল ভেক্টর।

7. ডাইভারজেন্স ও কার্ল-সংজ্ঞান বিভিন্ন স্তরাবসীর জন্য 8.5.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

8.  $\operatorname{div} \operatorname{grad} \phi, \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi, \operatorname{div} \operatorname{curl} f$ , ইত্যাদি প্রতীয় ক্ষেত্রের ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরগুলির জন্য 8.5.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

## 8.9 প্রশ্নাবলী

A.1. দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন :

- (i)  $f(x, y, z) = 3x^3y^2 + 2z^3$  এর  $i, -j$  এবং  $i - j$  ভেক্টরের দিকে।
- (ii)  $g(x, y, z) = xyz$  এর  $(2, 3, 5)$  বিন্দুতে  $i + 2j + 2k$  ভেক্টরের দিকে।
- (iii)  $\phi(x, y, z) = xy^2 + yz^2$  এর  $(2, -1, 1)$  বিন্দুতে  $i + j + k$  ভেক্টরের দিকে।
2.  $\psi(x, y, z) = x^3i + 3y^2zj + y^3k$  ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশনটির  $(-1, 1, 3)$  বিন্দুতে  $2i + j + 2k$  ভেক্টরের দিকে দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন।
3. ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z) = x^2yz + 4xz^2$  এর  $(2, 2, 3)$  বিন্দুতে  $\text{grad } f$ -এর মান নির্ণয় করুন এবং সেখান থেকে  $2i - j + k$  ভেক্টরের দিকে  $f$ -এর দিশা অবকল নির্ণয় করুন।
4. কোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  এর হালন ভেক্টর  $r$  এবং  $|r| = r$  হলে সেখান যে
  - (i)  $\nabla \phi = -\frac{1}{r^3}r$ , যখন  $\phi = \frac{1}{r}$
  - (ii)  $\nabla \phi = \pi r^{n-2}r$ , যখন  $\phi = r^n$
  - (iii)  $\nabla \phi = \frac{1}{r^2}r$ , যখন  $\phi = \log r$
5. গ্রেডিয়েন্টের দিক বা অভিলম্বের দিক বরাবর  $f(x, y, z) = xy^2z^3$  ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশনটির  $(1, 1, 1)$  বিন্দুতে অবকল সহণ নির্ণয় করুন।
6. সেখান যে  $\phi(x, y, z) = 2xy + 3yz + zx$  ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশনটির  $(0, 1, 6)$  বিন্দুতে দিশা অবকলজ  $8i + 18j + 3k$  ভেক্টরের দিকে চরম এবং এই চরম মান  $\sqrt{397}$
7. ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশন  $\psi(x, y, z) = x(y+z) + y(z+x) + z(x+y)$  এর  $(0, -1, 2)$  বিন্দুতে কোনো দিক বরাবর দিশা অবকলজের মান সব থেকে বেশি? দিশা অবকলজের ঐ সর্বাপেক্ষা বেশি মানটি কত?
8.  $xy + 2yz + 5zx = 5$  লেভেল তলের উপর  $(1, 0, 1)$  বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় করুন।
9.  $f(x, y, z) = x^2yz^3$  ক্ষেত্র ফাংশনটির  $(2, 1, -1)$  বিন্দুতে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার নির্ণয় করুন।  
[সঠিক : সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার  $= |\nabla f|, (2, 1, -1)$  বিন্দুতে ]
10.  $yz + zx + xy = 0$  এবং  $x + y^2 + z^2 - 7 = 0$  এসবয়ের মধ্যে  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে কোণ নির্ণয় করুন।
11.  $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 3z - 13 = 0$  গোলকটির উপর  $(1, 0, 2)$  বিন্দুতে স্পর্শকতল ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

12.  $f(x, y, z) = x + y + z$  এবং  $g(x, y, z) = xyz$  হল  $\text{grad}(fg)$  এর মান নির্ণয় করুন।
13.  $x^2 - y^2 + z^2 = 8$  এবং  $2x - 5y + z = 6$  তঙ্গদ্বয়ের ছেদিত বক্রের উপর  $(2, 0, 2)$  বিন্দুতে স্পর্শক রেখা ও লম্বত্তলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।
14. দুটি ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z)$  ও  $g(x, y, z)$  এর জন্য প্রমাণ করুন যে  $\text{grad}(af + bg) = a \text{ grad } f + b \text{ grad } g$ , যখন  $a, b$  উভয়েই ধ্রুবক।
- B. i.  $f(x, y, z) = (x^2 - yz)i + (y^2 - zx)j + (z^2 - xy)k$  হলে (a)  $\text{div } f$  (b)  $\text{curl } f$  এবং (c)  $\text{grad}(\text{div } f)$  এর মান নির্ণয় করুন।
2. যদি  $f(x, y, z) = x^2yz i + y^2zx j + z^2xy k$  হয় তবে  $(1, -1, -1)$  বিন্দুতে (a)  $\text{div } f$ , (b)  $\text{curl } f$  (c)  $\text{grad}(\text{div } f)$  এবং (d)  $\text{curl}(\text{curl } f)$ -এর মান নির্ণয় করুন।
3. যদি  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$  একটি ধ্রুবক ভেক্টর হয় তবে দেখান যে (a)  $\text{div } a = 0$  এবং (b)  $\text{curl } a = 0$ .
4. যদি  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ ;  $b = b_1 i + b_2 j + b_3 k$  ভেক্টরদ্বয় ধ্রুবক এবং  $r = xi + yj + zk$  হয় তবে দেখান যে
- (a)  $\text{grad}[r.(a \times b)] = a \times b$  (b)  $\text{div}[(r \times a) \times b] = -2a.b$  এবং (c)  $\text{curl}[(r \times a) \times b] = 2b \times a$
5.  $f(x, y, z) = (-ax + 2yz)i + (-3y + 4zx)j + (4z - 5xy)k$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হলে  $a$ -এর মান নির্ণয় করুন।
6. দেখান যে  $f(x, y, z) = (x + \sin x)i + (y + \sin z)j + (z + y \cos z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল।
7. যদি  $\phi(x, y, z) = \frac{1}{3}x^3y^3z^3$  হয় তবে  $\text{div}(\text{grad } \phi)$  এবং  $\text{curl}(\text{grad } \phi)$ -এর মান নির্ণয় করুন।
8. দেখান যে (a)  $\text{div}\left(\text{grad} \frac{1}{r}\right) = 0$  (b)  $a.\left(\text{grad} \frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$  যখন  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  এবং  $\mathbf{a}$  একটি ধ্রুবক ভেক্টর  $r = |\mathbf{r}|$
9. যদি  $\phi(x, y, z) = 3x^2yz - y^3z$  হয় তবে দেখান যে  $\nabla^2\phi = 0$ , অর্থাৎ  $\phi$  ক্ষেত্রের ফাংশনটি ল্যাপলাসের সমীকরণকে সিদ্ধ করে।
10. দেখান যে (a)  $\nabla^2 r^n = n(n+1)r^{n-2}$  কিন্তু (b)  $\nabla^2(r^n r) = n(n+3)r^{n-2}r$
11. যদি  $f(x, y, z) = \log(1+2x)i + y^2j + \sin(x+z)k$  এবং  $\phi(x, y, z) = xy^2z^3$  হয় তবে  $(f \cdot \nabla)\phi = f \cdot (\nabla \phi)$  সম্পর্কটির সত্যতা যাচাই করুন।
12.  $f(x, y, z) = (x - by - z)i + (x - y - cz)j + (ax - y - z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হলে  $a, b, c$  এর মান নির্ণয় করুন।
13. দেখান যে (i)  $\nabla^2\phi = 0$  হলে  $\text{grad } \phi$  ভেক্টরটি একই সাথে সোলেনয়ডাল এবং অনাবর্তনশীল  
(ii)  $n = -3$  এর জন্য  $r^n r'$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল কিন্তু  $n$ -এর অন্য সকল মানের জন্য উহা অনাবর্তনশীল।
14. প্রমাণ করুন যে
- $$\mathbf{a} \cdot \{\nabla(f \cdot \mathbf{a}) - \nabla \times (f \times \mathbf{a})\} = \text{div } f,$$
- যখন  $\mathbf{a}$  একটি ধ্রুব ভেক্টর।

## 8.10 উভর মালা

A. 1. (i)  $9x^2y^2 - 6x^3y, \frac{3x^2y}{\sqrt{2}}(3y - 2x)$ , (ii)  $\frac{47}{3}$ , (iii)  $-\frac{4}{\sqrt{3}}$

2.  $2\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}$ , 3.  $4(15\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 14\mathbf{k}), \frac{82\sqrt{6}}{3}$ , 5.  $\sqrt{14}$

7.  $2(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}), 2\sqrt{6}$ , 8.  $\pm \frac{1}{\sqrt{59}}(5\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k})$ , 9.  $4\sqrt{11}$

10.  $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{42}}\right)$  11.  $4x - 4y + 7z = 18, \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-4} = \frac{z-2}{7}$

12.  $(2xyz + y^2z + yz^2)\mathbf{i} + (2xyz + x^2z + xz^2)\mathbf{j} + (2xyz + x^2y + xy^2)\mathbf{k}$

13.  $\frac{x-2}{5} = y = \frac{z-2}{5}, 5x + y - 5z = 0$

B. 1. (a)  $2(x + y + z)$  (b)  $-(2ix + 2jy + 2kz)$  (c)  $2(i + j + k)$

2. (a) 6 (b) b (c)  $6(\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k})$  (d)  $4(\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k})$

4. [ সংকেত ? (a)  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} =$  ত্রুটি ভেষ্টন = c ধরে  $\mathbf{r} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{c} = xc_1 + yc_2 + zc_3$

সেখা হলে  $\text{grad } (\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}) = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k} = \mathbf{c}$

(b)  $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{f}$  ধরে,  $\text{div } (\mathbf{f} \times \mathbf{b}) = (\text{curl } \mathbf{f}) \cdot \mathbf{b} - (\text{curl } \mathbf{b}) \cdot \mathbf{f}$

এখন  $\text{curl } \mathbf{f} = \text{curl } (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = -2\mathbf{a}$ ; উদা. 4 (খ) এবং  $\text{curl } \mathbf{b} = 0$ .

(c)  $\text{curl } [(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b}] = \text{curl } [(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{r}] = \text{curl } \{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a}\} - \text{curl } \{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{r}\}$   
 $= [(\text{grad } (\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})) \times \mathbf{a} + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{r}) \text{curl } \mathbf{a}] - [(\text{grad } (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})) \times \mathbf{r} + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}) \text{curl } \mathbf{b}]$

যেহেতু  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{r}, \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$  এরা ক্ষেপণ ! ইত্যাদি ]

5. 1

7.  $2xy(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2)$

12.  $a = -1, b = -1, c = 1$

# একক 9 □ গাউস ও স্টোকসের উপপাদ্য

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

9.1 উদ্দেশ্য

9.2 গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য

9.2.1 গ্রীনের উপপাদ্য

9.2.2 গাউসের উপপাদ্য

9.2.3 ফ্রেডিয়েল, ডাইভারজেন্স ও কার্লের বিকল্প সংজ্ঞা

9.2.4 উদাহরণমালা — A

9.3 সামতলিক ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্য

9.4 স্টোকসের উপপাদ্য

9.4.1 স্টোকসের উপপাদ্য অনুযায়ী কিছু সিদ্ধান্ত

9.4.2 উদাহরণমালা — B

9.5 সারাংশ

9.6 প্রশ্নাবলী

9.7 উক্তরমালা

## 0.9 প্রস্তাবনা

ডেক্টর বিদ্যার দুটি শুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য (ক) গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য ও (খ) স্টোকসের উপপাদ্য, এই এককে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই এককেই আলোচিত কোনো সমতলে গ্রীনের উপাপাদাটিও খুব শুরুত্বপূর্ণ; এটিকে স্টোকসের উপপাদ্যের একটি বিশেষ (Special) ক্ষেত্র হিসাবেও সেখান হয়েছে।

গাউসের উপপাদ্যটির মাধ্যমে আয়তন সমাকল (Volume Integral)-কে তলীয় সমাকলে (Surface Integral-এ) রূপান্তর করা যায় বা উন্টেটিও করা যায়। আবার স্টকের উপপাদ্যটির সাহায্যে তলীয় সমাকলকে রেখিক সমাকলে (Line Integral-এ) রূপান্তর করা যায় বা এক্ষেত্রেও বিপরীত অক্রিয়াটিও করা যায়। এতে সমাকল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। (এই এককে ডেক্টর শুলিকে মোটা অঙ্করে প্রকাশ করা হয়েছে।)

## 9.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যায়ন করলে আপনি জানতে পারবেন

- গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য ও গ্রীনের উপপাদ্য
- ফ্রেডিয়েল, ডাইভারজেন্স ও কার্ল এর অক্ষ নিরপেক্ষ সংজ্ঞা পাবেন
- স্টোকসের উপপাদ্য জানতে পারবেন

## 9.2 গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য (Gauss's Divergence Theorem) :

$\mathbf{f}(x, y, z)$  ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশনটির  $v$  অঞ্চলে যদি সন্তুত অবকল সহগ থাকে এবং  $v$  অঞ্চলকে বেষ্টিলকারী বক্ষতল (closed surface)  $s$ -এর বহিমুখী অভিলম্ব বরাবর একক ভেক্টর যদি  $n$  হয় তবে

$$\iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iiint_v \operatorname{div} \mathbf{f} \, dv$$

অথবা, কার্ডিয় স্থানাকে  $\mathbf{f}(x, y, z) = f_1(x, y, z) \mathbf{i} + f_2(x, y, z) \mathbf{j} + f_3(x, y, z) \mathbf{k}$ ,


যখন  $f_1, f_2, f_3$  প্রত্যেকে ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন, হলে

$$\iint_s (f_1 dy dz + f_2 dz dx + f_3 dx dy) = \iiint_v \left( \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \right) dx dy dz \text{ এইরূপেও উপপাদ্যটি প্রকাশ করা যায়।}$$

প্রমাণ : প্রথমে ধরা যাক কার্ডিয় অক্ষগুলির যে কোনো একটির (যখনে  $z$  অক্ষ নেওয়া হল) সাথে সমান্তরালভাবে অক্ষিত যে সরলরেখাগুলি  $v$  অঞ্চল দিয়ে যায় তারা প্রত্যেকে  $s$ -কে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে বা স্পর্শক হলে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে।

এখন  $\iint_s \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz$  সমাকলিত বিবেচনা করা যাক।

যদি ত্রিমাত্রিক অঞ্চল  $v$ -এর  $xy$  তলে লম্ব অভিক্ষেপ (Projection) ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে  $R$  হয় তবে শর্তন্যায়ী  $R$  ক্ষেত্রের যে কোনো অভ্যন্তরীণ বিন্দু থেকে  $z$ -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা সমূহের প্রত্যেকটি  $s$ -কে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে।



এ ক্ষেত্রে যে ছেদবিন্দুগুলির  $z$  স্থানাক কম তাদের দ্বারা  $s$  এর অধিকৃত অংশটিকে  $s_1$ , এবং যে ছেদবিন্দুগুলির  $z$  স্থানাক বেশি তারা  $s$  তলটির যে অংশ জুড়ে আছে সেটিকে  $s_2$  দ্বারা চিহ্নিত করা হল (অতএব  $s = s_1 + s_2$ ) যদি  $s_1$  ও  $s_2$  তলবয়ের সমীকরণ যথাক্রমে  $z = \phi(x, y)$  ও  $z = \psi(x, y)$  হয় তবে

$$\begin{aligned} \iint_s \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz &= \iint_R \left[ \int_{\phi}^{\psi} \frac{\partial f_3}{\partial z} dz \right] dx dy \\ &= \iint_R [f_3(x, y, \psi) - f_3(x, y, \phi)] dx dy \\ &= \iint_R f_3(x, y, \psi) dx dy - \iint_R f_3(x, y, \phi) dx dy \quad \dots \text{(i)} \end{aligned}$$

এখন যদি  $\mathbf{f}_1$ , এবং  $\mathbf{f}_2$ , যথাক্রমে  $s_1$ , এবং  $s_2$  এর যে কোনো বিন্দুতে  $(x, y, \phi), (x, y, \psi)$  বিন্দুতে বহিযুক্তি অভিলম্ব বরাবর একক ভেট্টের হয় তবে  $z$ -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে  $n_2$ , সূক্ষ্মকোণ এবং  $\pi$ , ছুলকোণ করে।

$$\therefore \iint_R f_3(x, y, \psi) dx dy = \iint_{S_2} f_3 n_2 \cdot k ds_2$$

[ $z$ -অক্ষের ধনাত্মক দিক বরাবর একক ভেট্টের  $k$  হলে  $n_2 \cdot k ds_2 = \cos \alpha ds_2 = dx dy$ ]

$$\text{এবং } \iint_R f_3(x, y, \phi) dx dy = - \iint_{S_1} f_3 n_1 \cdot k ds_1$$

সমাকলনের এই ফানগুলি (i)-এ বসিয়ে পাই

$$\iiint_v \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_{S_2} f_3 n_2 \cdot k ds_2 + \iint_{S_1} f_3 n_1 \cdot k ds_1 = \iint_v f_3 \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} ds, \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

যখন  $S$ -এর যে কোনো বিন্দুতে বহিযুক্তি অভিলম্ব বরাবর একক ভেট্টের  $\mathbf{n}$ ,

এক্ষেত্রে উপরে করা প্রয়োজন  $s_1$  ও  $s_2$ -এর মধ্যে বা বাইরে যদি  $S$  তলের এমন কোনো অংশ থেকে থাকে যেখানে বহিযুক্তি অভিলম্ব  $\mathbf{n}, \mathbf{k}$  এর সাথে লম্ব, স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রে  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 0$  হবে এবং তারজন্য উপরোক্ত ফলের কোনো পরিবর্তন হবে না।

ঠিক একইভাবে  $yz$  এবং  $zx$  তলে সম্পর্কিত নিয়ে প্রমাণ করা যায়—

$$\iiint_v \frac{\partial f_1}{\partial x} dx dy dz = \iint_v f_1 \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} ds \dots \dots \text{(iii)}$$

$$\text{এবং } \iiint_v \frac{\partial f_2}{\partial y} dx dy dz = \iint_v f_2 \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} ds \dots \dots \text{(iv)}$$

এখন যদি (ii), (iii) এবং (iv) নং-এর সমীকরণগুলি যোগ করা হয় তবে

$$\iiint_v \left( \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_v (f_1 i + f_2 j + f_3 k) \cdot \mathbf{n} ds$$

$$\text{বা, } \iiint_v \operatorname{div} \mathbf{f} dv = \iint_v \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$$

এখন যদি যে কোনো সাধারণ (General) গ্রিমাত্রিক অঞ্চল  $V$ -এর জন্য উপরোক্ত উপপাদ্যের সত্ত্বতা যাচাই করতে চাই তবে  $V$ -কে এমন কতকগুলি উপঅঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে যারা প্রত্যেকেই প্রথমে আরোপিত শর্তটি মেনে চলে (অর্থাৎ যে কোনো একটি অক্ষের সহিত সমান্তরাল সরলরেখা, উপঅঞ্চলের বেষ্টনকারী তলাটিকে সর্বাধিক দূর্তি বিন্দুতে হৈছে করে)। তাহলে প্রত্যেক উপঅঞ্চলের জন্য গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটি সত্য হবে। কিন্তু এই উপঅঞ্চলগুলির সমষ্টি খোট অঞ্চল  $V$ -এর সমান হলেও তাদের বেষ্টনকারী তলগুলির ক্ষেত্রফলের সমষ্টি  $S$  অপেক্ষা বেশি হবে। (কারণ, পরম্পর পাশাপাশি দূর্তি তলের মধ্যে একটি সাধারণ তলাংশ থাকবে যাকে দুবার নেওয়া হয়েছে) তবে পাশাপাশি দূর্তি অঞ্চলের বেষ্টনকারী তলাটি সাধারণ (Common) হওয়ার ঐ দূর্তি অঞ্চলের বহিযুক্তি অভিলম্ব দূর্তি সাধারণ তলাটিতে বিপরীত মুখ্য হয়। তাই ঐ তলগুলির জন্য সমাকলণগুলি সমান অথচ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হয়। সুতরাং সব উপঅঞ্চলগুলির জন্য আলাদাভাবে গাউসের উপপাদ্যটি লিখে যদি সবগুলি যোগ করা হয় তবে আয়তন সমাকলণগুলির সমষ্টি সরাসরি  $V$  অঞ্চলের জন্য আয়তন সমাকল হবে এবং

তলীয় সমাকলণালির সমষ্টি কেবলমাত্র  $\oint$  তলের জন্য হবে, যেহেতু উপঅঞ্চলগুলির বস্টনকারী তলগুলির জন্য তলীয় সমাকলণালির সমষ্টি শূন্য হবে। অর্থাৎ একেক্ষেত্রে

$$\iiint \operatorname{div} \mathbf{f} dv = \iint \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$$

সম্পর্কটি বহাল থাকবে।

### 9.2.1 শ্রীনের উপপাদ্য

যদি  $\oint$  তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো অঞ্চল  $V$ -তে  $\phi$  এবং  $\psi$  ফ্লোর পয়েন্ট ফাংশন দুটি এবং যে কোনো দিকবরাবর তাদের অবকলজগুলি এককাপ (uniform) এবং সম্পৃক্ষ হয় তবে

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds$$

প্রমাণ : গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা জানি

$$\iint \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint \operatorname{div} \mathbf{f} dv$$

এখন,  $\mathbf{f} = \phi \nabla \psi$  বসালে হয়

$$\iint (\phi \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint \operatorname{div} (\phi \nabla \psi) dv$$

এখন  $\operatorname{div}(\phi \mathbf{f}) = \phi \operatorname{div} \mathbf{f} + \mathbf{f} \cdot \operatorname{grad} \phi$  সূত্রানুযায়ী

$$\operatorname{div}(\phi \nabla \psi) = \phi \operatorname{div}(\nabla \psi) + \nabla \psi \cdot \nabla \phi$$

$$= \phi \nabla^2 \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi \quad [ \because \operatorname{div}(\operatorname{grad} \psi) = \nabla^2 \psi ]$$

$$\iint (\phi \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint [\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] dv \dots\dots (i)$$

এই অভেদকে শ্রীনের প্রথম অভেদ বা শ্রীনের প্রথম উপপাদ্য বলে।

(i) এর  $\phi$  এবং  $\psi$  -কে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন করে পাই

$$\iint (\psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint [\psi \nabla^2 \phi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] dv, \dots\dots (ii)$$

এখন (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে এবং দুরিয়ে লিখে পাই

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds, \dots\dots (iii)$$

এটাই নির্ণেয় অভেদ। এটিকে (iii) শ্রীনের দ্বিতীয় অভেদও বলা হয়। আবার  $ds$  এর স্থলে  $ds$  লিখেও শ্রীনের উপপাদ্যটি নিয়ন্ত্রণ হয় :

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot ds$$

অনুসিদ্ধান্ত 1. যেহেতু  $\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial n} n$  এবং  $\text{grad } \psi = \frac{\partial \psi}{\partial n} n$  লেখা যায়, অতএব

$$\begin{aligned} (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot n \, ds &= \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} n - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} n \right) \cdot n \, ds \\ &= \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) ds \end{aligned}$$

অতএব গ্রীনের উপপাদ্য (iii) নঁরূপ থেকে পরিবর্তিত করে

$$\iiint_v (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint_s \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) ds \quad \dots \dots \text{(iv)}$$

এই আকারেও লেখা যায়।

অনুসিদ্ধান্ত 2. আবার যদি  $\phi$  এবং  $\psi$  উভয়েই হারমোনিক (harmonic) হয় তবে  $\nabla^2 \phi = 0$  এবং  $\nabla^2 \psi = 0$  হয় এবং তখন (iv) নঁর অনুযায়ী

$$\begin{aligned} \iint_s \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) ds &= 0 \text{ হয়।} \\ \therefore \iint_s \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} ds &= \iint_s \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} ds \end{aligned}$$

অভেদিকে গ্রীনের অন্যোন্যক (reciprocal) উপপাদ্য বলে।

### 9.2.2 গাউসের উপপাদ্য

যদি  $S$  একটি বক্স (closed) তল এবং মূলবিন্দু 0 থেকে যে কোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  এর অবস্থানডেক্ষের  $r$  হয় তবে

$$(i) \iint_s \frac{n \cdot r}{r^3} ds = 0, \text{ যদি } 0 \text{ বিন্দুটি } S\text{-এর বাইরে অবস্থিত হয়।}$$

$$(ii) \iint_s \frac{n \cdot r}{r^3} ds = 4\pi, \text{ যদি } 0 \text{ বিন্দুটি } S\text{-এর ভিতরে অবস্থিত হয়।}$$

প্রমাণ : (i) গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_s \frac{r}{r^3} \cdot n \, ds = \iiint_v \nabla \cdot \frac{r}{r^3} dv, \text{ এখানে } S \text{ দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি } V,$$

$$\begin{aligned} \text{ক্ষিতি } r \neq 0 \text{ হলে } \nabla \cdot \frac{r}{r^3} &= \nabla \cdot (r^{-3} r) = (\nabla r^{-3}) \cdot r + (r^{-3}) \nabla \cdot r \\ &= -3r^{-4} r \cdot r + 3r^{-3} \quad [\because \nabla r^a = ar^{a-2} r \text{ এবং } \nabla \cdot r = 3] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$= \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) \cdot \mathbf{g} - \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \cdot \mathbf{f}$$

$$= (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{g} - (\operatorname{curl} \mathbf{g}) \cdot \mathbf{f}$$

$$\operatorname{curl}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) = \mathbf{i} \times \frac{\partial}{\partial x}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{j} \times \frac{\partial}{\partial y}(\mathbf{f} \times \mathbf{g}) + \mathbf{k} \times \frac{\partial}{\partial z}(\mathbf{f} \times \mathbf{g})$$

$$= \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) + \mathbf{j} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{k} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} + \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right)$$

$$= \left\{ \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} \right) + \mathbf{j} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \times \mathbf{g} \right) + \mathbf{k} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \times \mathbf{g} \right) \right\} + \left\{ \mathbf{i} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) + \mathbf{j} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial y} \right) + \mathbf{k} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial z} \right) \right\}$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \left( \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \times \mathbf{g} \right) + \sum \mathbf{i} \times \left( \mathbf{f} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right)$$

$$= \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \mathbf{g} \right) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} - \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) \mathbf{g} \right\} + \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) \mathbf{f} - \left( \mathbf{i} \cdot \mathbf{f} \right) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right\}$$

$$[\because \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{c}]$$

$$= \sum (\mathbf{g} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} - \sum \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) \mathbf{g} + \sum \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x} \right) \mathbf{f} - \sum (\mathbf{f} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial x}$$

$$= (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\operatorname{div} \mathbf{f}) \mathbf{g} + (\operatorname{div} \mathbf{g}) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g}$$

$$\left[ \because (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{j} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{k} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} = \sum (\mathbf{g} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right]$$

$$= \mathbf{f} \operatorname{div} \mathbf{g} - \mathbf{g} \operatorname{div} \mathbf{f} + (\mathbf{g} \cdot \nabla) \mathbf{f} - (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g}$$

## 8.6.2 ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମେର ଡିଫାରେଲିଆଲ ଅପାରେଟର (Second Order Differential Operator) :

যদি  $\phi(x, y, z)$  କ୍ଷେତ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ ଏবଂ  $f(x, y, z)$  ଭେଟ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ ହୁଏ ତବେ  $\text{grad } \phi$  ଏବଂ  $\text{curl } f$  ଉଭୟେଇ ଭେଟ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ; ତାହା ଏହି ଉଭୟ ଫାଂଶନେରେଇ ଡାଇଭାରଜେଲ ଏବଂ କାର୍ଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଆବାର ଯେହେତୁ  $\text{div } f$  ଏକଟି କ୍ଷେତ୍ରର ପରେଣ୍ଟ ଫାଂଶନ  $\text{grad} (\text{div } f)$  ଏହି ଭେଟ୍ରର ଫାଂଶନଟିରେ ଅନ୍ତିତ ଥାକିଲେ ପାରେ । ଏହି ଫାଂଶନଟିଲିର ଜନ୍ମ ସୃଦ୍ଧ ବା ମାନ ଏଥିନ ଆମରା ଏକେ ଏକେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।

$$\begin{aligned}
 (A) \quad \text{div grad } \phi &= \nabla \cdot (\nabla \phi) = \text{div} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= i \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + j \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \cdot \frac{\partial}{\partial z} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \sum i \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \sum \left( \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + 0 + 0 \right) \quad [ \because i \cdot i = 1, i \cdot j = 0 = i \cdot k \text{ ଇତ୍ୟାଦି } ] \\
 &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = \nabla^2 \phi \\
 \therefore \quad \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}
 \end{aligned}$$

ଏହି  $\nabla^2$  ଅପାରେଟରଟିକେ ଲ୍ୟାପଲାସେର ଅପାରେଟର (Laplace's Operator) ବା Laplacian ବିଲେ ।

$\nabla^2 \phi = 0$  ସମୀକରଣଟିକେ ଲ୍ୟାପଲାସେର ସମୀକରଣ ବଲା ହୁଏ ।

$$\therefore \text{div} (\text{grad } \phi) = \nabla^2 \phi$$

$$\begin{aligned}
 (B) \quad \text{curl} (\text{grad } \phi) &= \text{curl} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= i \times \frac{\partial}{\partial x} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + j \times \frac{\partial}{\partial y} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \times \frac{\partial}{\partial z} \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \\
 &= \left( k \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - j \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} \right) + \left( -k \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} + i \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} \right) + \left( j \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} - i \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} \right) \\
 &\quad [ \because i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j \quad j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j ]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 0 \quad \left[ \because \text{ଏଥାନେ } \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} \text{ ଇତ୍ୟାଦି } \right]
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{curl} (\text{grad } \phi) = 0$$

$$(c) \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{f})$$

$$= \nabla \cdot \left\{ \mathbf{i} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \mathbf{k} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \right\}$$

$\because \mathbf{f} = f_1 \mathbf{i} + f_2 \mathbf{j} + f_3 \mathbf{k}$  হলে  $\nabla \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned} &= \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \cdot \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \cdot \frac{\partial}{\partial z} \right) \left\{ \mathbf{i} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \mathbf{j} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \mathbf{k} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \right\} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \end{aligned}$$

$$= 0 \quad [\because \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1 \text{ এবং } \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0]$$

$$\therefore \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = 0$$

$$(D) \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{f}) = \nabla \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right)$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \frac{\partial}{\partial x} \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + \mathbf{j} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right)$$

$$= \sum \mathbf{i} \times \left( \mathbf{i} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} + \mathbf{j} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} + \mathbf{k} \times \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right)$$

$$= \sum \left[ \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right) \mathbf{i} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{i}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right\} + \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{j} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right\} + \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{k} - (\mathbf{i} \cdot \mathbf{k}) \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right\} \right]$$

$$= \sum \left\{ \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} \right) \mathbf{i} + \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} \right) \mathbf{j} + \left( \mathbf{i} \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{k} \right\} - \sum \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2}$$

$$= (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xx}) \mathbf{i} + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xy}) \mathbf{j} + (\mathbf{i} \cdot \mathbf{f}_{xz}) \mathbf{k} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yx}) \mathbf{i} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yy}) \mathbf{j} + (\mathbf{j} \cdot \mathbf{f}_{yz}) \mathbf{k}$$

$$+ (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{xz}) \mathbf{i} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{yz}) \mathbf{j} + (\mathbf{k} \cdot \mathbf{f}_{zz}) \mathbf{k} - \sum \mathbf{f}_{xx} \quad \left[ \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} = \mathbf{f}_{xx}, \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x \partial y} = \mathbf{f}_{xy} \text{ ইত্যাদি নিখে} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= i \left\{ (i \cdot f_{xx} + j \cdot f_{yx} + k \cdot f_{zz}) \right\} + j \left\{ (i \cdot f_{yy}) + (j \cdot f_{yy}) + (k \cdot f_{yy}) \right\} \\
&\quad + k \left\{ (i \cdot f_{zz}) + (j \cdot f_{yz}) + (k \cdot f_{zz}) \right\} - \sum f_{ii} \\
&= i \frac{\partial}{\partial x} (i \cdot f_{xx} + j \cdot f_{xy} + k \cdot f_{zz}) + j \frac{\partial}{\partial y} (i \cdot f_{xy} + j \cdot f_{yy} + k \cdot f_{yz}) + k \frac{\partial}{\partial z} (i \cdot f_{zz} + j \cdot f_{yz} + k \cdot f_{yy}) - \sum f_{ii} \\
&\quad \quad \quad [\because f_{xy} = f_{yz}] \\
&= i \frac{\partial}{\partial x} (\operatorname{div} \mathbf{f}) + j \frac{\partial}{\partial y} (\operatorname{div} \mathbf{f}) + k \frac{\partial}{\partial z} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f} \quad \left[ \because \sum f_{ii} = \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{f}}{\partial z^2} = \nabla^2 \mathbf{f} \right] \\
&= \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}
\end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}$$

**ঝষ্টব্য :** আমরা জানি  $\nabla^2 \phi = \operatorname{div} (\operatorname{grad} \phi)$  যখন  $\phi$  ক্ষেত্রের ফাংশন।  $\nabla^2 \mathbf{f} = \operatorname{div} (\operatorname{grad} \mathbf{f})$  লিখলে তা সংজ্ঞায়িত হয় না যেহেতু  $\mathbf{f}$  একটি ভেষ্টের ফাংশন।

(E) উপরোক্ত আলোচনা (D)-এর সূত্র থেকে পাই—

$$\operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) = \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) - \nabla^2 \mathbf{f}$$

$$\therefore \operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f}) = \operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) + \nabla^2 \mathbf{f}$$

## 8.7 $\operatorname{div} \mathbf{f}$ এবং $\operatorname{curl} \mathbf{f}$ -এর ব্যবহারিক বিষয়ে আলোচনা

(A) যদি একটি দৃঢ় বস্তু (Rigid body) কোনো বিন্দুর চারদিকে  $w$  কৌণিক বেগে আবর্তিত হতে থাকে তবে যে বস্তুকণার হান ভেষ্টের  $r$  তার বৈধিক বেগ  $v$  হলে গতিবিদ্যার সূত্র থেকে আমরা জানি

$$v = w \times r,$$

এখানে  $v$  ভেষ্টেরটি বিভিন্ন অবস্থানের বস্তুকণার জন্য বিভিন্ন, অর্থাৎ  $v$  একটি ভেষ্টের পয়েন্ট ফাংশন কিন্তু  $w$  ভেষ্টেরটি সকল বস্তুকণার জন্য একই।

$$\text{অঙ্গএব } \operatorname{curl} v = \operatorname{curl} (w \times r)$$

$$\begin{aligned}
&= i \times \frac{\partial}{\partial x} (w \times r) + j \times \frac{\partial}{\partial y} (w \times r) + k \times \frac{\partial}{\partial z} (w \times r) \\
&= i \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial x} \right) + j \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial y} \right) + k \times \left( w \times \frac{\partial r}{\partial z} \right) \quad [\because w \text{ একটি ফ্রেক ভেষ্টের}] \\
&= i \times (w \times i) + j \times (w \times j) + k \times (w \times k)
\end{aligned}$$

$$= \sum i \times (w \times i)$$

$$= \sum \{(i \cdot i) w - (i \cdot w)i\}$$

[ ভেস্টের গুণনের নিয়মানুযায়ী ]

$$= \sum \{(i \cdot i) w - (i \cdot w)i\}$$

$$= 3w - w$$

$$[\because (i \cdot i) w = (i \cdot i) w + (j \cdot j) w + (k \cdot k) w]$$

$$= 2w$$

$$\text{এবং } \sum (i \cdot w) i = w_1 i + w_2 j + w_3 k = w$$


যদি  $w = w_1 i + w_2 j + w_3 k$  হলে  $(i \cdot w) = w_1$  ইত্যাদি ]

অতএব কোনো আবর্তনশীল দৃঢ় বস্তুর কোনো কণার রৈখিক বেগের curl বস্তুটির কৌণিক বেগের দিশের সমান। সেইভাবে কোনো ভেস্টের ফাঁশনের curl-কে rotation বা সংক্ষেপে rot দিয়েও চিহ্নিত করা হয়।

(B) ধরা যাক কোনো গতিশীল তরলের কোনো বিন্দু  $P(x, y, z)$ -তে গতির ফিল্ড  $U(x, y, z) = u_1(x, y, z)i + u_2(x, y, z)j + u_3(x, y, z)k$ . এই  $P$  বিন্দুকে কেন্দ্রস্থলে রেখে খুব ছোট একটি আয়তন কঙ্গনা করা হল যার ধারণানি (edges) হালাক অক্ষগুলির মধ্যে সমান্তরাল এবং তাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে  $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ । গতি ভেস্টের যেভাবে ধরা হয়েছে সেই অনুযায়ী EFGH তল দিয়ে যে গতিতে তরল বহিগত হচ্ছে তা

$$u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \text{ এবং একক সময়ে ঐ তলদিয়ে যে পরিমাণ তরল বহিগত হচ্ছে তা } u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) \Delta x \cdot \Delta z$$

$$\text{তার আয়তন } \left[ u_2 \left( x, y + \frac{\Delta y}{2}, z \right) + \frac{\Delta y}{2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z, \Delta y \text{ এর দ্বিতীয় }$$



চিত্র : 8.3

এবং তার অধিক ঘাত বিশিষ্ট পদগুলিকে অগ্রহ্য করে। আবার ঠিক একই ভাবে, যেহেতু ABCD তলে তরলের গতি  $u_2 \left( x, y - \frac{\Delta y}{2}, z \right)$  একক সময়ে ঐ তল দিয়ে যে পরিমাণ তরল ঐ আয়তঘনের ভিতরে থাবে করছে তার আয়তন  $\left[ u_2 \left( x, y, z \right) - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z$

$$= \left[ u_2 (x, y, z) + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial}{\partial y} u_2 (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z - \left[ u_2 (x, y, z) - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z$$

অতএব ঐ দুটি তল দিয়ে মোট যে পরিমাণ তরল বেরিয়ে যায় তার মোট আয়তন

$$= \left[ u_2 (x, y, z) + \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial}{\partial y} u_2 (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z - \left[ u_2 (x, y, z) - \frac{\Delta y}{2} \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \right] \Delta x \Delta z$$

$$= \frac{\partial u_2}{\partial y} (x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$$

অনুসরে অন্য দুই জোড়া তল দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তরল বেরিয়ে যায় তার আয়তন  
 $\frac{\partial u_3}{\partial z}(x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$  এবং  $\frac{\partial u_1}{\partial x}(x, y, z) \Delta x \Delta y \Delta z$

অতএব একক সময়ে মোট নির্গত তরলের আয়তন

$$= \left( \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} + \frac{\partial u_3}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z = (\operatorname{div} u) \Delta x \Delta y \Delta z$$

$\therefore \Delta x \Delta y \Delta z$  দিয়ে ভাগ করে এবং  $\Delta x \Delta y \Delta z \rightarrow 0$  লিমিট নিয়ে পাই

একক সময়ে একক আয়তন থেকে নির্গত তরলের আয়তন =  $\operatorname{div} u$

উদাহরণ :

1. যদি  $\mathbf{f}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$  হয় তবে নিম্নলিখিত মানগুলি নির্ণয় করুন :

- (a)  $\operatorname{div} \mathbf{f}$ , (b)  $\operatorname{curl} \mathbf{f}$ , (c)  $\operatorname{grad} (\operatorname{div} \mathbf{f})$ , (d)  $\operatorname{curl} (\operatorname{curl} \mathbf{f})$

সমাধান :

$$(a) \operatorname{div} \mathbf{f} = \left( \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k})$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(zx)$$

$$= y + z + x$$

$$(b) \operatorname{curl} \mathbf{f} = \left( \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k})$$

$$= \mathbf{i} \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(zx) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right\} + \mathbf{j} \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(xy) - \frac{\partial}{\partial x}(zx) \right\} + \mathbf{k} \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(xy) \right\}$$

$$= \mathbf{i}(0 - y) + \mathbf{j}(0 - z) + \mathbf{k}(0 - x)$$

$$= -(y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k})$$

$$(c) \quad \text{grad}(\text{div } \mathbf{f}) = \text{grad}(x + y + z) \quad [(a) \text{ থেকে } \text{div } \mathbf{f} = x + y + z]$$

$$\begin{aligned} &= i \frac{\partial}{\partial x} (x + y + z) + j \frac{\partial}{\partial y} (x + y + z) + k \frac{\partial}{\partial z} (x + y + z) \\ &= i \cdot 1 + j \cdot 1 + k \cdot 1 \\ &= i + j + k \end{aligned}$$

$$(d) \quad \text{curl}(\text{curl } \mathbf{f}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y & -z & -x \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= i \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(-x) - \frac{\partial}{\partial z}(-z) \right\} + j \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(-y) - \frac{\partial}{\partial x}(-x) \right\} + k \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(-z) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) \right\} \\ &= i(0+1) + j(0+1) + k(0+1) \\ &= i + j + k \end{aligned}$$

2.  $\mathbf{f} = y \sin x \mathbf{i} + z \sin y \mathbf{j} + x \sin z \mathbf{k}$  হলে  $\left( \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$  বিন্দুতে  $\text{div } \mathbf{f}$  এবং  $\text{curl } \mathbf{f}$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $\text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial}{\partial x}(y \sin x) + \frac{\partial}{\partial y}(z \sin y) + \frac{\partial}{\partial z}(x \sin z)$   
 $= y \cos x + z \cos y + x \cos z$

$$\begin{aligned} (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ বিন্দুতে } \text{div } \mathbf{f} \text{ এর মান} &= \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} \\ &= 3 \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= i \left\{ \frac{\partial}{\partial y}(x \sin z) - \frac{\partial}{\partial z}(z \sin y) \right\} + j \left\{ \frac{\partial}{\partial z}(y \sin x) - \frac{\partial}{\partial x}(x \sin x) \right\} + k \left\{ \frac{\partial}{\partial x}(z \sin y) - \frac{\partial}{\partial y}(y \sin x) \right\} \\ &= i(0 - \sin y) + j(0 - \sin z) + k(0 - \sin x) \\ &= -(i \sin y + j \sin z + k \sin x) \end{aligned}$$

$\therefore (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$  বিশুলে curl  $\mathbf{f}$  এর মান

$$= -(\mathbf{i} \sin \frac{\pi}{2} + \mathbf{j} \sin \frac{\pi}{2} + \mathbf{k} \sin \frac{\pi}{2}) \\ = -(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

3. যদি  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  হয় তবে দেখান যে

(a)  $\operatorname{div} \mathbf{r} = 3$  এবং (b)  $\operatorname{curl} \mathbf{r} = 0$

সমাধান : (a)  $\operatorname{div} \mathbf{r} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 1+1+1=3$

$$= i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(y) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(x) - \frac{\partial}{\partial x}(z) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(y) - \frac{\partial}{\partial y}(x) \right] \\ = 0$$

4. যদি  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  এবং  $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$  (ক্রবক ভেক্টর) হয় তবে দেখান যে

(a)  $\operatorname{div}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = 0$  (b)  $\operatorname{curl}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = -2\mathbf{a}$

সমাধান :

$$\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = i(a_3y - a_2z) + j(a_1z - a_3x) + k(a_2x - a_1y)$$

$$(a) \operatorname{div}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = \frac{\partial}{\partial x}(a_3y - a_2z) + \frac{\partial}{\partial y}(a_1z - a_3x) + \frac{\partial}{\partial z}(a_2x - a_1y) \\ = 0 + 0 + 0 = 0$$

$$(b) \operatorname{curl}(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_1y - a_2z & a_1z - a_3x & a_2x - a_1y \end{vmatrix} \\ = i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(a_1x - a_1y) - \frac{\partial}{\partial z}(a_1z - a_3x) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(a_1y - a_2z) - \frac{\partial}{\partial x}(a_2x - a_1y) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(a_1z - a_3x) - \frac{\partial}{\partial y}(a_2y - a_2z) \right] \\ = i(-a_1 - a_1) + j(-a_2 - a_2) + k(-a_3 - a_3) \\ = -2a_1\mathbf{i} - 2a_2\mathbf{j} - 2a_3\mathbf{k} = -2(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) = -2\mathbf{a}$$

5.  $\mathbf{f}(x, y, z) = (x + y^2)\mathbf{i} + (ay + z^2)\mathbf{j} + (az + x^2)\mathbf{k}$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হলে a-এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $\mathbf{f}$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হওয়ার শর্ত  $\operatorname{div} \mathbf{f} = 0$

$$\text{বা, } \frac{\partial}{\partial x}(x + y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(ay + z^2) + \frac{\partial}{\partial z}(az + x^2) = 0$$

$$\text{বা, } 1 + a + a = 0 \quad \text{বা, } a = -\frac{1}{2}$$

6. দেখান যে  $\mathbf{f}(x, y, z) = (xe^x + y^2 \cos x)\mathbf{i} + (2y \sin x + z)\mathbf{j} + (y + \log z)\mathbf{k}$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল (irrotational)।

সমাধান : প্রদত্ত ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হবে যদি  $\operatorname{curl} \mathbf{f} = 0$  হয়।

$$\begin{aligned} \text{এখন } \operatorname{curl} \mathbf{f} &= \mathbf{i} \left[ \frac{\partial}{\partial y} (y + \log z) - \frac{\partial}{\partial z} (2y \sin x + z) \right] + \mathbf{j} \left[ \frac{\partial}{\partial z} (xe^x + y^2 \cos x) - \frac{\partial}{\partial x} (y + \log z) \right] \\ &\quad + \mathbf{k} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (2y \sin x + z) - \frac{\partial}{\partial y} (xe^x + y^2 \cos x) \right] \\ &= \mathbf{i}[1 - 1] + \mathbf{j}[2y \cos x - 2y \cos x] \\ &= \mathbf{i} \cdot 0 + \mathbf{j} \cdot 0 + \mathbf{k} \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore \mathbf{f}$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল।

7. যদি  $\phi(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$  হয় তবে  $\operatorname{div} \operatorname{grad} \phi$  এবং  $\operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi$  এর মান নির্ণয় করুন।

$$\text{সমাধান : } \operatorname{grad} \phi = \mathbf{i} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$= \mathbf{i}(3x^2 - 3yz) + \mathbf{j}(3y^2 - 3xz) + \mathbf{k}(3z^2 - 3xy)$$

$$\begin{aligned} \therefore \operatorname{div}(\operatorname{grad} \phi) &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 3yz) + \frac{\partial}{\partial y}(3y^2 - 3xz) + \frac{\partial}{\partial z}(3z^2 - 3xy) \\ &= 6x + 6y + 6z \\ &= 6(x + y + z), \end{aligned}$$

$$\text{এবং } \operatorname{curl}(\operatorname{grad} \phi) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x^2 - 3yz & 3y^2 - 3xz & 3z^2 - 3xy \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{i} \left[ \frac{\partial}{\partial y} (3z^2 - 3xy) - \frac{\partial}{\partial z} (3y^2 - 3xz) \right] + \mathbf{j} \left[ \frac{\partial}{\partial z} (3x^2 - 3yz) - \frac{\partial}{\partial x} (3z^2 - 3xy) \right] \\
 &\quad + \mathbf{k} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (3y^2 - 3xz) - \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 - 3yz) \right] \\
 &= \mathbf{i}(-3x + 3x) + \mathbf{j}(-3y + 3y) + \mathbf{k}(-3z + 3z) \\
 &= \mathbf{i} \cdot 0 + \mathbf{j} \cdot 0 + \mathbf{k} \cdot 0 = 0
 \end{aligned}$$

8. যখন  $\mathbf{r} = xi + yi + zk$  এবং  $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  তখন দেখান যে  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} r^n) = \nabla^2 r^n$   
 $n(n+1)r^{n-2}$  এবং  $\operatorname{curl}(\operatorname{grad} r^n) = 0$

সমাধান : যেহেতু  $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$ ,  $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}-1} \cdot 2x$

$$= \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{r}$$

$$\therefore \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

$$\text{আবার, } \frac{\partial}{\partial x} (r^n) = nr^{n-1} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = nr^{n-1} \cdot \frac{x}{r} = nxr^{n-2}$$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2} (r^n) = n \cdot 1 \cdot r^{n-2} + nx(n-2)r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial x}$$

$$= n \left[ r^{n-2} + x(n-2)r^{n-3} \cdot \frac{x}{r} \right]$$

$$= nr^{n-2} [1 + (n-2)x^2 \cdot r^{-2}]$$

$$\text{অনুসরণে } \frac{\partial^2}{\partial y^2}(r^n) = nr^{n-2} [1 + (n-2)y^2 \cdot r^{-2}] \text{ এবং } \frac{\partial^2}{\partial z^2}(r^n) = nr^{n-2} [1 + (n-2)z^2 r^{-2}]$$

$$\therefore \operatorname{div}(\operatorname{grad} r^n) = \nabla^2(r^n) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(r^n) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(r^n) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}(r^n)$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)r^{-2}(x^2 + y^2 + z^2)]$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)r^{-2} \cdot r^2]$$

$$= nr^{n-2} [3 + (n-2)] = n(n+1)r^{n-2}$$

$$\text{এখন } \operatorname{grad}(r^n) = i \frac{\partial}{\partial x}(r^n) + j \frac{\partial}{\partial y}(r^n) + k \frac{\partial}{\partial z}(r^n)$$

$$= i nxr^{n-2} + j ny r^{n-2} + k nz r^{n-2}$$

$$\therefore \operatorname{curl}(\operatorname{grad} r^n) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ nxr^{n-2} & ny r^{n-2} & nz r^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$= i \left[ \frac{\partial}{\partial y}(nzr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial z}(nyr^{n-2}) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z}(nxr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial x}(nzr^{n-2}) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x}(nyr^{n-2}) - \frac{\partial}{\partial y}(nxr^{n-2}) \right]$$

$$= i \left[ nz(n-2)r^{n-3} \left( \frac{y}{r} \right) - ny(n-2)r^{n-3} \left( \frac{z}{r} \right) \right] + j \left[ nx(n-2)r^{n-3} \left( \frac{z}{r} \right) - nz(n-2)r^{n-3} \left( \frac{x}{r} \right) \right]$$

$$+ k \left[ ny(n-2)r^{n-3} \frac{x}{y} - nx(n-2)r^{n-3} \frac{y}{x} \right]$$

$$\left. \quad \quad \quad \left[ \because \frac{\partial r^{n-2}}{\partial y} = (n-2)r^{n-3} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = (n-2)r^{n-3} \cdot \frac{y}{r} \right] \right]$$

$$= n(n-2)r^{n-4} [i(yz - yz) + j(zx - zx) + k(xy - xy)]$$

$$= n(n-2)r^{n-4} [i \cdot 0 + j \cdot 0 + k \cdot 0]$$

$$= 0$$

9. যদি  $f$  এবং  $g$  ভেক্টর দুটি অনাবর্তনশীল (irrotational) হয় তবে প্রমাণ করুন যে  $f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল।

প্রমাণ : শর্তানুসারে  $\operatorname{curl} f = 0$  এবং  $\operatorname{curl} g = 0$ .

$f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হতে হলে  $\operatorname{div}(f \times g) = 0$  হতে হবে।

এখন, সূত্র থেকে পাই

ইত্যাদি

$$\operatorname{div}(f \times g) = (\operatorname{curl} f) \cdot g - (\operatorname{curl} g) \cdot f$$

$$= 0 - 0 \quad [\because \operatorname{curl} f = 0 \text{ এবং } \operatorname{curl} g = 0]$$

$$= 0$$

অতএব  $f \times g$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল।

10. যদি  $f(x, y, z) = (2x - ay + 3z)i + (4x - 5y + bz)j + (cx - 7y + 6z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হয় তবে  $a, b, c$  এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান :  $f$  ভেক্টর অনাবর্তনশীল হওয়ার শর্ত  $\operatorname{curl} f = 0$

$$\text{যা, } \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - ay + 3z & 4x - 5y + bz & cx - 7y + 6z \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{যা, } i \left[ \frac{\partial}{\partial y} (cx - 7y + 6z) - \frac{\partial}{\partial z} (4x - 5y + bz) \right] + j \left[ \frac{\partial}{\partial z} (2x - ay + 3z) - \frac{\partial}{\partial x} (cx - 7y + 6z) \right] + k \left[ \frac{\partial}{\partial x} (4x - 5y + bz) - \frac{\partial}{\partial y} (2x - ay + 3z) \right] = 0$$

$$\text{যা, } i(-7 - b) + j(3 - c) + k(4 + a) = 0$$

$$\therefore -7 - b = 0, 3 - c = 0 \text{ এবং } 4 + a = 0$$

$$\therefore b = -7, c = 3, a = -4.$$

11. দেখান যে  $\nabla^2 f(r) = f''(r) + \frac{2}{r} f'(r)$ , যখন  $f(r)$  ক্ষেপার ফাংশনটির সম্মত অবকল্প সহগ আছে।

$$\frac{\partial}{\partial x} f(r) = \frac{\partial}{\partial r} f(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \cdot \frac{x}{r} \quad \left[ \because r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \Rightarrow 2r \frac{\partial r}{\partial x} = 2x \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$\therefore \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(r) = \frac{\partial}{\partial x} \left[ f'(r) \cdot \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{\left\{1.f'(r) + x f''(r) \cdot \frac{x}{r}\right\}r - x f'(r) \cdot \frac{x}{r}}{r^2} \quad \left[ \because \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{f'(r)}{r} + \frac{x^2 f''(r)}{r^2} - \frac{x^2 f'(r)}{r^3}$$

$$\text{অনুরূপে } \frac{\partial^2 f(r)}{\partial y^2} = \frac{f'(r)}{r} + \frac{y^2 f''(r)}{r^2} - \frac{y^2 f'(r)}{r^3}$$

$$\text{এবং } \frac{\partial^2 f(r)}{\partial z^2} = \frac{f'(r)}{r} + \frac{z^2 f''(r)}{r^2} - \frac{z^2 f'(r)}{r^3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \nabla^2 f(r) &= \frac{\partial^2 f(r)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(r)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f(r)}{\partial z^2} = \frac{3f'(r)}{r} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^2} f''(r) - \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} f'(r) \\ &= \frac{3f'(r)}{r} + \frac{r^2}{r^2} f''(r) - \frac{r^2}{r^3} f'(r) = \frac{3f'(r)}{r} + f''(r) - \frac{1}{r} f'(r) \\ &= \frac{2}{r} f'(r) + f''(r) \end{aligned}$$

12. দেখান যে  $(f \cdot \nabla)\phi = f(\nabla\phi)$ , যখন  $f(x, y, z) = if_1(x, y, z) + jf_2(x, y, z) + kf_3(x, y, z)$

এবং  $\phi$  একটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন।

$$\text{সমাধান : বামপক্ষ : } (f \cdot \nabla)\phi = \left[ (if_1 + jf_2 + kf_3) \cdot \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \right] \phi$$

$$= \left[ f_1 \frac{\partial}{\partial x} + f_2 \frac{\partial}{\partial y} + f_3 \frac{\partial}{\partial z} \right] \phi$$

$$= f_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + f_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + f_3 \frac{\partial \phi}{\partial z} \quad [ \because i.i = j.j = k.k = 1 \text{ এবং } i.j = j.k = k.i = 0 ]$$

আবার, ডানপক্ষ

$$= f \cdot (\nabla\phi)$$

$$= (if_1 + jf_2 + kf_3) \cdot \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

$$= f_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + f_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + f_3 \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

অতএব বামপক্ষ = ডানপক্ষ

$$13. \text{ দেখান যে } \operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left\{ r^2 f(r) \right\}$$

$$\text{সমাধান : } \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} = \frac{f(r)}{r} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = \frac{f(r)}{r} x\mathbf{i} + \frac{f(r)}{r} y\mathbf{j} + \frac{f(r)}{r} z\mathbf{k}$$

$$\therefore \operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x f(r)}{r} \right\} + \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{y f(r)}{r} \right\} + \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{z f(r)}{r} \right\} \dots\dots (i)$$

$$\text{এখন } \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{x f(r)}{r} \right\} = \frac{\left\{ 1.f(r) + x f'(r) \cdot \frac{x}{r} \right\} r - x f(r) \cdot \frac{x}{r}}{r^2} \quad \left[ \because \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \right]$$

$$= \frac{f(r)}{r} + \frac{x^2}{r^2} f'(r) - \frac{x^2}{r^3} f(r)$$

অনুরূপে

$$\frac{\partial}{\partial y} \left\{ \frac{y f(r)}{r} \right\} = \frac{f(r)}{r} + \frac{y^2}{r^2} f'(r) - \frac{y^2}{r^3} f(r) \text{ এবং } \frac{\partial}{\partial z} \left\{ \frac{z f(r)}{r} \right\} = \frac{f(r)}{r} + \frac{z^2}{r^2} f'(r) - \frac{z^2}{r^3} f(r)$$

এই মানগুলি (i)-এ বসিয়ে পাই

$$\operatorname{div} \left\{ \frac{f(r)}{r} \mathbf{r} \right\} = 3 \frac{f(r)}{r} + \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^2} f'(r) - \frac{(x^2 + y^2 + z^2)}{r^3} f(r)$$

$$= \frac{3f(r)}{r} + \frac{r^2}{r^2} f'(r) - \frac{r^2}{r^3} f(r) = \frac{3f(r)}{r} + f'(r) - \frac{f(r)}{r}$$

$$= \frac{2f(r) + rf'(r)}{r} = \frac{2rf(r) + r^2 f'(r)}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left\{ r^2 f(r) \right\}$$

14. যদি  $\mathbf{f}(x, y, z) = x e^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}$ , এবং  $\phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  হয় তবে  $(\mathbf{f} \times \nabla)\phi = \mathbf{f} \times (\nabla \phi)$  সম্পর্কটির সত্ত্বতা যাচাই করুন।

$$\text{সমাধান : বামপক্ষ } (\mathbf{f} \times \nabla) \phi = \left[ (xe^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}) \times \left( i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \right] \phi$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ xe^x & y^2 z & z \log x \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \phi$$

$$= \left[ i \left( y^2 z \frac{\partial}{\partial z} - z \log x \frac{\partial}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial}{\partial x} - xe^x \frac{\partial}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \phi$$

$$= \left[ i \left( y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial z} - z \log x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial \phi}{\partial x} - xe^x \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial \phi}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right]$$

$$= 2(y^2 z^2 - yz \log x) \mathbf{i} + 2(zx \log x - zx e^x) \mathbf{j} + 2(xy e^x - xy^2 z) \mathbf{k}$$

$$= 2yz(zy - \log x) \mathbf{i} + 2zx(\log x - e^x) \mathbf{j} + 2xy(e^x - yz) \mathbf{k}$$

$$\text{ডানপক্ষ} = \mathbf{f} \times \nabla \phi = (xe^x \mathbf{i} + y^2 z \mathbf{j} + z \log x \mathbf{k}) \times \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ xe^x & y^2 z & z \log x \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{vmatrix}$$

$$= i \left( y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial z} - z \log x \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + j \left( z \log x \frac{\partial \phi}{\partial x} - xe^x \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + k \left( xe^x \frac{\partial \phi}{\partial y} - y^2 z \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)$$

$$= i(y^2 z \cdot 2z - z \log x \cdot 2y) + j(z \log x \cdot 2x - xe^x \cdot 2z) + k(xe^x \cdot 2y - y^2 z \cdot 2x)$$

$$= 2yz(yz - \log x) \mathbf{i} + 2zx(\log x - e^x) \mathbf{j} + 2xy(e^x - yz) \mathbf{k}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \text{ডানপক্ষ}$$

15. যদি  $\phi(x, y, z)$ ,  $u(x, y, z)$  দুটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন এবং  $f = u \operatorname{grad} \phi$  হয়

তবে দেখান যে  $f \cdot \operatorname{curl} f = 0$

সমাধান :  $\operatorname{curl} f = \operatorname{curl}(u \operatorname{grad} \phi) \quad [\text{প্রদত্ত শর্তাবলীর }]$

$$= u \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi + (\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi)$$

$[\because \operatorname{curl}(uf) = u \operatorname{curl} f + \operatorname{grad} u \times f \text{ যখন } u \text{ ক্ষেত্রার এবং } f \text{ ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন}]$

$$= (\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi) \quad [\because \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi = 0]$$

$$\therefore f \cdot \operatorname{curl} f = (u \operatorname{grad} \phi) \cdot ((\operatorname{grad} u) \times (\operatorname{grad} \phi))$$

$= u[\operatorname{grad} \phi \operatorname{grad} u \operatorname{grad} \phi] = 0 \quad [\text{তিনটি ভেক্টরের ক্ষেত্রার গুণনের নিয়ম অনুযায়ী}]$

## 8.8 সারাংশ

1.  $s$  ভেক্টরের দিক কোসাইনগুলি  $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$  হলে  $s$  এর দিকে  $f(x, y, z)$  ক্ষেত্রারতির মিশা অবকলজ হবে  $\frac{df}{ds} = \nabla_s f = \frac{\partial f}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos\gamma$

2. একক ভেক্টর  $a$  এর দিকে  $f$ -এর দিশা অবকলজ হবে  $\nabla_a f = l \frac{\partial f}{\partial x} + m \frac{\partial f}{\partial y} + n \frac{\partial f}{\partial z}$  এখানে  $a = li + mj + nk$

3.  $\operatorname{grad} f = i \frac{\partial f}{\partial x} + j \frac{\partial f}{\partial y} + k \frac{\partial f}{\partial z}$  যখন  $f$  একটি ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন।

4. ক্ষেত্রার পয়েন্ট ফাংশন  $f$ -এর দিশা অবকলজ  $\frac{df}{ds}$ -এর চরম মান  $f(x, y, z) = c$  লেভেল তলের অভিসহের দিকে অর্থাৎ  $\operatorname{grad} f$  ভেক্টরটি যেসকলে নিরৌপিত সেই দিকে।

5.  $f(x, y, z) = c$  তলের ক্ষেত্রে  $(R - r)$ .  $\nabla f = 0$  স্পষ্টক তলের সমীকরণ এবং  $(R - r) \times \nabla f = 0$  অভিসহের সমীকরণ  $(x, y, z)$  বিদ্যুতে যার অবস্থান ভেক্টর  $r = xi + yi + zk$

6. (i)  $\operatorname{div} f = i \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + k \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$ ,  $f$ -একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন। এবং  $\operatorname{div} f$  একটি ক্ষেত্রার।

(ii)  $\operatorname{curl} f = i \times \frac{\partial f}{\partial x} + j \times \frac{\partial f}{\partial y} + k \times \frac{\partial f}{\partial z}$ ,  $f$ -একটি ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন। এবং  $\operatorname{curl} f$  হল ভেক্টর।

7. ডাইভারজেন্স ও কার্ল-সংজ্ঞান বিভিন্ন স্তরাবসীর জন্য 8.5.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

8.  $\operatorname{div} \operatorname{grad} \phi, \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi, \operatorname{div} \operatorname{curl} f$ , ইত্যাদি প্রতীয় ক্ষেত্রের ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরগুলির জন্য 8.5.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

## 8.9 প্রশ্নাবলী

A.1. দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন :

- (i)  $f(x, y, z) = 3x^3y^2 + 2z^3$  এর  $i, -j$  এবং  $i - j$  ভেক্টরের দিকে।
- (ii)  $g(x, y, z) = xyz$  এর  $(2, 3, 5)$  বিন্দুতে  $i + 2j + 2k$  ভেক্টরের দিকে।
- (iii)  $\phi(x, y, z) = xy^2 + yz^2$  এর  $(2, -1, 1)$  বিন্দুতে  $i + j + k$  ভেক্টরের দিকে।
2.  $\psi(x, y, z) = x^3i + 3y^2zj + y^3k$  ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশনটির  $(-1, 1, 3)$  বিন্দুতে  $2i + j + 2k$  ভেক্টরের দিকে দিশা অবকলজ নির্ণয় করুন।
3. ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z) = x^2yz + 4xz^2$  এর  $(2, 2, 3)$  বিন্দুতে  $\text{grad } f$ -এর মান নির্ণয় করুন এবং সেখান থেকে  $2i - j + k$  ভেক্টরের দিকে  $f$ -এর দিশা অবকল নির্ণয় করুন।
4. কোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  এর হালন ভেক্টর  $r$  এবং  $|r| = r$  হলে সেখান যে
  - (i)  $\nabla \phi = -\frac{1}{r^3}r$ , যখন  $\phi = \frac{1}{r}$
  - (ii)  $\nabla \phi = \pi r^{n-2}r$ , যখন  $\phi = r^n$
  - (iii)  $\nabla \phi = \frac{1}{r^2}r$ , যখন  $\phi = \log r$
5. গ্রেডিয়েন্টের দিক বা অভিলম্বের দিক বরাবর  $f(x, y, z) = xy^2z^3$  ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশনটির  $(1, 1, 1)$  বিন্দুতে অবকল সহগ নির্ণয় করুন।
6. সেখান যে  $\phi(x, y, z) = 2xy + 3yz + zx$  ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশনটির  $(0, 1, 6)$  বিন্দুতে দিশা অবকলজ  $8i + 18j + 3k$  ভেক্টরের দিকে চরম এবং এই চরম মান  $\sqrt{397}$
7. ক্ষেত্র পয়েন্ট ফাংশন  $\psi(x, y, z) = x(y+z) + y(z+x) + z(x+y)$  এর  $(0, -1, 2)$  বিন্দুতে কোনো দিক বরাবর দিশা অবকলজের মান সব থেকে বেশি? দিশা অবকলজের ঐ সর্বাপেক্ষা বেশি মানটি কত?
8.  $xy + 2yz + 5zx = 5$  লেভেল তলের উপর  $(1, 0, 1)$  বিন্দুতে একক অভিলম্ব ভেক্টর নির্ণয় করুন।
9.  $f(x, y, z) = x^2yz^3$  ক্ষেত্র ফাংশনটির  $(2, 1, -1)$  বিন্দুতে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার নির্ণয় করুন।  
[সঠিক : সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার  $= |\nabla f|, (2, 1, -1)$  বিন্দুতে ]
10.  $yz + zx + xy = 0$  এবং  $x + y^2 + z^2 - 7 = 0$  এসবয়ের মধ্যে  $(2, -1, 2)$  বিন্দুতে কোণ নির্ণয় করুন।
11.  $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 3z - 13 = 0$  গোলকটির উপর  $(1, 0, 2)$  বিন্দুতে স্পর্শকতল ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

12.  $f(x, y, z) = x + y + z$  এবং  $g(x, y, z) = xyz$  হল  $\text{grad}(fg)$  এর মান নির্ণয় করুন।
13.  $x^2 - y^2 + z^2 = 8$  এবং  $2x - 5y + z = 6$  তঙ্গদ্বয়ের ছেদিত বক্রের উপর  $(2, 0, 2)$  বিন্দুতে স্পর্শক রেখা ও লম্বতলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।
14. দুটি ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন  $f(x, y, z)$  ও  $g(x, y, z)$  এর জন্য প্রমাণ করুন যে  $\text{grad}(af + bg) = a \text{ grad } f + b \text{ grad } g$ , যখন  $a, b$  উভয়েই ধ্রুবক।
- B. i.  $f(x, y, z) = (x^2 - yz)i + (y^2 - zx)j + (z^2 - xy)k$  হলে (a)  $\text{div } f$  (b)  $\text{curl } f$  এবং (c)  $\text{grad}(\text{div } f)$  এর মান নির্ণয় করুন।
2. যদি  $f(x, y, z) = x^2yz i + y^2zx j + z^2xy k$  হয় তবে  $(1, -1, -1)$  বিন্দুতে (a)  $\text{div } f$ , (b)  $\text{curl } f$  (c)  $\text{grad}(\text{div } f)$  এবং (d)  $\text{curl}(\text{curl } f)$ -এর মান নির্ণয় করুন।
3. যদি  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$  একটি ধ্রুবক ভেক্টর হয় তবে দেখান যে (a)  $\text{div } a = 0$  এবং (b)  $\text{curl } a = 0$ .
4. যদি  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ ;  $b = b_1 i + b_2 j + b_3 k$  ভেক্টরদ্বয় ধ্রুবক এবং  $r = xi + yj + zk$  হয় তবে দেখান যে
- (a)  $\text{grad}[r.(a \times b)] = a \times b$  (b)  $\text{div}[(r \times a) \times b] = -2a.b$  এবং (c)  $\text{curl}[(r \times a) \times b] = 2b \times a$
5.  $f(x, y, z) = (-ax + 2yz)i + (-3y + 4zx)j + (4z - 5xy)k$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হলে  $a$ -এর মান নির্ণয় করুন।
6. দেখান যে  $f(x, y, z) = (x + \sin x)i + (y + \sin z)j + (z + y \cos z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল।
7. যদি  $\phi(x, y, z) = \frac{1}{3}x^3y^3z^3$  হয় তবে  $\text{div}(\text{grad } \phi)$  এবং  $\text{curl}(\text{grad } \phi)$ -এর মান নির্ণয় করুন।
8. দেখান যে (a)  $\text{div}\left(\text{grad} \frac{1}{r}\right) = 0$  (b)  $a.\left(\text{grad} \frac{1}{r}\right) = -\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}}{r^3}$  যখন  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  এবং  $\mathbf{a}$  একটি ধ্রুবক ভেক্টর  $r = |\mathbf{r}|$
9. যদি  $\phi(x, y, z) = 3x^2yz - y^3z$  হয় তবে দেখান যে  $\nabla^2\phi = 0$ , অর্থাৎ  $\phi$  ক্ষেত্রের ফাংশনটি ল্যাপলাসের সমীকরণকে সিদ্ধ করে।
10. দেখান যে (a)  $\nabla^2 r^n = n(n+1)r^{n-2}$  কিন্তু (b)  $\nabla^2(r^n r) = n(n+3)r^{n-2}r$
11. যদি  $f(x, y, z) = \log(1+2x)i + y^2j + \sin(x+z)k$  এবং  $\phi(x, y, z) = xy^2z^3$  হয় তবে  $(f \cdot \nabla)\phi = f \cdot (\nabla \phi)$  সম্পর্কটির সত্যতা যাচাই করুন।
12.  $f(x, y, z) = (x - by - z)i + (x - y - cz)j + (ax - y - z)k$  ভেক্টরটি অনাবর্তনশীল হলে  $a, b, c$  এর মান নির্ণয় করুন।
13. দেখান যে (i)  $\nabla^2\phi = 0$  হলে  $\text{grad } \phi$  ভেক্টরটি একই সাথে সোলেনয়ডাল এবং অনাবর্তনশীল  
(ii)  $n = -3$  এর জন্য  $r^n r'$  ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল কিন্তু  $n$ -এর অন্য সকল মানের জন্য উহা অনাবর্তনশীল।
14. প্রমাণ করুন যে
- $$\mathbf{a} \cdot \{\nabla(f \cdot \mathbf{a}) - \nabla \times (f \times \mathbf{a})\} = \text{div } f,$$
- যখন  $\mathbf{a}$  একটি ধ্রুব ভেক্টর।

## 8.10 উভর মালা

A. 1. (i)  $9x^2y^2 - 6x^3y, \frac{3x^2y}{\sqrt{2}}(3y - 2x)$ , (ii)  $\frac{47}{3}$ , (iii)  $-\frac{4}{\sqrt{3}}$

2.  $2\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + \mathbf{k}$ , 3.  $4(15\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 14\mathbf{k}), \frac{82\sqrt{6}}{3}$ , 5.  $\sqrt{14}$

7.  $2(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}), 2\sqrt{6}$ , 8.  $\pm \frac{1}{\sqrt{59}}(5\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k})$ , 9.  $4\sqrt{11}$

10.  $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{42}}\right)$  11.  $4x - 4y + 7z = 18, \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-4} = \frac{z-2}{7}$

12.  $(2xyz + y^2z + yz^2)\mathbf{i} + (2xyz + x^2z + xz^2)\mathbf{j} + (2xyz + x^2y + xy^2)\mathbf{k}$

13.  $\frac{x-2}{5} = y = \frac{z-2}{5}, 5x + y - 5z = 0$

B. 1. (a)  $2(x + y + z)$  (b)  $-(2ix + 2jy + 2kz)$  (c)  $2(i + j + k)$

2. (a) 6 (b) b (c)  $6(\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k})$  (d)  $4(\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k})$

4. [ সংকেত ? (a)  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} =$  ত্রুটি ভেষ্টন = c ধরে  $\mathbf{r} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{c} = xc_1 + yc_2 + zc_3$

সেখা হলে  $\text{grad } (\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}) = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k} = \mathbf{c}$

(b)  $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{f}$  ধরে,  $\text{div } (\mathbf{f} \times \mathbf{b}) = (\text{curl } \mathbf{f}) \cdot \mathbf{b} - (\text{curl } \mathbf{b}) \cdot \mathbf{f}$

এখন  $\text{curl } \mathbf{f} = \text{curl } (\mathbf{r} \times \mathbf{a}) = -2\mathbf{a}$ ; উদা. 4 (খ) এবং  $\text{curl } \mathbf{b} = 0$ .

(c)  $\text{curl } [(\mathbf{r} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b}] = \text{curl } [(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{r}] = \text{curl } \{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a}\} - \text{curl } \{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{r}\}$   
 $= [(\text{grad } (\mathbf{b} \cdot \mathbf{r})) \times \mathbf{a} + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{r}) \text{curl } \mathbf{a}] - [(\text{grad } (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})) \times \mathbf{r} + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}) \text{curl } \mathbf{b}]$

যেহেতু  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{r}, \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$  এরা ক্ষেপণ ! ইত্যাদি ]

5. 1

7.  $2xy(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2)$

12.  $a = -1, b = -1, c = 1$

# একক 9 □ গাউস ও স্টোকসের উপপাদ্য

গঠন

9.1 প্রস্তাবনা

9.1 উদ্দেশ্য

9.2 গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য

9.2.1 গ্রীনের উপপাদ্য

9.2.2 গাউসের উপপাদ্য

9.2.3 ফ্রেডিয়েল্ট, ডাইভারজেন্স ও কার্লের বিকল্প সংজ্ঞা

9.2.4 উদাহরণমালা — A

9.3 সামতলিক ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্য

9.4 স্টোকসের উপপাদ্য

9.4.1 স্টোকসের উপপাদ্য অনুযায়ী কিছু সিদ্ধান্ত

9.4.2 উদাহরণমালা — B

9.5 সারাংশ

9.6 প্রশ্নাবলী

9.7 উক্তরমালা

## 0.9 প্রস্তাবনা

ডেক্টর বিদ্যার দুটি শুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য (ক) গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য ও (খ) স্টোকসের উপপাদ্য, এই এককে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই এককেই আলোচিত কোনো সমতলে গ্রীনের উপাপাদাটিও খুব শুরুত্বপূর্ণ; এটিকে স্টোকসের উপপাদ্যের একটি বিশেষ (Special) ক্ষেত্র হিসাবেও সেখান হয়েছে।

গাউসের উপপাদ্যটির মাধ্যমে আয়তন সমাকল (Volume Integral)-কে তলীয় সমাকলে (Surface Integral-এ) রূপান্তর করা যায় বা উন্টেটিও করা যায়। আবার স্টকের উপপাদ্যটির সাহায্যে তলীয় সমাকলকে রেখিক সমাকলে (Line Integral-এ) রূপান্তর করা যায় বা এক্ষেত্রেও বিপরীত অক্রিয়াটিও করা যায়। এতে সমাকল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। (এই এককে ডেক্টর শুলিকে মোটা অঙ্করে প্রকাশ করা হয়েছে।)

## 9.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি অধ্যায়ন করলে আপনি জানতে পারবেন

- গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য ও গ্রীনের উপপাদ্য
- ফ্রেডিয়েল্ট, ডাইভারজেন্স ও কার্ল এর অক্ষ নিরপেক্ষ সংজ্ঞা পাবেন
- স্টোকসের উপপাদ্য জানতে পারবেন

## 9.2 গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য (Gauss's Divergence Theorem) :

$\mathbf{f}(x, y, z)$  ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশনটির  $v$  অঞ্চলে যদি সন্তুত অবকল সহগ থাকে এবং  $v$  অঞ্চলকে বেষ্টিলকারী বক্ষতল (closed surface)  $s$ -এর বহিমুখী অভিলম্ব বরাবর একক ভেক্টর যদি  $n$  হয় তবে

$$\iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iiint_v \operatorname{div} \mathbf{f} \, dv$$

অথবা, কার্ডিয় স্থানাকে  $\mathbf{f}(x, y, z) = f_1(x, y, z) \mathbf{i} + f_2(x, y, z) \mathbf{j} + f_3(x, y, z) \mathbf{k}$ ,


যখন  $f_1, f_2, f_3$  প্রত্যেকে ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন, হলে

$$\iint_s (f_1 dy dz + f_2 dz dx + f_3 dx dy) = \iiint_v \left( \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \right) dx dy dz \text{ এইরূপেও উপপাদ্যটি প্রকাশ করা যায়।}$$

প্রমাণ : প্রথমে ধরা যাক কার্ডিয় অক্ষগুলির যে কোনো একটির (যখনে  $z$  অক্ষ নেওয়া হল) সাথে সমান্তরালভাবে অক্ষিত যে সরলরেখাগুলি  $v$  অঞ্চল দিয়ে যায় তারা প্রত্যেকে  $s$ -কে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে বা স্পর্শক হলে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে।

এখন  $\iint_s \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz$  সমাকলিতি বিবেচনা করা যাক।

যদি ত্রিমাত্রিক অঞ্চল  $v$ -এর  $xy$  তলে লম্ব অভিক্ষেপ (Projection) ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে  $R$  হয় তবে শর্তন্যায়ী  $R$  ক্ষেত্রের যে কোনো অভ্যন্তরীণ বিন্দু থেকে  $z$ -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা সমূহের প্রত্যেকটি  $s$ -কে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে।



এ ক্ষেত্রে যে ছেদবিন্দুগুলির  $z$  স্থানাক কম তাদের দ্বারা  $s$  এর অধিকৃত অংশটিকে  $s_1$ , এবং যে ছেদবিন্দুগুলির  $z$  স্থানাক বেশি তারা  $s$  তলটির যে অংশ জুড়ে আছে সেটিকে  $s_2$  দ্বারা চিহ্নিত করা হল (অতএব  $s = s_1 + s_2$ ) যদি  $s_1$  ও  $s_2$  তলবয়ের সমীকরণ যথাক্রমে  $z = \phi(x, y)$  ও  $z = \psi(x, y)$  হয় তবে

$$\begin{aligned} \iint_s \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz &= \iint_R \left[ \int_{\phi}^{\psi} \frac{\partial f_3}{\partial z} dz \right] dx dy \\ &= \iint_R [f_3(x, y, \psi) - f_3(x, y, \phi)] dx dy \\ &= \iint_R f_3(x, y, \psi) dx dy - \iint_R f_3(x, y, \phi) dx dy \quad \dots \text{(i)} \end{aligned}$$

এখন যদি  $\mathbf{f}_1$ , এবং  $\mathbf{f}_2$ , যথাক্রমে  $s_1$ , এবং  $s_2$  এর যে কোনো বিন্দুতে  $(x, y, \phi), (x, y, \psi)$  বিন্দুতে বহিযুক্তি অভিলম্ব বরাবর একক ভেট্টের হয় তবে  $z$ -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে  $n_2$ , সূক্ষ্মকোণ এবং  $\pi$ , ছুলকোণ করে।

$$\therefore \iint_R f_3(x, y, \psi) dx dy = \iint_{s_2} f_3 n_2 \cdot k ds_2$$

[ $z$ -অক্ষের ধনাত্মক দিক বরাবর একক ভেট্টের ক হলে  $n_2 \cdot k ds_2 = \cos \alpha ds_2 = dx dy$ ]

$$\text{এবং } \iint_R f_3(x, y, \phi) dx dy = - \iint_{s_1} f_3 n_1 \cdot k ds_1$$

সমাকলনের এই ফানগুলি (i)-এ বসিয়ে পাই

$$\iiint_v \frac{\partial f_3}{\partial z} dx dy dz = \iint_{s_2} f_3 n_2 \cdot k ds_2 + \iint_{s_1} f_3 n_1 \cdot k ds_1 = \iint_v f_3 \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} ds, \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

যখন  $s$ -এর যে কোনো বিন্দুতে বহিযুক্তি অভিলম্ব বরাবর একক ভেট্টের  $\mathbf{n}$ ,

এক্ষেত্রে উপরে করা প্রয়োজন  $s_1$  ও  $s_2$ -এর মধ্যে বা বাইরে যদি  $s$  তলের এমন কোনো অংশ থেকে থাকে যেখানে বহিযুক্তি অভিলম্ব  $\mathbf{n}, \mathbf{k}$  এর সাথে লম্ব, স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রে  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 0$  হবে এবং তারজন্য উপরোক্ত ফলের কোনো পরিবর্তন হবে না।

ঠিক একইভাবে  $yz$  এবং  $zx$  তলে সম্পর্ক নিয়ে প্রমাণ করা যায়—

$$\iiint_v \frac{\partial f_1}{\partial x} dx dy dz = \iint_s \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{i} ds \dots \dots \text{(iii)}$$

$$\text{এবং } \iiint_v \frac{\partial f_2}{\partial y} dx dy dz = \iint_s \mathbf{f}_2 \cdot \mathbf{j} ds \dots \dots \text{(iv)}$$

এখন যদি (ii), (iii) এবং (iv) নং-এর সমীকরণগুলি যোগ করা হয় তবে

$$\iiint_v \left( \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_s (\mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{i} + \mathbf{f}_2 \cdot \mathbf{j} + \mathbf{f}_3 \cdot \mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} ds$$

$$\text{বা, } \iiint_v \operatorname{div} \mathbf{f} dv = \iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$$

এখন যদি যে কোনো সাধারণ (General) গ্রিমাত্রিক অঞ্চল  $V$ -এর জন্য উপরোক্ত উপপাদ্যের সত্ত্বতা যাচাই করতে চাই তবে  $V$ -কে এমন কতকগুলি উপঅঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে যারা প্রত্যেকেই প্রথমে আরোপিত শর্তটি মেনে চলে (অর্থাৎ যে কোনো একটি অক্ষের সহিত সমান্তরাল সরলরেখা, উপঅঞ্চলের বেষ্টনকারী তলাটিকে সর্বাধিক দূর্তি বিন্দুতে হৈছে করে)। তাহলে প্রত্যেক উপঅঞ্চলের জন্য গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটি সত্য হবে। কিন্তু এই উপঅঞ্চলগুলির সমষ্টি খোট অঞ্চল  $V$ -এর সমান হলেও তাদের বেষ্টনকারী তলাগুলির ক্ষেত্রফলের সমষ্টি  $S$  অপেক্ষা বেশি হবে। (কারণ, পরম্পর পাশাপাশি দূর্তি তলের মধ্যে একটি সাধারণ তলাংশ থাকবে যাকে দুবার নেওয়া হয়েছে) তবে পাশাপাশি দূর্তি অঞ্চলের বেষ্টনকারী তলাটি সাধারণ (Common) হওয়ার ঐ দূর্তি অঞ্চলের বহিযুক্তি অভিলম্ব দূর্তি সাধারণ তলাটিতে বিপরীত মুখ্য হয়। তাই ঐ তলাগুলির জন্য সমাকলণগুলি সমান অথচ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হয়। সুতরাং সব উপঅঞ্চলগুলির জন্য আলাদাভাবে গাউসের উপপাদ্যটি লিখে যদি সবগুলি যোগ করা হয় তবে আয়তন সমাকলণগুলির সমষ্টি সরাসরি  $V$  অঞ্চলের জন্য আয়তন সমাকল হবে এবং

তলীয় সমাকলণালির সমষ্টি কেবলমাত্র  $\oint$  তলের জন্য হবে, যেহেতু উপঅঞ্চলগুলির বস্টনকারী তলগুলির জন্য তলীয় সমাকলণালির সমষ্টি শূন্য হবে। অর্থাৎ একেক্ষেত্রে

$$\iiint \operatorname{div} \mathbf{f} dv = \iint \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$$

সম্পর্কটি বহাল থাকবে।

### 9.2.1 গ্রীনের উপপাদ্য

যদি  $\oint$  তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো অঞ্চল  $V$ -তে  $\phi$  এবং  $\psi$  ফ্লোর পয়েন্ট ফাংশন দুটি এবং যে কোনো দিকবরাবর তাদের অবকলজগুলি এককাপ (uniform) এবং সম্পৃক্ত হয় তবে

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds$$

প্রমাণ : গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা জানি

$$\iint \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint \operatorname{div} \mathbf{f} dv$$

এখন,  $\mathbf{f} = \phi \nabla \psi$  বসালে হয়

$$\iint (\phi \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint \operatorname{div} (\phi \nabla \psi) dv$$

এখন  $\operatorname{div}(\phi \mathbf{f}) = \phi \operatorname{div} \mathbf{f} + \mathbf{f} \cdot \operatorname{grad} \phi$  সূত্রানুযায়ী

$$\operatorname{div}(\phi \nabla \psi) = \phi \operatorname{div}(\nabla \psi) + \nabla \psi \cdot \nabla \phi$$

$$= \phi \nabla^2 \psi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi \quad [ \because \operatorname{div}(\operatorname{grad} \psi) = \nabla^2 \psi ]$$

$$\iint (\phi \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint [\phi \nabla^2 \psi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] dv \dots\dots (i)$$

এই অভেদকে গ্রীনের প্রথম অভেদ বা গ্রীনের প্রথম উপপাদ্য বলে।

(i) এর  $\phi$  এবং  $\psi$  -কে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন করে পাই

$$\iint (\psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint [\psi \nabla^2 \phi + \nabla \phi \cdot \nabla \psi] dv, \dots\dots (ii)$$

এখন (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে এবং দুরিয়ে লিখে পাই

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds, \dots\dots (iii)$$

এটাই নির্ণেয় অভেদ। এটিকে (iii) গ্রীনের দ্বিতীয় অভেদও বলা হয়। আবার  $ds$  এর স্থলে  $ds$  লিখেও গ্রীনের উপপাদ্যটি নিয়ন্ত্রণ হয় :

$$\iiint (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dv = \iint (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot ds$$

অনুসিদ্ধান্ত 1. যেহেতু  $\text{grad } \phi = \frac{\partial \phi}{\partial n} n$  এবং  $\text{grad } \psi = \frac{\partial \psi}{\partial n} n$  লেখা যায়, অতএব

$$\begin{aligned} (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot n \, ds &= \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} n - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} n \right) \cdot n \, ds \\ &= \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \, ds \end{aligned}$$

অতএব গ্রীনের উপপাদ্য (iii) নঁরূপ থেকে পরিবর্তিত করে

$$\iiint_v (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) \, dv = \iint_s \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \, ds \quad \dots \dots \text{(iv)}$$

এই আকারেও লেখা যায়।

অনুসিদ্ধান্ত 2. আবার যদি  $\phi$  এবং  $\psi$  উভয়েই হারমোনিক (harmonic) হয় তবে  $\nabla^2 \phi = 0$  এবং  $\nabla^2 \psi = 0$  হয় এবং তখন (iv) নঁর অনুযায়ী

$$\begin{aligned} \iint_s \left( \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) \, ds &= 0 \text{ হয়।} \\ \therefore \iint_s \phi \frac{\partial \psi}{\partial n} \, ds &= \iint_s \psi \frac{\partial \phi}{\partial n} \, ds \end{aligned}$$

অভেদিকে গ্রীনের অন্যোন্যক (reciprocal) উপপাদ্য বলে।

### 9.2.2 গাউসের উপপাদ্য

যদি  $S$  একটি বক্স (closed) তল এবং মূলবিন্দু 0 থেকে যে কোনো বিন্দু  $(x, y, z)$  এর অবস্থানডেক্ষের  $r$  হয় তবে

$$(i) \iint_s \frac{n \cdot r}{r^3} \, ds = 0, \text{ যদি } 0 \text{ বিন্দুটি } S\text{-এর বাইরে অবস্থিত হয়।}$$

$$(ii) \iint_s \frac{n \cdot r}{r^3} \, ds = 4\pi, \text{ যদি } 0 \text{ বিন্দুটি } S\text{-এর ভিতরে অবস্থিত হয়।}$$

প্রমাণ : (i) গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_s \frac{r}{r^3} \cdot n \, ds = \iiint_v \nabla \cdot \frac{r}{r^3} \, dv, \text{ এখানে } S \text{ দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি } V,$$


$$\begin{aligned} \text{ক্ষিতি } r \neq 0 \text{ হলে } \nabla \cdot \frac{r}{r^3} &= \nabla \cdot (r^{-3} r) = (\nabla r^{-3}) \cdot r + (r^{-3}) \nabla \cdot r \\ &= -3r^{-4} r \cdot r + 3r^{-3} \quad [\because \nabla r^a = ar^{a-2} r \text{ এবং } \nabla \cdot r = 3] \\ &= 0 \end{aligned}$$

অর্থাৎ  $\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$  যখন মূলবিন্দু 0, S-এর বাইরে থাকে ( $r \neq 0$  বলে)।

$$\therefore \iint \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} d\mathbf{s} = 0$$

(ii) 0 বিন্দুটি S-এর ভিতরে অবস্থিত হলে 0 কে কেন্দ্র করে খুব ছোট ব্যাসার্ক  $a$  বিশিষ্ট একটি গোলক  $s'$  মেওয়া হল যাতে 0 বিন্দুটি S এবং  $s'$  তলারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল  $v'$  এর বাইরে থাকে। এখন  $v'$  অঞ্চলের জন্য গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই

$$\begin{aligned} \iint \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} &= \iiint_v \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dv \\ &= 0 \quad [\because v' \text{ অঞ্চল } r \neq 0 \text{ এবং } \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0] \end{aligned}$$



চিত্র : 2

$$\therefore \iint \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = - \iint_{s'} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s}$$

আবার  $s'$  গোলকের উপর,  $r = a$ ,  $\mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r}}{a}$  [এখানে  $\mathbf{n}$ -এর দিক  $s'$  এর ভিতরের লম্ব বরাবর নির্দেশিত বলে ঝগড়াক চিহ্ন নেওয়া হল ]

$$\frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{a^3} \cdot \left( -\frac{\mathbf{r}}{a} \right) = -\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{a^4} = -\frac{a^2}{a^4} = -\frac{1}{a^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} &= - \iint_{s'} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \iint_{s'} \frac{1}{a^2} d\mathbf{s} \\ &= \frac{1}{a^2} \iint_{s'} d\mathbf{s} = \frac{1}{a^2} \cdot 4\pi a^2 = 4\pi \end{aligned}$$

### 9.2.3 ফ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স ও কার্ল-এর বিকল্প সংজ্ঞা :

সংজ্ঞাত্তি দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা নিরলিখিত সম্পর্ক দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করব :

$$(i) \iint \phi n d\mathbf{s} = \iiint_v \nabla \phi dv$$

$$(ii) \iint \mathbf{f} \times \mathbf{n} d\mathbf{s} = - \iint \mathbf{curl} \mathbf{f} dv, \text{ সাধারণ অর্থে সমস্ত চিহ্নগুলি ব্যবহৃত।}$$

প্রমাণ : (i) মনে করি  $\mathbf{f}$  একটি যদৃচ্ছ ফ্রেক ডেক্টর এবং  $\phi$  একটি ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন।  $\mathbf{f}\phi$  ডেক্টরের জন্য গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী পাই  $\iint (\mathbf{f}\phi) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \iint \mathbf{div}(\mathbf{f}\phi) dv$

$$\text{বা, } \mathbf{a} \cdot \iint_s \phi \mathbf{n} ds = \iiint_v \mathbf{a} \cdot \nabla \phi dv \quad \left[ \because \operatorname{div}(\mathbf{a}\phi) = \sum i \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} (\mathbf{a}\phi) \right]$$

$$= \sum i \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial x_i} \phi + \mathbf{a} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = 0 + \sum i \cdot \left( \mathbf{a} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right)$$

$$\text{বা, } \mathbf{a} \cdot \left[ \iint_s \phi \mathbf{n} ds - \iiint_v \nabla \phi dv \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} \cdot \sum i \frac{\partial \phi}{\partial x_i} = \mathbf{a} \cdot \nabla \phi$$

যেহেতু  $\mathbf{a}$  যে কোনো একটি যদৃঢ় প্রবক্ত ভেষ্টর, অতএব

$$\iint_s \phi \mathbf{n} ds - \iiint_v \nabla \phi dv = 0$$

$$\text{বা, } \iint_s \phi \mathbf{n} ds = \iiint_v \nabla \phi dv \quad \dots \dots \text{ (i)}$$

(ii) যদি  $\mathbf{a}$  যে কোনো একটি যদৃঢ় প্রবক্ত ভেষ্টর হয় তবে  $\mathbf{a} \times \mathbf{f}$  ভেষ্টর ফাংশনের জন্য গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সাহায্যে

$$\begin{aligned} \iint_s (\mathbf{a} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds &= \iiint_v \operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{f}) dv \\ &= \iiint_v \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{f}) dv \end{aligned}$$

$$\text{বা, } \iint_s \mathbf{a} \cdot (\mathbf{f} \times \mathbf{n}) ds = \iiint_v \{-(\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}\} dv$$

[ যেহেতু তিনিটি ভেষ্টরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এবং  $\times$  এর স্থান পরিবর্তন করা যায় এবং

$$\nabla \cdot (\mathbf{x} \mathbf{f}) = -\nabla \cdot (\mathbf{f} \times \mathbf{a}) = -(\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{a}$$

$$\text{বা, } \iint_s \mathbf{a} \cdot (\mathbf{f} \times \mathbf{n}) ds + \iiint_v \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{f}) dv = 0$$

$$\text{বা, } \mathbf{a} \cdot \left[ \iint_s \mathbf{f} \times \mathbf{n} ds + \iiint_v \nabla \times \mathbf{f} dv \right] = 0$$

যেহেতু  $\mathbf{a}$  যে কোনো একটি যদৃঢ় ভেষ্টর অতএব

$$\iint_s \mathbf{f} \times \mathbf{n} ds + \iiint_v \nabla \times \mathbf{f} dv = 0$$

$$\text{বা, } \iint_s \mathbf{f} \times \mathbf{n} ds = - \iiint_v \nabla \times \mathbf{f} dv \quad \dots \dots \text{ (ii)}$$

সংজ্ঞা : ধরা যাক কোনো একটি বিন্দু P-কে ঘিরে  $\Delta s$  তলার খুব ছোট একটি অঞ্চল  $\Delta v$  আতএব (i) নং সম্পর্ক অনুযায়ী

$$\iint_{\Delta s} \phi n \, ds = \iiint_{\Delta v} \nabla \phi \, dv = \iiint_{\Delta v} \left\{ (\nabla \phi)_p + \epsilon \right\} dv$$

যখন P বিন্দুতে  $\nabla \phi$  এর মান  $(\nabla \phi)_p$  এবং  $\Delta v$  অঞ্চলের অন্য কোনো এক বিন্দুতে  $\nabla \phi$  এর মান  $(\nabla \phi)_p + \epsilon$  আতএব  $\Delta v \rightarrow 0$  লিমিট নিলে  $\epsilon \rightarrow 0$  হবে (কারণ তখন  $\Delta v$  আয়তন ছোট হতে হতে P বিন্দুতে সংশৃঙ্খিত হতে থাকবে)।

$\therefore (\nabla \phi)_p + \epsilon$  শ্রেণক ধরে

$$\iint_{\Delta s} \phi n \, ds = \left\{ (\nabla \phi)_p + \epsilon \right\} \iiint_{\Delta v} dv = \left\{ (\nabla \phi)_p + \epsilon \right\} \Delta v$$

$$\therefore (\nabla \phi)_p = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_{\Delta s} \phi n \, ds}{\Delta v} \right\}$$

এইভাবে  $\nabla \phi$  এর বিকল্প সংজ্ঞা পাওয়া গেল।

ঠিক একইভাবে অগ্রসর হয়ে

$$\iint_s f \cdot n \, ds = \iiint_v \nabla \cdot f \, dv \quad [\text{গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য}]$$

থেকে দেখান যায় যে,

$$\therefore (\nabla \cdot f)_p = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_s f \cdot n \, ds}{\Delta v} \right\}$$

এটিই হল P বিন্দুতে  $\operatorname{div} f$ -এর সংজ্ঞা। আবার (ii) নং সম্পর্ক

$$\iint_s f \times n \, ds = - \iiint_v \nabla \times f \, dv$$

থেকে দেখান যায় যে

$$(\nabla \times f)_p = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_s n \times f \, ds}{\Delta v} \right\} \mid \text{এটি হল } \operatorname{curl} f \text{ এর সংজ্ঞা।}$$

মন্তব্য :  $\operatorname{grad} \phi \cdot \operatorname{div} f$  এবং  $\operatorname{curl} f$  এর এই বিকল্প সংজ্ঞা অক্ষত নিরপেক্ষ ভাবে দেওয়া হল।

## 9.2.4 উদাহরণ মালা—A

উদাহরণ :

- যদি বন্ধনতল  $s$  দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল  $V$  হয় তবে ডাইভারজেন্স উপপাদ্য লেখা যায়

$$\iint_s \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{r} dv$$

$$= \iiint_V 3 dv$$

$$= 3V$$

- (a)  $s$  তলটি  $x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a$  তলগুলির দ্বারা বেষ্টিত ঘনক হলে  $\iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$  -এর মান নির্ণয় করুন যখন  $s$  তলের বাইরের দিকে নির্দেশিত একক অভিলম্ব ভেস্টের  $\mathbf{i}$  এবং  $\mathbf{f} = 2xy\mathbf{i} + 3yz\mathbf{j} + 4xy\mathbf{k}$  এবং গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

সমাধান : আমরা  $\iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$  এর মান নির্ণয়ের জন্য ঘনকের


ছয়টি তলে মান নির্ণয় করে যোগ করব।

$$(i) \text{ AMPL তলে } \mathbf{n} = \mathbf{i} \text{ এবং } x = a$$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2ay\mathbf{i} + 3yz\mathbf{j} + 4ay\mathbf{k}) \cdot \mathbf{i}$$

$$= 2ay \quad [x = a \text{ এবং } \mathbf{n} = \mathbf{i} \text{ বসিয়ে}]$$

$$\text{এবং } ds = \frac{dydz}{n \cdot i} = dydz$$



$$\therefore \iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = \int_0^a \int_0^a 2ay dy dz = \int_0^a \left[ ay^2 \right]_0^a dz = a^3 [z]_0^a = a^4$$

$$(ii) \text{ BOCN তলে } \mathbf{n} = -\mathbf{i}, x = 0$$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2.0.y\mathbf{i} + 3yz\mathbf{j} + r.0.r).(-\mathbf{i}) = 0 \quad [\because \mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = 0]$$

$$\therefore \iint_s \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = 0$$

(iii) PMBN তলে  $\mathbf{n} = \mathbf{j}$  এবং  $\mathbf{y} = \mathbf{a}$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2x\mathbf{a}\mathbf{i} + 3z\mathbf{a}\mathbf{j} + 4x\mathbf{a}\mathbf{k}) \cdot \mathbf{j} = 3az \quad [\because \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{j}]$$

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^a \int_0^a 3az \frac{dz \, dx}{\mathbf{j} \cdot \mathbf{j}} \quad \left[ \because \text{একজুড়ে } dS = \frac{dz \, dx}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}} \right]$$

$$= 3a \int_0^a \int_0^a z \, dz \, dx = 3a \int_0^a \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^a \, dx = \frac{3}{2} a^3 \int_0^a dx = \frac{3}{2} a^4$$

(iv) OALC তলে  $\mathbf{y} = 0, \mathbf{n} = -\mathbf{j}$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2x \cdot 0 \cdot \mathbf{i} + 3 \cdot 0 \cdot z \cdot \mathbf{j} + 4x \cdot 0 \cdot \mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{j}) = 0$$

$$\therefore \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = 0$$

(v) CLPN তলে  $\mathbf{z} = \mathbf{a}, \mathbf{n} = \mathbf{k}$

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2xy\mathbf{i} + 3y\mathbf{a}\mathbf{j} + 4xy\mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}$$

$$= 4xy \quad [\because \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k}]$$

$$\therefore \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^a \int_0^a 4xy \frac{dx \, dy}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}} = 4 \int_0^a \int_0^a xy \, dx \, dy = 4 \int_0^a \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^a y \, dy$$

$$= 2a^2 \int_0^a y \, dy = 2a^2 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^a = 2a^2 \cdot \frac{a^2}{2} = a^4$$

(vi) OAMB তলে  $\mathbf{z} = 0, \mathbf{n} = -\mathbf{k}$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (2xy\mathbf{i} + 3y\mathbf{0}\mathbf{j} + 4xy\mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{k}) = -4xy$$

$$\therefore \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^a \int_0^a (-4xy) \cdot dx \, dy = -4 \int_0^a \int_0^a xy \, dx \, dy = -a^4$$

উপরোক্ত মানগুলি যোগ করে সমগ্রতলে  $\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = a^4 + 0 + \frac{3a^4}{2} + 0 + a^4 - a^4$

$$= \frac{5}{2} a^4$$

$$\begin{aligned}
 \text{আবার } \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a \left[ \frac{\partial}{\partial x} (2xy) + \frac{\partial}{\partial y} (3yz) + \frac{\partial}{\partial z} (4xy) \right] dx dy dz \quad [\because dV = dx dy dz] \\
 &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a (2y + 3z + 0) dx dy dz \\
 &= \int_0^a \int_0^a (2y + 3z) [x]_0^a dy dz = a \left[ 2 \int_0^a y [z]_0^a dy + 3 \int_0^a z [y]_0^a dz \right] \\
 &= a^2 \left\{ 2 \cdot \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^a + 3 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^a \right\} = a^2 \left[ a^2 + \frac{3a^2}{2} \right] = \frac{5a^4}{2}
 \end{aligned}$$


$\therefore \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dV = \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$ , গাউসের উপপাদ্য যাচাই করা হল।

2. (b) আয়তনঘন  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq b$ ,  $0 \leq z \leq c$  এর ক্ষেত্রে  $\mathbf{f}(x,y,z) = (x^2 - yz)\mathbf{i} + (y^2 - zx)\mathbf{j} - (z^2 - xy)\mathbf{k}$  হলে গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

সমাধান : সমগ্রতলের জন্য  $\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$  এর মান নির্ণয়ের

জন্য ছয়টি তলে আলাদা আলাদা করে মান নির্ণয় করে যোগ করতে হবে। অতএব

(i) ALPN তলের জন্য  $x = a$ ,  $\mathbf{n} = \mathbf{i}$



$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_D \left[ (a^2 - yz)\mathbf{i} + (y^2 - za)\mathbf{j} + (z^2 - ay)\mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{i} dy dz$$

$$= \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c (a^2 - yz) dy dz$$

$$= \int_{y=0}^b \left[ a^2 z - y \frac{z^2}{2} \right]_0^c dy = \int_{y=0}^b \left[ a^2 c - \frac{c^2}{2} y \right] dy$$

$$= \left[ a^2 c y - \frac{c^2}{4} y^2 \right]_0^b = a^2 bc - \frac{b^2 c^2}{4}$$

(ii) OBMC তলে  $x = 0, n = -\mathbf{i}$

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{S_1} \left[ (0 - yz)\mathbf{i} + (y^2 - 0)\mathbf{j} + (z^2 - 0)\mathbf{k} \right] \cdot (-\mathbf{i}) dy dz \\ &= \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c (+yz) dy dz = + \int_0^b y \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^c dy \\ &= + \frac{c^2}{2} \int_0^b y dy = + \frac{c^2}{2} \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^b = \frac{b^2 c^2}{4}\end{aligned}$$

(iii) BMPL তলে  $y = b, n = \mathbf{j}$

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{S_1} \left[ (x^2 - bz)\mathbf{i} + (b^2 - zx)\mathbf{j} + (z^2 - bx)\mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{j} dz dx \\ &= \int_{z=0}^c \int_{x=0}^a (b^2 - zx) dz dx = \int_0^c \left[ b^2 x - z \frac{x^2}{2} \right]_0^a dz \\ &= \int_0^c \left[ ab^2 - \frac{a^2}{2} z \right] dz = \left[ ab^2 z - \frac{a^2}{2} \cdot \frac{z^2}{2} \right]_0^c \\ &= ab^2 c - \frac{a^2 c^2}{4}\end{aligned}$$

(iv) OANC তলে  $y = 0, n = -\mathbf{j}$

$$\begin{aligned}\therefore \iint_{S_1} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{S_1} \left[ (x^2 - 0)\mathbf{i} + (0 - zx)\mathbf{j} + (z^2 - 0)\mathbf{k} \right] \cdot (-\mathbf{j}) dz dx \\ &= \int_{z=0}^c \int_{x=0}^a zx dz dx = \int_0^c z \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^a dz \\ &= \int_0^c z \frac{a^2}{2} dz = \frac{a^2}{2} \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^c = \frac{a^2 c^2}{4}\end{aligned}$$

(v) CNPM তলে  $z = c, n = \mathbf{k}$

$$\begin{aligned}\therefore \iint_{S_1} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_{S_1} \left[ (x^2 - cy)\mathbf{i} + (y^2 - cx)\mathbf{j} + (c^2 - xy)\mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{k} dx dy \\ &= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b (c^2 - xy) dx dy = \int_0^a \left( c^2 y - \frac{xy^2}{2} \right)_0^b dx\end{aligned}$$

$$= \int_0^a \left( c^2 b - \frac{b^2}{2} x \right) dx = \left[ c^2 b x - \frac{b^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^a$$

$$= abc^2 - \frac{a^2 b^2}{4}$$

(vi) OALB তলে  $z=0, n = -k$

$$\therefore \iint_{\text{OALB}} f \cdot n \, ds = \iint_{x=0}^a \left[ (x^2 - 0)i + (y^2 - 0)j + (0 - xy)k \right] \cdot (-k) \, dxdy$$

$$= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b xy \, dxdy = \int_0^a x \left[ \frac{y^3}{2} \right]_0^b \, dx$$

$$= \int_0^a x \cdot \frac{b^2}{2} \, dx = \frac{b^2}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{a^2 b^2}{4}$$

$$\therefore \text{সমগ্র তলের জন্য} \quad \iint f \cdot n \, ds = \left( a^2 bc - \frac{c^2 b^2}{4} \right) + \frac{b^2 c^2}{4} + \left( ab^2 c - \frac{a^2 c^2}{4} \right)$$

$$+ \frac{a^2 c^2}{4} + \left( abc^2 - \frac{a^2 b^2}{4} \right) + \frac{a^2 b^2}{4}$$

$$= a^2 bc + ab^2 c + abc^2 \dots\dots\dots (A)$$

$$\text{আবার, } \iiint_v \operatorname{div} f \, dv = \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^c \left[ \frac{\partial}{\partial x} (x^2 - yz) + \frac{\partial}{\partial y} (y^2 - zx) + \frac{\partial}{\partial z} (z^2 - xy) \right] \, dxdydz$$

$$= 2 \int_0^a \int_0^b \int_0^c (x+y+z) \, dxdydz = 2 \int_0^a \int_0^b \left[ xz + yz + \frac{z^2}{2} \right]_0^c \, dxdy$$

$$= 2 \int_0^a \int_0^b \left( cx + cy + \frac{c^2}{2} \right) \, dxdy = 2 \int_0^a \left[ cxy + \frac{cy^2}{2} + \frac{c^2 y}{2} \right]_0^b \, dx$$

$$= 2 \int_0^a \left( cbx + \frac{cb^2}{2} + \frac{c^2 b}{2} \right) \, dx = 2 \left[ \frac{cbx^2}{2} + \frac{cb^2 x}{2} + \frac{c^2 bx}{2} \right]_0^a$$

$$= a^2 bc + ab^2 c + abc^2 \dots\dots\dots (B)$$

| এখন (A) ও (B) এর মান সমান রলে  
উপপাদ্যটি সত্য।

3.  $f(x, y, z) = 2xi + yzj + z^2k$  এবং  $s$  তলটি  $x^2 + y^2 = 4, z = 0, z = 2$  তলগুলি ধারা পরিবেষ্টিত  
হলে গাউসের উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

সমাধান :  $\iint f \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয়ের জন্য  $z = 0, z = 2$  এবং  $x^2 + y^2 = 4$  বক্রতলে উক্ত সমাকলের মান

নির্ণয় করে যোগ করতে হবে।

$$(i). z = 0 \text{ তলে } n = -k$$

$$\therefore f \cdot n = (2x \mathbf{i} + 0 \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{k}) = 0 \quad [\because i \cdot k = 0]$$

$$\therefore \iint f \cdot n \, ds = 0$$

$$(ii) z = 2 \text{ তলে } n = k$$

$$\therefore f \cdot n = (2x \mathbf{i} + 2y \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) \cdot \mathbf{k} = 4 \quad [\because i \cdot k = 0 = j \cdot k \text{ এবং } k \cdot k = 1]$$

$$\therefore \iint f \cdot n \, ds = \iint 4 \, ds = 4 \iint ds = 4 \cdot 4\pi \quad [\because \pi r^2 = \pi \cdot 2^2]$$

$$= 16\pi$$

$$(iii) x^2 + y^2 = 4 \text{ বক্রতলের ক্ষেত্রে } \phi = x^2 + y^2 - 4 \text{ ধরলে}$$

$$n = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} = \frac{2x \mathbf{i} + 2y \mathbf{j}}{|2x \mathbf{i} + 2y \mathbf{j}|} \quad \left[ \because \nabla \phi = \mathbf{i} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right]$$

$$= \frac{2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})}{\sqrt{4x^2 + 4y^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{2} \quad \left[ \because 4x^2 + 4y^2 = 4(x^2 + y^2) = 4 \cdot 4 \right]$$

$$f \cdot n = (2x \mathbf{i} + yz \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}) \cdot \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{2}$$

$$= \frac{2x^2 + y^2 z}{2}, \quad n \cdot i = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{2} \cdot \mathbf{i} = \frac{x}{2}$$


$$\iint f \cdot n \, ds = \iint_{y=0}^{2} \frac{2x^2 + y^2 z}{2} \cdot \frac{dy \, dz}{n \cdot i}$$

$$= \iint_{y=0}^{2} \frac{2x^2 + y^2 z}{2} \cdot \frac{2}{x} dy \, dz$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2.4 \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta \cdot z) \cdot \frac{2 \cos \theta d\theta dz}{2 \cos \theta}$$

$$[\because \text{এখানে } x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \cos \theta, y = 2 \sin \theta]$$

$$\therefore dy = 2 \cos \theta d\theta \quad \text{এবং } 0 \leq \theta \leq 2\pi]$$



$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 [8\cos^2 \theta + 4(1-\cos^2 \theta)z] d\theta dz \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 [4z - 4\cos^2 \theta(z-2)] d\theta dz \\
&= \int_0^{2\pi} \left[ 2z^2 - 2\cos^2 \theta(z-2)^2 \right]_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 8d\theta + \int_0^{2\pi} 8\cos^2 \theta d\theta \\
&= 8 \cdot 2\pi + 8 \cdot \left[ 2 \int_0^{\pi} \cos^2 \theta d\theta \right] & \left[ \because \int_0^{2a} f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \right. \\
&= 16\pi + 16 \left[ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right] & \text{যখন } f(2a-x) = f(x) \\
&= 16\pi + 32 \cdot \frac{\pi}{4} & \left. \text{[ হ ]} \right] \\
&= 24\pi & \left[ \because \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta = \frac{\pi}{4} \right]
\end{aligned}$$

∴ সমগ্রতলের জন্য উপরোক্ত মানগুলি যোগ করে পাই

$$\iint f \cdot n ds = 0 + 16\pi + 24\pi = 40\pi$$

আবার,  $\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dv = \int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} \int_{z=0}^2 (2+z+2z) dx dy dz$

$$\left[ \because \operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial}{\partial x}(2x) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) \right]$$

$$= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \left[ 2z + \frac{3z^2}{2} \right]_0^2 dx dy$$

$$= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 10 dx dy = \int_{-2}^2 [10y]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$= \int_{-2}^2 20\sqrt{4-x^2} dx = 20.2 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$\left[ f(-x) = f(x) \text{ হলে } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \right]$$

$$= 40 \left[ \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} \right]_0^2$$

$$= 40 \left[ 0 + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= 40\pi$$

$$\therefore \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dv$$

4.  $V$  অঞ্চলটি যদি  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলাকের  $xy$ -তলের উপরের অংশ এবং  $z = 0$  তল দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তবে দেখান যে

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dv$$


যখন  $\mathbf{f}(x, y, z) = xzi + y^2k$  এবং  $V$  অঞ্চলটির উপরিতল  $S$ ।

সমাধান : এক্ষেত্রে  $\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS$  এর মান নির্ণয় করার জন্য আমরা

অর্ধগোলকের বক্রতলের জন্য এবং  $z = 0$  তলে বৃত্তাকার অংশের জন্য উহার মান নির্ণয় করে যোগ করব।

(i) এখন  $n$  নির্ণয়ের জন্য ধরা যাক  $\phi = x^2 + y^2 + z^2 - 1$

$$\therefore \nabla \phi = i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} = i \cdot 2x + j \cdot 2y + k \cdot 2z$$



$$\therefore \mathbf{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} = \frac{2xi + 2yj + 2zk}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}} = xi + yj + zk \quad [\because x^2 + y^2 + z^2 = 1]$$

$\therefore$  অর্ধগোলকের বক্রতল  $S_1$  এর  $xy$ -তলে লম্বভিত্তে যদি  $R$  বৃত্ত হয় তবে

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \frac{dxdy}{n \cdot k}$$

$$= \iint_R (x^2 + y^2)z \frac{dxdz}{z} \quad \left[ \because \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (xzi + y^2k) \cdot (xi + yj + zk) = (x^2 + y^2)z \right]$$

এবং  $n \cdot k = (xi + yj + zk) \cdot k = z$

$$= \int_{x=-1}^1 \int_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)z \, dy \, dx \quad [\because R বৃক্ষের সমীকরণ  $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ ]$$

$$= 2 \times 2 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) \, dy \, dx$$

$$\left[ \because f(-x) = f(x) \text{ হলো } \int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx \right]$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \int_0^1 \left[ x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \\
&= 4 \int_0^1 \left\{ x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3} \right\} dx \\
&= 4 \int_0^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{3} (3x^2 + 1-x^2) dx \\
&= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} (2x^2 + 1) \sqrt{1-x^2} dx \\
&= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} (2 \sin^2 \theta + 1) \cos^2 \theta d\theta && [\text{माना } x = \sin \theta] \\
&= \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta d\theta + \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \\
&= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 4\theta) d\theta + \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\
&= \frac{1}{3} \left[ \theta - \frac{\sin 4\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} + \frac{2}{3} \left[ \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

(ii)  $z = 0$  तभी  $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$

$$\therefore \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = (xz\mathbf{i} + y^2\mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{k}) = -y^2$$

$$\begin{aligned}
\therefore \iint_{R} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds &= \int_{x=-1}^1 \int_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (-y^2) dx dy = -4 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y^2 dx dy \\
&= -4 \int_0^1 \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx = -\frac{4}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{3/2} dx
\end{aligned}$$

$$= -\frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \quad [ \text{যখন } x = \sin \theta ]$$

$$= -\frac{4}{3} \cdot \left( \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

উপরিউক্ত মান দুটি যোগ করে সমগ্রতলের জন্য

$$\iint_s f \cdot n ds = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{আবার, } \iiint_v \operatorname{div} f dv = \iiint_v z dv \quad \left[ \begin{array}{l} \because \operatorname{div} f = \frac{\partial}{\partial x}(xz) + \frac{\partial}{\partial y}(0) + \frac{\partial}{\partial z}y^2 \\ \qquad \qquad \qquad = z+0+0 \end{array} \right]$$

$$= \int_{r=0}^1 \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{\phi=0}^{2\pi} r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} r^3 \sin 2\theta dr d\theta d\phi$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{\pi/2} r^3 \sin^2 \theta [\phi]_0^{2\pi} dr d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 r^3 \left[ -\frac{\cos 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} \cdot 2\pi dr$$

$$= \pi \int_0^1 r^3 \cdot \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] dr$$

$$= \pi \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$$

অতএব প্রমাণিত হল যে

$$\iint_s f \cdot n ds = \iiint_v \operatorname{div} f dv$$

5. গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য কাজে লাগিয়ে প্রমাণ করুন যে

$$\iint_s (axi + byj + czk) \cdot n ds = \frac{4}{3}\pi(a+b+c), \text{ যখন } s$$

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলকের তলকে সূচিত করে।

সমাধান : এখানে  $\mathbf{f}(x, y, z) = ax\mathbf{i} + by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}$  থরলে

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial}{\partial x}(ax) + \frac{\partial}{\partial y}(by) + \frac{\partial}{\partial z}(cz) = a + b + c$$

$\therefore$  গাউসের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_S (ax\mathbf{i} + by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} ds$$

$$= \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$$

$$= \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dv \quad [v হল s গোলক দ্বারা আবক্ষ অঞ্চল।]$$

$$= \iiint_V (a + b + c) dv = (a + b + c) \iiint_V dv$$

$$= (a + b + c) \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot l^3 \quad [\because 1 ব্যাসাক সম্পূর্ণ গোলকের আয়তন = \frac{4}{3}\pi \cdot l^3]$$

$$= \frac{4}{3}\pi(a + b + c)$$

6. যদি  $xy$ -তলের উপরের দিকে  $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$  শঙ্খুর বক্রতল  $S$  এবং  $\mathbf{f} = x^2z\mathbf{i} + (x^3 - y)\mathbf{j} + 2x^2y\mathbf{k}$  হয় তবে  $\iint_S (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : প্রদত্ত শঙ্খুর সমীকরণে  $z = 0$  বসিয়ে পাই,

$$0 = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \text{ বা, } x^2 + y^2 = 4$$

অতএব প্রদত্ত শঙ্খুটি  $xy$ -তলাকে  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 0$  বৃক্ষে ছেদ করেছে। যদি ঐ বৃক্ষের তলকে  $R$  বলা হয় তবে ধরা যাক  $S$  এবং  $R$  দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের আয়তন  $V$

অতএব গাউসের ডাইভারেজন্স উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_{S+R} (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_V \operatorname{div}(\nabla \times \mathbf{f}) dv \quad [\nabla \times \mathbf{f} = \operatorname{curl} \mathbf{f}]$$

$$= 0$$

$$[\because \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = 0]$$

$$\int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds + \int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds = 0$$

বা,  $\int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds = - \int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds \dots\dots\dots (i)$

এখন  $\operatorname{curl} \mathbf{f} = 2x^2 \mathbf{i} + (x^2 - 4xy) \mathbf{j} + 3x^2 \mathbf{k}$

যেহেতু R-ভোলের বাইরের দিকে একক অভিলম্ব  $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$ , অতএব

$$(\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} = [2x^2 \mathbf{i} + (x^2 - 4xy) \mathbf{j} + 3x^2 \mathbf{k}] \cdot (-\mathbf{k})$$

$$= -3x^2 \quad [\because \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0, \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1]$$

$\therefore (i)$  নং থেকে পাই

$$\int \int_{\text{R}} (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds = \int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds = - \int \int_{\text{R}} (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds$$

$$= \int \int_{\text{R}} 3x^2 ds = 3 \int_{r=0}^2 \int_{\theta=0}^{2\pi} (r \cos \theta)^2 r d\theta dr \quad [\text{পোলার স্থানাঙ্কে পরিবর্তন করে]$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^2 \int_0^{2\pi} r^3 (1 + \cos 2\theta) dr d\theta$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^2 r^3 \left[ \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} dr$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^2 r^3 \cdot 2\pi dr$$

$$= 3\pi \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 12\pi$$

7. অক্ষতলগুলি এবং  $x + y + z = a$  তসম্ভারা উৎপন্ন সমগ্রতল s দ্বারা প্রথম আষ্টমাংশে সীমাবদ্ধ অক্ষল v হলে  $\int \int_{\text{R}} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$ -এর মান নির্ণয় করন যখন  $\mathbf{f} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$ .

সমাধান: গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা জানি

$$\int \int_{\text{R}} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = \int \int_{\text{v}} \operatorname{div} \mathbf{f} dv$$

$$= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} \int_{z=0}^{a-x-y} \left[ \frac{\partial}{\partial x} (xy) + \frac{\partial}{\partial y} (yz) + \frac{\partial}{\partial z} (zx) \right] dx dy dz$$

$$\begin{aligned}
\text{বা. } \int \int \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} \int_{z=0}^{a-x-y} (y+z+x) \, dx \, dy \, dz \\
&= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} \left[ yz + \frac{z^2}{2} + xz \right]_0^{a-x-y} \, dx \, dy \\
&= \frac{1}{2} \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} (a-x-y)(2x+2y+a-x-y) \, dx \, dy \\
&= \frac{1}{2} \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} (a-x-y)(a+x+y) \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{a-x} (a^2 - x^2 - y^2 - 2xy) \, dx \, dy \\
&= \frac{1}{2} \int_0^a \left[ a^2y - x^2y - \frac{y^3}{3} - xy^2 \right]_0^{a-x} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^a \left[ a^2(a-x) - x^2(a-x) - \frac{1}{3}(a-x)^3 - x(a-x)^2 \right] \, dx \\
&= \frac{1}{6} \int_0^a (x^3 - 3a^2x + 2a^3) \, dx \\
&= \frac{1}{6} \left[ \frac{x^4}{4} - 3a^2 \cdot \frac{x^2}{2} + 2a^3x \right]_0^a \\
&= \frac{1}{6} \left[ \frac{a^4}{4} - \frac{3}{2}a^4 + 2a^4 \right] \\
&= \frac{1}{8}a^4
\end{aligned}$$

৩.  $\mathbf{a}$  একটি ক্রবর ভেস্টের হলে দেখান যে

$$(i) \quad \int \int \mathbf{n} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \, ds = 2v\mathbf{a}$$

$$(ii) \quad \int \int \mathbf{r} \times \mathbf{n} \, ds = 0$$

$$(iii) \quad \int \int \int \nabla \phi \cdot \operatorname{curl} \mathbf{f} \, dv = \int \int (\mathbf{f} \times \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

সমাধান : (i) আমরা জানি  $\int \int \mathbf{f} \times \mathbf{r} \, ds = - \int \int \nabla \times \mathbf{f} \, dv$

এখানে  $\mathbf{f} = \mathbf{a} \times \mathbf{r}$  নিলে

$$\begin{aligned}
\text{বামপক্ষ} &= \int \int \mathbf{n} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \, ds = - \int \int (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \times \mathbf{n} \, ds = - \left\{ - \int \int \int \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \, dv \right. \\
&\quad \left. = \int \int \int \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \, dv \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এখন } \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) &= \sum i \times \frac{\partial}{\partial x} (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = \sum i \times \left( \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial x} \times \mathbf{r} + \mathbf{a} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \right) \\
 &= \sum i \times (0 + \mathbf{a} \times i) = \sum i \times (\mathbf{a} \times i) = \sum [(i \cdot i) \mathbf{a} - (i \cdot \mathbf{a}) i] \\
 &= \sum (\mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot i) \quad [\text{যখন } \mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}] \\
 &= 3\mathbf{a} - \mathbf{a} = 2\mathbf{a}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \iiint_v 2\mathbf{a} dv = 2\mathbf{a} \iiint_v dv = 2\mathbf{a} v$$

= ডানপক্ষ

$$\text{(ii) আমরা জানি যে, } \iint_s \mathbf{n} \times \mathbf{f} ds = \iiint_v \nabla \times \mathbf{f} dv$$

$$\therefore \text{বামপক্ষ} = \iint_s \mathbf{r} \times \mathbf{n} ds = - \iiint_v \nabla \times \mathbf{r} dv = 0$$

$$\text{যেহেতু } \nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{i} \cdot 0 + \mathbf{j} \cdot 0 + \mathbf{k} \cdot 0 = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii) ডানপক্ষ} &= \iint_s (\mathbf{f} \times \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds \\
 &= \iiint_v \operatorname{div}(\mathbf{f} \times \nabla \phi) dv \quad [\text{ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী}] \\
 &= \iiint_v (\nabla \phi \cdot \operatorname{curl} \mathbf{f} - \mathbf{f} \cdot \operatorname{curl} \nabla \phi) dv \\
 &= \iiint_v \nabla \phi \cdot \operatorname{curl} \mathbf{f} dv \quad [\because \operatorname{curl} \nabla \phi = 0] \\
 &= \text{বামপক্ষ}
 \end{aligned}$$

9. যদি  $v$  অণ্টলে  $\phi$  একটি হারমোনিক ফাংশন হয় তবে দেখান যে

$$\iint_s \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \iiint_v |\nabla \phi|^2 dv$$

$$\text{সমাধান : বায়ুপক্ষ} = \iint_S \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} ds = \iint_S \phi \frac{\partial \phi}{\partial n} \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} ds$$

$$= \iint_S \left[ \phi \left( \frac{\partial \phi}{\partial n} \mathbf{n} \right) \right] \mathbf{n} ds = \iint_S (\phi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_V \operatorname{div}(\phi \nabla \phi) dv$$

[ ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী ]

$$= \iiint_V [(\nabla \phi \cdot \nabla \phi) + \phi (\nabla \cdot \nabla \phi)] dv$$

$$= \iiint_V [(\nabla \phi)^2 + \phi \nabla^2 \phi] dv$$


$$= \iiint_V |\nabla \phi|^2 dv. \quad \text{যেহেতু } \nabla^2 \phi = 0 \text{ এবং } (\nabla \phi)^2 = |\nabla \phi|^2$$

= বায়ুপক্ষ

### 9.3 সামতলিক ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্য (Green's Theorem in a plane) :

নিজে নিজে ছেদিত হয় না এমন একটি সহজ বক্র (simple closed curve) C-র দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল (Closed region) S-এ যদি দুটি সন্তুত ফাংশন F(x, y) ও G(x, y) সংজ্ঞাত থাকে যাদের ঐ একই অঞ্চলে সন্তুত অবকল্প সহগ আছে, তাহলে

$$\oint_C (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy.$$



অবশ্য C ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে C বরাবর গমন করলে S অঞ্চলটি যেন সর্বদা বায়ু দিকে থাকে। C বরাবর এই দিককে ধনাত্মক দিক বলে। পরম্পরাকে ছেদ করে না এমন সীমান্ত সংখ্যক সহজ বক্র বক্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ যে কোন সামতলিক অঞ্চলের জন্যও উপরোক্ত উপপাদ্য পালিত হয়।

প্রমাণ : প্রথমে আমরা একটি সহজ বক্র C -র ছার সীমাবদ্ধ এমন একটি অঞ্চল S নিলাম (চিত্র 7) যেন x অক্ষ বা y অক্ষের সমান্তরাল যে কোন সরলরেখা C কে সুই এর বেশি বিন্দুতে ছেদ না করে।

ধরা যাক, C বক্রের উপর A ও D বিন্দুতে স্পর্শকদ্বয় y অক্ষের সমান্তরাল এবং উহারা x অক্ষকে x = a ও x = b বিন্দুতে ছেদ করেছে। যদি চিত্রানুযায়ী ABD এবং AED বক্রদ্বয়ের সমীকরণ  $y = \phi_1(x)$  এবং  $y = \phi_2(x)$  হয়, তবে

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{\partial F}{\partial y} dx dy &= \int_a^b \left[ \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \frac{\partial F}{\partial y} dy \right] dx = \int_a^b [F(x, y)]_{\phi_1}^{\phi_2} dx \\ &= \int_a^b [F(x, \phi_2) - F(x, \phi_1)] dx \\ &= \int_a^b F(x, \phi_2) dx - \int_a^b F(x, \phi_1) dx \\ &= - \left[ \int_a^b F(x, \phi_1) dx + \int_b^a F(x, \phi_2) dx \right] \\ &= - \oint_C F dx \quad \dots (i) \end{aligned}$$

[ যেহেতু প্রথম সমাকলনটি ABD এবং দ্বিতীয় সমাকলনটি DEA বরাবর বোঝায়।]


আবার যদি B ও E বিন্দুদ্বয়ে স্পর্শকদ্বয় x অক্ষের সমান্তরাল হয়, এবং তারা যদি y অক্ষকে যথাক্রমে  $y = f$  ও  $y = m$  বিন্দুতে ছেদ করে, এবং EAB ও BDE বক্রদ্বয়ের সমীকরণ যথাক্রমে  $x = \psi_1(y)$  ও  $x = \psi_2(y)$  হয় তবে,

$$\begin{aligned} \iint_s \frac{\partial G}{\partial x} dx dy &= \int_f^m \left[ \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial G}{\partial x} dx \right] dy = \int_f^m [G(x, y)]_{\psi_1}^{\psi_2} dy \\ &= \int_f^m [G(\psi_2, y) - G(\psi_1, y)] dy \\ &= \int_f^m G(\psi_2, y) dy - \int_f^m G(\psi_1, y) dy \\ &= \int_f^m G(\psi_2, y) dy + \int_m^f G(\psi_1, y) dy \\ &= \oint_c G dy \quad \dots (ii) \end{aligned}$$

[ $\therefore$  প্রথম সমাকলনটি BDE এবং দ্বিতীয় সমাকলনটি EAB বরাবর বোঝায়।]

(ii) নং থেকে (i) নং বিয়োগ করে পাই,

$$\iint \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy = \oint_c (F dx + G dy) \text{ অমাণিত।}$$



চিত্র : ৪

যদি C বক্র দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল S এমন হয় যে কোনো অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা C বক্রটিকে দুই এর অধিক বিস্তৃতে ছেদ করে তবে এমন ভাবে S অঞ্চলটিকে কয়েকটি রেখা দ্বারা কক্ষকগুলি উপাঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে যেন প্রত্যেকটি উপাঞ্চল পূর্ব আরোপিত শর্ত মেনে চলে। ধরা যাক চিত্র ৪ অনুযায়ী LM রেখা দ্বারা S কে দুটি উপাঞ্চল S<sub>1</sub> ও S<sub>2</sub> তে বিভক্ত করা হল। তবে S<sub>1</sub> ও S<sub>2</sub> প্রত্যেকেই এমন বক্র দ্বারা সীমাবদ্ধ যারা যে কোনো অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা দুই এর বেশি বিস্তৃতে ছেদিত হয় না। অতএব পূর্বের অমাণিত ফল অনুযায়ী

$$\int_{LMOL} (F dx + G dy) = \iint_{S_1} \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) \dots \text{(iii)}$$

$$\text{এবং } \int_{MLPM} (F dx + G dy) = \iint_{S_2} \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) \dots \text{(iv)}$$

এখন (iii) এবং (iv) এর বাহ্যপক্ষের সমষ্টি

$$\int_{LMQL} + \int_{MLPM} = \int_{LM} + \int_{MQL} + \int_{ML} + \int_{LPM} \quad [ \text{সুবিধার জন্য ইনটিগ্রেড } F dx + G dy \text{ না লিখে ]$$

$$= \int_{MQL} + \int_{LPM} \quad \left[ \because \int_{LM} = - \int_{ML} \right]$$

$$= \int_{MQLPM}$$

আবার একইভাবে (iii) ও (iv)-এর ভান পক্ষের সমষ্টি

$$\iint_{S_1} + \iint_{S_2} = \iint_S$$

$$\text{অতএব } \int_{\text{MQLPM}} (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dxdy$$

অর্থাৎ এক্ষেত্রেও গ্রীনের উপপাদ্যটি প্রমাণিত হল।

যখন  $S$  অঞ্চলটি 9 টিরের ন্যায় কক্ষগুলি সহজবদ্ধ বক্র  $C_1, C_2, C_3, C_4$  দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তখন গ্রীনের উপপাদ্য প্রমাণের জন্য  $AB, DE, LM$  রেখাগুলি অঞ্চলের দ্বারা উক্ত বক্রগুলিকে যুক্ত করে  $S$ -কে একটি Simply Connected অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হল [যদি কোন অঞ্চলে কোন বক্রবক্রকে অবিরামভাবে সংযুক্ত করে তাহলে মধ্যেই একটি বিস্তৃত পরিণত করা যায় তবে ঐ অঞ্চলকে simply-connected বলে]। অতএব এখন এই  $S$  অঞ্চলের জন্য গ্রীনের উপপাদ্য পালিত হয়।

যে বক্রটির দ্বারা  $S$  সীমাবদ্ধ ভার উপর সমাকলন এক্ষেত্রে

$$\begin{aligned} & \int_{AB} + \int_{BPD} + \int_{DE} + \int_{EQL} + \int_{LM} + \int_{MRIM} + \int_{ML} + \int_{LJE} + \int_{ED} + \int_{DKB} + \int_{BA} + \int_{ATUVA} \\ &= \int_{BPD} + \int_{EQL} + \int_{MRIM} + \int_{LJE} + \int_{DKB} + \int_{ATUVA} \quad [\because \int_{AB} = -\int_{BA} \text{ ইত্যাদি}] \\ &= \left( \int_{BPD} + \int_{DKB} \right) + \left( \int_{EQL} + \int_{LJE} \right) + \int_{MRIM} + \int_{ATUVA} \\ &= \int_{SPDKB} + \int_{EQJLE} + \int_{MRIM} + \int_{ATUVA} = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4} \\ &= \int_C, \text{ এখানে } C_1, C_2, C_3, C_4 \text{ এর সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন বক্র } C. \end{aligned}$$

$$\text{অতএব } \int_C (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dxdy$$

উদাহরণ :


- সমতলে  $y = 4x$  এবং  $y = 2x^2$  দ্বারা বদ্ধ কক্ষটিকে  $C$  ধরে

$\int (2ydx + 3xydy)$  সমাকলনটির মান সরাসরি নির্ণয় করুন এবং  $C$  কর্তৃক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটিকে  $S$  ধরে গ্রীনের উপপাদ্যের সাহায্যেও সমাকলনটির মান আরও একবার নির্ণয় করুন।

সমাধান :

প্রথম অংশ : এখানে  $y = 4x, y = 2x^2$  বক্রদুটি  $(2, 8)$  বিস্তৃতে ছেদ করে।

$$\int_C (2ydx + 3xydy)$$



$$= \int_0^2 (2.2x^2 dx + 3x \cdot 2x^2 \cdot 4x \cdot dx) + \int_2^0 (2.4x \cdot dx + 3x \cdot 4x \cdot 4 \cdot dx)$$

$$= \left[ 4 \cdot \frac{x^3}{3} + 24 \cdot \frac{x^5}{5} \right]_0^2 + \left[ 8 \cdot \frac{x^2}{2} + 48 \cdot \frac{x^3}{3} \right]_2^0$$

$$= 4 \cdot \frac{8}{3} + \frac{24}{5} \cdot 32 - 16 - 16 \cdot 8 = \frac{304}{15}$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ :

$$\text{ଗ୍ରୀନେର ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ } \int_C (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\therefore \int_C (2y dx + 3xy dy) = \int_{x=0}^2 \int_{y=2x^2}^{4x} \left[ \frac{\partial(3xy)}{\partial x} - \frac{\partial(2y)}{\partial y} \right] dx dy$$

$$= \int_{x=0}^2 \int_{y=2x^2}^{4x} (3y - 2) dx dy$$

$$= \int_0^2 \left[ \frac{3y^2}{2} - 2y \right]_{2x^2}^{4x} dx = \int_0^2 \left( 48 \frac{x^2}{2} - 8x - \frac{12}{2} x^4 + 4x^2 \right) dx$$

$$= \int_0^2 (28x^2 - 8x - 6x^4) dx = \left[ 28 \frac{x^3}{3} - 8 \frac{x^2}{2} - 6 \frac{x^5}{5} \right]_0^2$$

$$= \frac{28}{3} \cdot 8 - 4 \cdot 4 - \frac{6}{5} \cdot 32 = \frac{304}{15}$$

$$2. \text{ ଗ୍ରୀନେର ଉପପାଦ୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟେ } \int_C \{(x - y^2) dx + (y + \sin x) dy\}$$

ସମ୍ମାନକଲ୍‌ଟିର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ସେଇବେଳେ C ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବା

ସମତଳେ ଏକଟି ଆଯାତକ୍ଷେତ୍ର ଯାର କୌଣ୍କିକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ି (0,0),


$$\left( \frac{\pi}{2}, 0 \right), \left( \frac{\pi}{2}, 1 \right), (0, 1).$$

ସମାଧାନ : ସମତଳେ ଗ୍ରୀନେର ଉପପାଦ୍ୟ ଥେବେ ପାଇ,

$$\int_C (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy.$$

$$\text{ଏଥାନେ } F = x - y^2, G = y + \sin x$$

$$\therefore \frac{\partial G}{\partial x} = \cos x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -2y$$




ଟିପ୍ପଣୀ : 11

$$\begin{aligned}\therefore \int_C \left\{ (x - y^2)dx + (y + \sin x)dy \right\} &= \iint_S (\cos x + 2y) dx dy \\ &= \int_{x=0}^{\pi/2} \int_{y=0}^1 (\cos x + 2y) dx dy = \int_0^{\pi/2} \left[ y \cos x + y^2 \right]_0^1 dx \\ &= \int_0^{\pi/2} (\cos x + 1) dx = [\sin x + x]_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= 1 + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

3. xy সমতলে (0,0), (1,0), (1,2) কোণিক বিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজকে C ধরে  $\int_C (ye^x dx + xe^y dy)$  সমাকলন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্যটি যাচাই করুন।

সমাধান : এখানে প্রদত্ত ত্রিভুজটি OAB এবং OA, AB, OB-এর সমীকরণ যথাক্রমে  $y = 0$ ,  $x = 1$  ও  $y = 2x$ .

টিরিঃ 12



$$\text{এখন, } \int_{OA} (ye^x dx + xe^y dy) = \int_0^1 (0 \cdot e^x \cdot dx + x \cdot e^0 \cdot 0) \quad [ \because y = 0, dy = 0 ] \\ = 0$$

$$\int_{AB} (ye^x dx + xe^y dy) = \int_0^2 (y \cdot e^1 \cdot 0 + 1 \cdot e^y \cdot dy) \quad ( \because x = 1, dx = 0 ) \\ = \int_0^2 e^y dy = [e^y]_0^2 = e^2 - 1$$

$$\int_{BO} (ye^x dx + xe^y dy) = \int_1^0 \left( 2xe^x dx + xe^{2x} \cdot 2dx \right) \quad [ \because y = 2x, dy = 2dx ] \\ = 2 \left[ xe^x - e^x \right]_1^0 + 2 \left[ x \frac{e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} \right]_1^0 \quad [\text{আংশিক সমাকলন করে}]$$

$$= 2[0 - 1 - e + e] + 2 \left[ 0 - \frac{1}{4} - \frac{e^2}{2} + \frac{e^2}{4} \right]$$

$$= -2 - \frac{1}{2} - \frac{e^2}{2} = -\frac{5}{2} - \frac{e^2}{2}$$

$$\therefore \int_C (ye^x dx + xe^y dy) = \int_{OA} (y \cdot e^x \cdot dx + x \cdot e^y \cdot dy) + \int_{AB} (ye^x dx + xe^y dy) \\ + \int_B^0 (ye^x dx + xe^y dy)$$

$$= 0 + e^2 - 1 - \frac{5}{2} - \frac{e^2}{2} = \frac{e^2}{2} - \frac{7}{2} \quad \dots\dots (i)$$

$$\begin{aligned}
 \text{গীনের উপপাদ্য অনুমায়ী } \int_C (ye^x dx + xe^y dy) &= \iint_S \left[ \frac{\partial(ye^y)}{\partial x} - \frac{\partial(ye^x)}{\partial y} \right] dx dy \\
 &= \iint_S (e^y - e^x) dx dy \text{ হওয়া উচিত।}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এখন } \iint_S (e^y - e^x) dx dy &= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{2x} (e^y - e^x) dx dy \\
 &= \int_0^1 (e^y - ye^x) \Big|_0^{2x} dx = \int_0^1 (e^{2x} - 2xe^x - 1) dx \\
 &= \left[ \frac{1}{2}e^{2x} - 2\left(xe^x - e^x\right) - x \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2}e^2 - 2(e - e) - 1 - \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{7}{2} \quad \dots \text{ (ii)}
 \end{aligned}$$

অতএব (i) ও (ii) থেকে প্রমাণিত হয় যে গীনের উপপাদ্যটি একেত্রে সত্য।

## 9.4 স্টোকের উপপাদ্য (Stoke's Theorem) :

যদি  $F(r)$  ভেল্টের পয়েন্ট ফাংশনটির দুই দিক মুক্ত (Open & two sided)  $S$  তলে সজ্ঞান অবকল সহগ থাকে এবং নিজে নিজে ছেদিত হয় না।


এমন একটি সহজবদ্ধ বক্র হারা যদি

এই  $S$  তলাটি বেষ্টিত থাকে, তবে

$$\iint_S \operatorname{curl} F \cdot n ds = \oint_C F \cdot dr$$

এখানে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে  $C$  বরাবর গমন করলে  $S$  অঞ্চলটি যেন সর্বদা বাম দিকে থাকে এবং তান হাত দিয়ে একটি স্কুলে একটি ভেল্টের দিকে থাকে যে খেনো হানে একক লম্ব ভেল্টের হারা নিম্নেশিত।

প্রমাণ : ধরা যাক, সহজবদ্ধ বক্র  $C$  হারা বেষ্টিত অঞ্চল  $S$  এর  $xy$ ,  $yz$ , এবং  $zx$  তলে সম্পূর্ণ অভিক্ষেপ নিলে



চিত্র 13

তারাও সহজবন্ধ বক্র দ্বারা বেষ্টিত থাকে। চিরে প্রদর্শিত  $xy$  তলে লম্ব অভিক্ষেপ  $S_1$ , ক্ষেত্রটি  $T$  বক্র দ্বারা বেষ্টিত। আরও ধরা যাক  $S$  এর সমীকরণ

$$z = f(x, y) \text{ বা } x = g(y, z)$$

$$\text{বা } y = h(x, z), \text{ যখন}$$

$f, g, h$  অত্যোকেই এক মান বিশিষ্ট সম্মত এবং অবকলনযোগ্য ফাংশন।

যদি  $\mathbf{F}(x, y, z) = F_1(x, y, z)\mathbf{i} + F_2(x, y, z)\mathbf{j} + F_3(x, y, z)\mathbf{k}$  হয় তবে

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \nabla \times (F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n}$$

$$\text{এখন } \nabla \times F_1\mathbf{i} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial F_1}{\partial z}\mathbf{j} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\mathbf{k}$$

$$\text{অতএব } [\nabla \times F_1\mathbf{i}] \cdot \mathbf{n} \cdot ds = \left( \frac{\partial F_1}{\partial z} \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \right) ds \quad \dots \text{ (i)}$$

আবার যদি  $S$  এর সমীকরণ  $z = f(x, y)$  এবং  $S$  এর উপর যে কোনো বিন্দুর হান ডেক্টর  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  ধরা হয়, তবে  $\mathbf{r} = xi + yj + f(x, y)\mathbf{k}$  এবং  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = j + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{k}$  হয়।

যেহেতু  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}$  ডেক্টরটি  $S$ -এর  $(x, y, z)$  বিন্দুতে স্পর্শক দিকে তাই  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}$  নির্দেশিত এইটি অভিলম্ব  $\mathbf{n}$  এর  
সঙ্গে লম্ব অর্থাৎ  $\mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = 0$  অতএব  $\mathbf{n} \cdot \left( j + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{k} \right) = 0$ , বা  $\mathbf{n} \cdot j = -\frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k}$

এটি (i) নং-এ বসিয়ে পাই

$$\begin{aligned} [\nabla \times F_1\mathbf{i}] \cdot \mathbf{n} \cdot ds &= \left( -\frac{\partial F_1}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \right) ds \\ &= -\left( \frac{\partial F_1}{\partial y} + \frac{\partial F_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} ds \quad \left[ \because \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} \right] \\ &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} ds, \text{ যখন } F_1(x, y, z) = F_1[x, y, f(x, y)] = \phi(x, y) \\ &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} dx dy \end{aligned}$$

$$\therefore \iint_S [\nabla \times F_1 i] \cdot n ds = \iint_{S_1} \frac{\partial \phi}{\partial y} dx dy$$

$$= \oint_{C_1} \phi dx, S_1 \text{ অঞ্চলের জন্য } xy \text{ তলে গ্রীনের উপপাদ্য অনুযায়ী}$$

$$= \oint_C F_1 dx, \text{ ষেহেতু } C \text{ এর উপর } (x, y) \text{ বিন্দুতে } \phi \text{ এর মান } C \text{-তে } (x, y, z)$$

বিন্দুতে  $F_1$  এর মানের সমান এবং উভয় বক্রে  $dx$  একই।

অনুরূপে অন্য অক্ষতলগুলিতে  $S$  এর লম্ব অভিক্ষেপ নিয়ে প্রমাণ করা যায়।

$$\iint_S [\nabla \times F_2 j] \cdot n ds = \oint_C F_2 dy$$

$$\text{এবং } \iint_S [\nabla \times F_3 k] \cdot n ds = \oint_C F_3 dz$$

উপরোক্ত ফল তিনটিকে যোগ করে পাই

$$\iint_S \operatorname{curl} F \cdot n ds = \oint_C F \cdot dr$$

যদি কোনো ক্ষেত্রে  $S$  এর উপর আরোপিত শর্ত পালিত না হয় তাহলেও স্টোকের উপপাদ্য প্রমাণ করা যাবে  $S$ -কে কক্ষকগুলি উপঅঞ্চলে বিভক্ত করা যায় যাদের প্রত্যেকটি সহজবদ্ধ বক্র দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রত্যেকটির অক্ষতলগুলিতে সহজ বদ্ধ বক্র দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রত্যেকটির অক্ষতলগুলিতে সহজ বদ্ধ বক্র দ্বারা বেষ্টিত লম্ব অভিক্ষেপ থাকে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক উপ অঞ্চলে স্টোকের উপপাদ্য পালিত হবে। এখন সমস্ত উপঅঞ্চলের জন্য স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী সমাকল সমীকরণগুলি লিখে এবং পরে সমস্ত সমীকরণগুলি যোগ করে সমগ্র অঞ্চল  $S$  এর জন্য যে উপপাদ্যটি পালিত হয় তা প্রমাণ করা যায়।

**মন্তব্য 1 :** স্টোকের উপপাদ্যের কার্তিয় গঠন।

ধরা যাক উপরোক্ত স্টোকের উপপাদ্য

$$F(x, y, z) = f_1(x, y, z)i + f_2(x, y, z)j + f_3(x, y, z)k$$

$n = \ell i + m j + n k$  এবং  $r = xi + yi + zk$  এখানে  $f_1, f_2, f_3$ , ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশনসমূহ এবং  $n$  ডেক্সেরের দিক কোসাইনগুলি  $\ell, m, n,$

$$\therefore F \cdot dr = (f_1 i + f_2 j + f_3 k) \cdot dx i + dy j + dz k$$

$$= f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz$$

$$\text{curl } \mathbf{F} = i \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + j \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + k \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

$$\therefore \text{curl } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) l + \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) m + \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) n$$

অতএব স্টোকের উপপাদ্য

$$\iint_s \text{curl } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

এর কার্তিয় গঠন

$$\iint_s \left[ \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) l + \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) m + \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) n \right] ds = \int_c (f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz)$$

$$\text{বা, } \iint_s \left[ \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) dy dz + \left( \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) dz dx + \left( \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) dx dy \right] = \int_c (f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz)$$

$$[\because l \, ds = \cos \alpha \, ds = dy \, dz \text{ ইত্যাদি}]$$

**মন্তব্য 2 :** যেহেতু  $xy$  তলে  $z = 0$  এবং  $dz = 0$ , ঐ তলে স্টোকের উপপাদ্যের কার্তিয় রূপ মন্তব্য । অনুযায়ী হয়।

$$\iint_s \left( \frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) dx dy = \int_c (f_1 dx + f_2 dy)$$

এটি 9.3 অনুচ্ছেদে বর্ণিত সামতলিক ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্য।

#### 9.4.1 স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী কিছু সিদ্ধান্ত (deduction)

$$\text{i) } \int_c \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{ii) } \int_c \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = 2 \iint_s \mathbf{n} \, ds = 2 \iint_s ds$$

$$\text{iii) } \int_c \phi \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$iv) \int_C \phi \, dr = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla \phi) \cdot d\mathbf{s}, \quad [\phi \text{ সম্পৃক্ত ক্ষেত্রের পয়েন্ট ফাংশন}]$$

$$v) \int_C d\mathbf{r} \cdot \mathbf{f} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \cdot \mathbf{f} \, d\mathbf{s}$$

$$vi) \int_C d\mathbf{r} \times \mathbf{f} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \cdot \mathbf{f} \, d\mathbf{s}$$

সমাধান : স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s} = \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$$

i)  $\mathbf{f} = \mathbf{r}$  ধরে স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s} = \int_C \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\text{বা } 0 = \int_C \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} \quad [\because \operatorname{curl} \mathbf{r} = 0]$$

ii)  $\mathbf{f} = \mathbf{a} \times \mathbf{r}$ , যখন  $\mathbf{a}$  একটি যদৃচ্ছ ফ্রিক ভেস্টের, ধরলে

$$\operatorname{curl} \mathbf{f} = \operatorname{curl}(\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = +2\mathbf{a} \quad [\text{একক } 8\text{-এর উদাহরণ } 4 \text{ ছষ্টব্য } (87 \text{ পৃষ্ঠায়)]$$

∴ গাউসের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\begin{aligned} \int_C (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \mathbf{n} \cdot \operatorname{curl}(\mathbf{a} \times \mathbf{r}) \, d\mathbf{s} \\ &= \iint_S \mathbf{n} \cdot 2\mathbf{a} \, d\mathbf{s} = 2\mathbf{a} \cdot \iint_S \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \quad [\because \mathbf{a} \text{ ফ্রিক ভেস্টের}] \\ \therefore \int_C \mathbf{a} \cdot (\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) &= 2\mathbf{a} \cdot \iint_S \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \quad [\because \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}] \end{aligned}$$

$$\text{বা, } \mathbf{a} \cdot \left[ \int_C \mathbf{r} \times d\mathbf{r} - 2 \iint_S \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \right] = 0$$

$$\therefore \int_C \mathbf{r} \times d\mathbf{r} - 2 \iint_S \mathbf{n} \, d\mathbf{s} = 0, \text{ যেহেতু } \mathbf{a} \text{ যে কোন একটি যদৃচ্ছ ফ্রিক ভেস্টের।}$$

$$\therefore \int_C \mathbf{r} \times d\mathbf{r} = 2 \iint_S \mathbf{n} \, d\mathbf{s}$$

iii)  $\mathbf{f} = \phi \nabla \phi$  ধরে স্টোকের উপপাদ্য প্রয়োগ করলে পাই-

$$\begin{aligned} \int_C (\phi \nabla \phi) \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \operatorname{curl}(\phi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \\ &= \iint_S [(\operatorname{grad} \phi) \times (\operatorname{grad} \phi) + \phi \operatorname{curl}(\operatorname{grad} \phi)] \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \\ &= 0, \quad \text{যেহেতু } (\operatorname{grad} \phi) \times \operatorname{grad} \phi = 0 \quad \text{এবং } \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi = 0 \end{aligned}$$

iv) যে কোন যদৃচ্ছ ফ্রিক ভেস্টের হলে  $\mathbf{f} = \mathbf{a} \phi$  এর জন্য স্টোকের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই,

$$\int_C \mathbf{a} \phi \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl}(\mathbf{a} \phi) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

বা,  $\mathbf{a} \cdot \int_C \phi d\mathbf{r} = \iint_S \text{grad } \phi \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} \, ds$  [ $\because \mathbf{a}$  ফ্রিক ভেস্টের এবং  $\text{curl}(\mathbf{a} \phi) = \text{grad } \phi \times \mathbf{a}$ ]

$$= \mathbf{a} \cdot \iint_S (\mathbf{n} \times \text{grad } \phi) \, ds$$
 [ভেস্টেরের গুণনের নিয়ম অনুযায়ী]

$$\therefore \int_C \phi \, d\mathbf{r} = \iint_S (\mathbf{n} \times \text{grad } \phi) \, ds, \text{ যেহেতু } \mathbf{a} \text{ যে কোনো যদৃচ্ছ ফ্রিক ভেস্টের।}$$

v) যেহেতু  $\nabla$  একটি ভেস্টের অপারেটর, গুণনের নিয়মানুযায়ী-

$$(\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{n} \times \nabla) \cdot \mathbf{f}$$

$\therefore$  স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

বা  $\int_C d\mathbf{r} \cdot \mathbf{f} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \mathbf{f} \, ds$

vi) যদি  $\mathbf{a}$  যে কোনো একটি যদৃচ্ছ ফ্রিক ভেস্টের হয় তবে  $\mathbf{F} = \mathbf{a} \times \mathbf{f}$  ভেস্টের জন্য স্টোকে উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\int_C (\mathbf{a} \times \mathbf{f}) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl}(\mathbf{a} \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

আমরা জানি  $\text{curl}(\mathbf{a} \times \mathbf{f}) = \mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{f} - \mathbf{f} \cdot \nabla \mathbf{a} + (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{f}$

$$= \mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{f} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{f} \quad [\because \mathbf{a} \text{ ফ্রিক ভেস্টের}]$$

$$\therefore \int_C (\mathbf{a} \times \mathbf{f}) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S [\mathbf{a} \cdot \nabla \mathbf{f} - (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{f}] \cdot \mathbf{n} \, ds$$

বা,  $\int_C \mathbf{a} \cdot \mathbf{f} \times d\mathbf{r} = \iint_S [\mathbf{a} \cdot (\nabla \mathbf{f}) \mathbf{n} - \mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{f} \cdot \mathbf{n})] \, ds$

$$\because [(\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{f}] \cdot \mathbf{n} = \mathbf{a} \cdot \nabla(\mathbf{f} \cdot \mathbf{n}) \text{ এখানে } \nabla \text{ অপারেটরের সাপেক্ষে } \mathbf{n} \text{ ফ্রিক ভেস্টের ]$$

বা,  $\mathbf{a} \cdot \int_C \mathbf{f} \times d\mathbf{r} = \mathbf{a} \iint_S [(\nabla \mathbf{f}) \mathbf{n} - \nabla(\mathbf{f} \cdot \mathbf{n})] \, ds$

বা,  $\mathbf{a} \cdot \int_C \mathbf{f} \times d\mathbf{r} = \mathbf{a} \iint_S [-(\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{f}] \, ds$

$$\therefore \int_C \mathbf{f} \times d\mathbf{r} = - \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{f} \, ds$$

$$\text{বা, } \int_C d\mathbf{r} \times \mathbf{f} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{f} \, ds$$

### 9.4.2 উদাহরণমালা — B

1. প্রমাণ করুন যে

$$i) \int_C \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \psi \nabla \phi \cdot d\mathbf{r}$$

$$ii) \int_C \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{r} = \iint_S [\nabla \phi \times \nabla \psi] \cdot \mathbf{n} \, ds.$$

সমাধান :—

i) স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী  $\mathbf{f} = \nabla(\phi\psi)$  থেরে

$$\begin{aligned} \int_C \nabla(\phi\psi) \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \nabla(\phi\psi)) \cdot \mathbf{n} \, ds \\ &= 0 \quad [\because \text{curl grad} = 0, \text{ যখন } \mathbf{u} \text{ ছেলার ফাংশন}] \end{aligned}$$

$$\text{বা, } \int_C [\phi \nabla \psi + \psi \nabla \phi] \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad [\because \nabla(\phi\psi) = \phi \nabla \psi + \psi \nabla \phi]$$

$$\text{বা, } \int_C \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \psi \nabla \phi \cdot d\mathbf{r}$$

ii)  $\mathbf{f} = \phi \nabla \psi$  থেরে স্টোকের উপপাদ্য কাজে সাগিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} \int_C \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S [\nabla \times (\phi \nabla \psi)] \cdot \mathbf{n} \, ds \\ &= \iint_S \{(\nabla \phi \times \nabla \psi) + \phi (\text{curl grad } \psi)\} \cdot \mathbf{n} \, ds \\ &= \iint_S (\nabla \phi \times \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} \, ds, \quad \text{যেহেতু curl grad } \psi = 0 \end{aligned}$$

2. স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে প্রমাণ করুন যে,

$$(i) \operatorname{div} \operatorname{curl} \mathbf{f} = 0 \text{ এবং } (ii) \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi = 0$$

সমাধান : (i) ধরা যাক,  $S$  তলাদ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল  $V$  এবং একটি বন্ধ (closed) বক্স  $C$  দ্বারা  $S$  তলকে দৃঢ়ি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে  $S_1$  ও  $S_2$ .

এখন গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী পাই,

$$\begin{aligned}
 \iiint_v \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) dv &= \iint_s \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds \\
 &= \iint_{S_1} \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds + \iint_{S_2} \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds \\
 &= \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} + \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী।}
 \end{aligned}$$

এখন যেহেতু  $S_1$  ও  $S_2$  তল দুটি  $C$  বক্রের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত উপরের সমাকল দুটি  $C$  বরাবর বিপরীত দিকে নির্দেশিত।

অতএব তাদের সমষ্টি শূন্য হবে; অর্থাৎ

$$\iiint_v \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) dv = 0$$

কিন্তু এটি আয়তনের সমস্ত ক্ষুদ্র অংশ  $dv$  এর জন্যই সত্য ; অতএব  $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = 0$

ii) যদি  $\mathbf{f} = \operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi$  ধরে স্টোকের উপপাদ্য প্রয়োগ করা যায় তবে,

$$\begin{aligned}
 \iint_S (\operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi) \cdot \mathbf{n} ds &= \int_C \operatorname{grad} \phi \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \int_C \left( i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \cdot (i dx + j dy + k dz) \\
 &= \int_C \left( \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \right) \\
 &= \int_C \partial \phi = 0, \quad \text{যেহেতু } C \text{ একটি বক্র বক্র।}
 \end{aligned}$$

যেহেতু এটি যে কোনো (arbitrary)  $S$  এর জন্যই সত্য, অতএব

$$\operatorname{curl} \operatorname{grad} \phi = 0$$

3. স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে

$$\int_C (xe^x dx + ye^y dy + ze^z dz)$$

এর মান নির্ণয় করুন যখন  $C$  বক্রের সমীকরণ  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 3$ .

সমাধান : এখানে  $xe^x dx + ye^y dy + ze^z dz = \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$  ধরলে

$$\mathbf{f} = xe^x \mathbf{i} + ye^y \mathbf{j} + ze^z \mathbf{k} \text{ হয়।}$$

$$\text{এখন } \operatorname{curl} \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xe^x & ye^y & ze^z \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \int_{C} (xe^x dx + ye^y dy + ze^z dz) = \int_{S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$$

$$= \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds, \text{ স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী} \\ = 0, \text{ যেহেতু } \operatorname{curl} \mathbf{f} = 0$$

4.  $\int_{C} (x^3 y dx + xy^3 dy)$ , সমাকলিতির মান স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে নির্ণয় করুন, যখন C বক্রতি  $xy$  তলে একটি আয়তক্ষেত্র যার শীর্ষ বিন্দুগুলি  $(0,0), (b,0), (b,a), (0,a)$ ,

সমাধান :- এখানে  $\mathbf{f} = x^3 y \mathbf{i} + xy^3 \mathbf{j}$  ধরে

$$\operatorname{curl} \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^3 y & xy^3 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0) + \mathbf{j}(0) + \mathbf{k}(y^3 - x^3) \\ = \mathbf{k}(y^3 - x^3)$$

আবার  $xy$  তলে লম্ব  $\mathbf{n} = \mathbf{k}$

$$\therefore \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = [\mathbf{k}(y^3 - x^3)] \cdot \mathbf{k} = y^3 - x^3$$

$$\therefore \int_{C} (x^3 y dx + xy^3 dy) = \int_{C} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$$

$$= \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds, \text{ স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী}$$

$$= \int_{x=0}^b \int_{y=0}^a (y^3 - x^3) \, dx \, dy$$

$$= \int_0^b \left( \frac{y^4}{4} - x^3 y \right)_0^a \, dx$$

$$= \int_0^b \left( \frac{a^4}{4} - ax^3 \right) dx$$

$$= \left[ \frac{a^4}{4}x - a \frac{x^4}{4} \right]_0^b$$

$$= \frac{a^4 b}{4} - \frac{ab^4}{4} = \frac{ab}{4} (a^3 - b^3)$$

5 যদি C বক্তৃতি  $(0,0,0), (1,0,0), (1,1,0)$  বিশ্বগুলি শীর্ষবিন্দু এমন একটি ত্রিভুজ হয় তবে স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে

$$\int_C [(x^2y)\mathbf{i} + (xy^2)\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}] \cdot d\mathbf{r}$$


এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : এখানে  $O (0,0,0)$  ও  $A (0,0,0)$  বিশ্বব্য  
সংযোগকারী বাহু  $AB$ -এর সমীকরণ  $y = 0, z = 0$  ;  
 $B$  বিশ্বুর হানাক  $(1,1,0)$  অতএব  $AB$  বাহুর সমীকরণ  
 $x = 1, z = 0$  এবং  $OB$  বাহুর সমীকরণ  $y = x, z = 0$ .

$\therefore$  স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\mathbf{f} = x^2y\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$$

$$\text{ধরলে } \int_C (x^2y\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$



চিত্র 14

$$\text{কিন্তু এখানে } \text{curl } \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & xy^2 & e^z \end{vmatrix}$$

$$= i.0 + j.0 + k(x^2 - y^2)$$

$$= -(x^2 - y^2)\mathbf{k}$$

$$\therefore \text{curl } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = -(x^2 - y^2)\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \quad [\because \mathbf{n} = \mathbf{k}, xy \text{ তলে}]$$

$$= -x^2 + y^2$$

$$\therefore \text{নির্ণয় সমাকল} = \iint_S \text{curl } f \cdot n \, ds$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x -\left(x^2 - y^2\right) dx dy \\
&= \int_0^1 -\left(x^2 y - \frac{y^3}{3}\right)_0^x dx = \int_0^1 -\frac{2x^3}{3} dx \\
&= -\frac{2}{3} \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{6}
\end{aligned}$$

6. স্টোকের উপপাদ্য ব্যবহার করে  $\iint_S (\nabla \times f) \cdot n \, ds$ -এর মান নির্ণয় করন্ত যখন

$f = (x^2 - y)i + (y^2 - z)j + (z^2 - x)k$  এবং  $xy$ -তলের উপরের দিকে  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  গোলকের তল  $S$ .

সমাধান :  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  গোলকটি  $xy$  তল দ্বারা  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $z = 0$  বৃত্তে ছেদিত হয় এই বৃত্তকে  $C$  ধরলে তার প্যারামেট্রিক সমীকরণ হয়  $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ .

$\therefore$  স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\begin{aligned}
\iint_S (\nabla \times f) \cdot n \, ds &= \int_C f \cdot r \, dr \\
&= \int_C (x^2 - y)dx + (y^2 - z)dy + (z^2 - x)dz \\
&= \int_0^{2\pi} \left[ \{a^2 \cos^2 \theta - a \sin \theta\}(-a \sin \theta) d\theta + a^2 \sin^2 \theta(a \cos \theta) d\theta \right] \\
&\quad [\because C \text{ এর উপর } x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = 0 \text{ এবং } 0 \leq \theta \leq 2\pi] \\
&= a^2 \int_0^{2\pi} [-a \cos^2 \theta \sin \theta + \sin^2 \theta + a \sin^2 \theta \cos \theta] d\theta \\
&= -a^3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta + a^3 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta + a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta
\end{aligned}$$

$$= -a^3 \cdot 0 + a^2 \cdot 2 \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta + a^3 \cdot 2 \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \cos \theta \, d\theta$$

$\left[ \because \int_0^{2a} f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx, \text{ যখন } f(2a-x) = f(x) \text{ এবং} \right]$

$$\int_0^{2a} f(x)dx = 0, \text{ যখন } f(2a-x) = -f(x)]$$

$$= 2a^2 \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta + 2a^3 \cdot 0$$

$$= 4a^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi a^2$$

7. অক্ষতলগুলি  $x+y+z=1$  তলটিকে প্রথম অষ্টমাংশে (first octant) যে ত্রিভুজাকৃতি তল ছিল করে তাকে S এবং বাহুগুলির দ্বারা উৎপন্ন বন্ধ বক্রটিকে C ধরে ডেস্ট্রে ফাংশন  $f = (xy, yz, zx)$ -এর জন্য স্টোকের উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

সমাধান : এখানে ABC ত্রিভুজের তল S ; AB, BC  
এবং CA বাহুগুলির দ্বারা গঠিত বক্র C ; যখন A, B, ও C  
এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $(1,0,0)$ ,  $(0,1,0)$  ও  $(0,0,1)$

স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_S \operatorname{curl} f \cdot n \, ds = \int_C f \cdot dr \quad \dots \dots (i)$$

বামপক্ষের সমাকলের মান নির্ণয়ের জন্য ধরা যাক


$$\phi = x + y + z - 1.$$

$$\therefore \mathbf{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} = \frac{i + j + k}{\sqrt{3}}. \text{ যেহেতু } \nabla \phi = i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

এবং  $n \cdot k = \frac{1}{\sqrt{3}} (i + j + k) \cdot k = \frac{1}{\sqrt{3}}$  যখন xy তলের উপর ABC ত্রিভুজের অর্ধাংশ S এর লম্ব অভিক্ষেপ OAB ত্রিভুজের তল এবং এই OAB তলকে R দ্বারা চিহ্নিত করলে এই R-এর উপর একক লম্ব ডেস্ট্রে k.

আবার  $\operatorname{curl} f = -yi - zj - xk,$

$$\text{আবার } \operatorname{curl} f \cdot n = -(yi + zj + xk) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} (i + j + k)$$



চিত্র 15

$$= -\frac{1}{\sqrt{3}}(y+z+x) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad [\because S তলের সমীকরণ x+y+z=1]$$

$$\therefore (i) \text{এর বামপক্ষ} = \iint_S \operatorname{curl} f \cdot n \, ds = \iint_R \operatorname{curl} f \cdot n \, ds$$

$$= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} \left( -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) |n \cdot k| \, dy \, dx \quad [\because R তলটি x=0, y=0 \text{ এবং } x+y=1]$$

সরলরেখাগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ]

$$= -\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} dx \, dy \quad \left[ \because |n \cdot k| = \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

$$= - \int_0^1 (1-x) dx = - \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{1}{2}$$

আবার (i)-এর ডানপক্ষ

$$\begin{aligned} &\triangleq \int_c f \cdot dr = \int_c (xyi + yzj + zxk) \cdot (dx i + dy j + dz k) \\ &= \int_{AB+BC+CA} (xy \, dx + yz \, dy + zx \, dz) \quad \dots \dots (ii) \end{aligned}$$

$$\text{এখন } AB \text{ সরলরেখার সমীকরণ } \frac{x-1}{1-0} = \frac{y-0}{0-1} = \frac{z-0}{0-0} = t \text{ (ধরি)}.$$

অতএব তার প্যারামেট্রিক সমীকরণ  $x=t+1, y=-t, z=0$  এবং  $A(1,0,0)$  ও  $B(0,1,0)$  বিন্দুয়ে  $t=0$  ও  $t=-1$  এর জন্য নির্দেশিত। সূতরাং

$$\begin{aligned} \int_{AB} (xy \, dx + yz \, dy + zx \, dz) &= \int_0^{-1} (t+1)(-t) dt \\ &= \left[ -\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^{-1} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } BC \text{ সরলরেখার সমীকরণ } \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-1}{0-1} = \frac{z-0}{1-0} = \theta \text{ (ধরি)}.$$

অতএব ইহার প্যারামেট্রিক সমীকরণ  $x=0, y=1-\theta, z=\theta$  এবং  $B$  ও  $C$  বিন্দুয়ে  $\theta=0, 30=1$  মানের জন্য নির্দেশিত।

$$\text{সূত্রাঃ } \int_{BC} (xy dx + yz dy + zx dz) = \int_0^1 (1-\theta)\theta(-d\theta)$$

$$= \left[ -\frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^3}{3} \right]_0^1 = -\frac{1}{6}$$

$$\text{অনুকরণে দেখান যাই যে, } \int_{CA} (xy dx + yz dy + zx dz) = -\frac{1}{6}$$

$$\text{অতএব (i) এর ভাবপক্ষ } = -\frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$\therefore (i) \text{ এর বামপক্ষ } = -\frac{1}{2} = \text{ ভাবপক্ষ}$$

অতএব স্টোকের উপপাদ্যটি সত্য।

8.  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলকের  $xy$  তলের উপরের অর্ধাংশের তলকে  $S$ , এবং ইহা  $xy$ -তলকে যে বৃত্তে ছেদ করে তাকে  $C$  দ্বারা চিহ্নিত করলে  $\mathbf{f} = (2x-y)\mathbf{i} - yz^2\mathbf{j} - y^2z\mathbf{k}$  ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশনের জন্য স্টোকের উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই করুন।

সমাধান : এখানে  $C$  এর সমীকরণ  $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ .

$$\begin{aligned}\therefore \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C [(2x-y)\mathbf{i} - yz^2\mathbf{j} - y^2z\mathbf{k}] \cdot [dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}] \\ &= \int_C (2x-y)dx \quad [\because C \text{ এর উপর } z=0, dz=0] \\ &= \int_0^{2\pi} (2\cos\theta - \sin\theta)(-\sin\theta)d\theta \quad [\because C \text{ এর প্যারামেট্রিক সমীকরণ} \\ &\qquad \qquad \qquad x = \cos\theta, y = \sin\theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi, z = 0] \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2\theta - \sin 2\theta)d\theta = \pi - 0 = \pi\end{aligned}$$

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS \text{ নির্ণয়ের জন্য } \operatorname{curl} \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x-y & -yz^2 & -y^2z \end{vmatrix} = \mathbf{k}$$

$$\text{এবং } \phi = x^2 + y^2 + z^2 - 1 \text{ ধরে } n = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} = \frac{2xi + 2yj + 2zk}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}} \\ = xi + yj + zk$$

$$\therefore \operatorname{curl} f \cdot n = k \cdot (xi + yj + zk) = z$$

$$\text{আবার, } \iint_S \operatorname{curl} f \cdot n \, ds = \iint_S z \frac{dx \, dy}{n \cdot k} = \iint_S dx \, dy \quad [\because n \cdot k = z]$$

$$= \int_{x=-1}^1 \int_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1+x^2}} dx \, dy = 2 \times 2 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \, dy = 4 \int_0^1 [y]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \\ = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = 4 \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt, \text{ যখন } x = \sin t \\ = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi$$

$$\therefore \iint_S \operatorname{curl} f \cdot n = \int_C f \cdot dr \text{ অর্থাৎ স্টোকের উপপাদ্যটি সত্য।}$$

9 xy-তলের উপরের দিকে অবস্থিত

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax + az = 0 \text{ তলকে } S \text{ এবং } z = 0 \text{ তলধ্বনি } S \text{ এর ছেদিত বক্রকে } C \text{ ধরে}$$

$$f = (y^2 + z^2 - x^2, z^2 + x^2 - y^2, x^2 + y^2 - z^2)$$

এর জন্য স্টোকের উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই করুন

সমাধান : এখানে C বক্রের সমীকরণ

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0, z = 0$$


$$\text{i.e. } (x-a)^2 + y^2 = a^2, z = 0$$

যার প্যারামেট্রিক সমীকরণ

$$x = a + a \cos \theta, y = a \sin \theta$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \quad \text{এবং} \quad ds = r d\theta dr \text{ যখন}$$

$$0 \leq r \leq a \quad \text{এবং} \quad n = k.$$



চিত্র 16

$$\operatorname{curl} \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial k} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 - x^2 & z^2 + x^2 - y^2 & x^2 + y^2 - z^2 \end{vmatrix} = 2[i(y-z) + j(z-x) + k(x-y)]$$

$$\therefore \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} = 2(x-y) \quad [\because \mathbf{n} = \mathbf{k}]$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds &= 2 \int_{r=0}^a \int_{\theta=0}^{2\pi} (a + a \cos \theta - a \sin \theta) r d\theta dr \\ &= 2 \int_0^a ar[\theta]_0^{2\pi} dr + 0 - 0 \quad \left[ \because \int_0^{2\pi} \cos \theta = 0 = \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right] \\ &= 4\pi a \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^a = 2\pi a^3 \quad \dots (i) \end{aligned}$$

$$\text{আবার } \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_C [(y^2 - x^2)dx + (x^2 - y^2)dy] \quad [z = 0 \text{ বসিয়ে}]$$

$$\begin{aligned} &= \int_C (x^2 - y^2)(dy - dx) = \int_0^{2\pi} \{(a + a \cos \theta)^2 - a^2 \sin^2 \theta\} (a \cos \theta + a \sin \theta) d\theta \\ &= a^3 \int_0^{2\pi} (2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta)(\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= a^3 \int_0^{2\pi} (2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta) \cos \theta d\theta + a^3 \int_0^{2\pi} (2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta) \sin \theta d\theta \\ &= a^3 \cdot 2 \int_0^{\pi} (2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta) \cos \theta d\theta + a^3 \cdot 0 \quad \therefore \int_0^{2\pi} f(x) dx = 2 \int_0^{\pi} f(x) dx, \\ &= 4a^3 \int_0^{\pi} \cos^3 \theta d\theta + 4a^3 \int_0^{\pi} \cos^2 \theta d\theta \quad \text{যখন } f(2a - x) = f(x) \\ &= 4a^3 \cdot 0 + 4a^3 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 8a^3 \frac{\pi}{4} = 2\pi a^3 \quad \dots (ii) \end{aligned}$$

অঙ্গের (i) ও (ii) থেকে বলা যায়

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} \text{ অর্থাৎ স্টোকের উপপাদ্যটি সত্য।}$$

10. স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে প্রমাণ করুন যে


$$\int_C (ydx + zdy + xdz) = -2\sqrt{2\pi}a^2$$

যখন C বক্সটি  $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2ay = 0, x + y = 2a$  এবং এটি  $(2a, 0, 0)$  বিন্দু থেকে প্রথমে xy তলের নীচের দিকে যাচ্ছে।

সমাধান : যেহেতু  $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2ay = 0$

গোলকের কেন্দ্র  $(a, a, 0)$  এবং এই কেন্দ্রবিন্দুটি  $x + y = 2a$  তলাটিকেও সিঙ্গ ধরে অতএব C বক্সটি গোলকটির উপর অবস্থিত একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র  $(a, a, 0)$  এবং যার তল  $x + y = 2a$ .

এই বৃত্ত C-এর ব্যাসার্ক = গোলকের ব্যাসার্ক  
 $= \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$ , এবং C দ্বারা সীমাবদ্ধ তলাটিকে S  
 ধরলে তার উপর একক লম্ব ভেট্টার



চিত্র - 17

$$n = \frac{\text{grad}(x+y)}{|\text{grad}(x+y)|} = \frac{i+j}{\sqrt{i^2+j^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(i+j) \quad \dots(i)$$

এখন

$$\begin{aligned} \int_C (ydx + zdy + xdz) &= \int_C (yi + zj + xk) \cdot dr \\ &= \iint_S [\text{curl}(yi + zj + xk)] \cdot n ds \quad \dots(ii) \end{aligned}$$

[স্টোকের উপপাদ্য অনুযায়ী]

$$\text{কিন্তু } \text{curl}(yi + zj + xk) = -i - j - k$$

$\therefore (i)$  ও  $(ii)$  থেকে পাই

$$\text{নির্ণেয় সমাকল} = \iint_S (-i - j - k) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(i+j) ds$$

$$= \iint_S \left( -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) ds \quad [ \because i.i = j.j = k.k = 1 \text{ এবং } i.j = k.i = j.k = 0 ]$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{2}{\sqrt{2}} \iint_S ds \\
 &= -\sqrt{2} \times (a\sqrt{2} \text{ ব্যাসার্ধীবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল}) \\
 &= -\sqrt{2} \left[ \pi (a\sqrt{2})^2 \right] = -2\sqrt{2}\pi a^2
 \end{aligned}$$

## 9.5 সারাংশ

1. গাউসের ডাইভারেজেন্স উপপাদ্য : যদি  $f(x, y, z)$  ডেক্সের পয়েন্ট ফাংশনটির  $V$  অঞ্চলে সন্তুষ্ট অবকল সহগ থাকে এবং  $V$  অঞ্চলকে বেষ্টনকারী বক্ষতল  $S$ -এর বহিমুখী অভিলম্ব বরাবর একক ডেক্সের  $\mathbf{n}$  হয় তবে,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} \, dv$$

$$2. (\nabla \phi)_P = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_S \phi n \, ds}{\Delta V} \right\}, \quad (\nabla \cdot \mathbf{f})_P = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds}{\Delta V} \right\}$$

$$\text{এবং } (\nabla \times \mathbf{f})_P = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \left\{ \frac{\iint_S \mathbf{n} \times \mathbf{f} \, ds}{\Delta V} \right\}, \text{ যখন } P \text{ বিন্দুতে } \Delta S \text{ তল দ্বারা বেষ্টিত খুব ছোট একটি অঞ্চল } \Delta V.$$

3. সামতলিক ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্য : নিজে নিজে ছেদিত হয় না এমন একটি সহজ বক্ষ ক্রস  $C$  এর দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল  $S$ -এ যদি  $x$  ও  $y$  এর দুটি সন্তুষ্ট ফাংশন  $F(x, y)$  ও  $G(x, y)$  সংজ্ঞাত থাকে যাদের প্রি একই অঞ্চলে সন্তুষ্ট অবকল সহগ আছে, তাহলে

$$\int_C (F dx + G dy) = \iint_S \left( \frac{\partial G}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial y} \right) dx dy.$$

অবশ্য ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে  $C$  বরাবর গমন করলে  $S$  অঞ্চলটি যেন সর্বদা বাম দিকে থাকে।

4. স্টোকের উপপাদ্য যদি  $\mathbf{F}(r)$  ডেক্সের পয়েন্ট ফাংশনটির দুই দিক মুক্ত  $S$  তলে সন্তুষ্ট অবকল সহগ থাকে এবং নিজে ছেদিত হয় না এমন একটি সহজ বক্ষ দ্বারা যদি এই  $S$  তলাটি বেষ্টিত থাকে তবে

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

এখানে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে C বরাবর গমন করলে S অঞ্চলটি যেন সর্বদা বাম দিকে থাকে এবং তান হাত দিয়ে একটি ক্রুকে একই দিকে ঘোরালে তার গতির দিকে S এর যে কোন স্থানে একক ভেট্টার । আরা নির্দেশিত।

## 9.6 প্রশ্নাবলী

A

1. যে কোনো বক্ষতল S দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চল V হলে প্রমাণ করুন যে,

$$\text{i) } \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = 3V$$

$$\text{ii) } \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{v} d\mathbf{v} = S$$

$$\text{iii) } \iint_S (\operatorname{curl} \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = 0$$

$$\text{iv) } \iint_S (\nabla \phi \times \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = 0$$

$$\text{v) } \iint_S \frac{\mathbf{r}}{r^2} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \iiint_V \frac{1}{r^2} d\mathbf{v}$$

[সংকেত : গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্য ব্যবহার করুন।]

2. যদি V অঞ্চলে  $\phi$  ফাংশনটি হারযোনিক হয় এবং  $\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$  হয় তবে দেখান যে V অঞ্চলে  $\phi$  একটি প্রবর্ক ফাংশন। [ সংকেত : উদাহরণ A(9) কাজে লাগান ]

3. যদি  $\mathbf{f} = \nabla \phi$  এবং  $\nabla^2 \phi = 0$  তবে দেখান যে,

$$\iiint_V \mathbf{f}^2 d\mathbf{v} = \iint_S \phi \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s}$$

[ সংকেত : ডাইভারজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী  $\iint_S (\phi \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \iiint_V \operatorname{div}(\phi \mathbf{f}) d\mathbf{v}$

$$= \iiint_V (\phi \operatorname{div} \mathbf{f} + \mathbf{f} \cdot \nabla \phi) d\mathbf{v}, \operatorname{div} \mathbf{f} = \operatorname{div}(\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = 0, \mathbf{f} \cdot \nabla \phi = \mathbf{f} \cdot \mathbf{f} = \mathbf{f}^2 \text{ হওয়ারি।}$$

4. দেখান যে,  $\iint_S (\mathbf{f} \times \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \iiint_V (\nabla \phi) \cdot (\nabla \times \mathbf{f}) d\mathbf{v}$

5. গাউস ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সাহায্যে  $\iint_S f \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয় করন যখন  $S$  তলটি

$x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a$  তলগুলি দ্বারা বেষ্টিত ঘনক,  $f = (x^3 - yz)i - 3x^2yj + 5zk$  এবং  $S$  এর বাহিরের দিকে অভিসম  $n$

6.  $S$  তলটি  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$  তলগুলি দ্বারা বেষ্টিত ঘনক এবং  $f = (4xz, -y^2, yz)$  হলে গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই করুন।

7.  $x^2 + y^2 = 4, z = 0, z = 1$  চোঙের তল  $S$  এবং  $f = xi - yj + (z^2 - 1)k$  হলে  $\iint_S f \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয় করুন এবং ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই করুন।

8.  $\iint_S [x^2 dy dz + y^2 dz dx + 2z(xy - x - y) dx dy]$  এর মান নির্ণয় করুন যখন

$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$  ঘনকের তল  $S$  দ্বারা সূচিত।

[সংকেত : প্রদত্ত সমাকল  $= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \left[ \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(2z(xy - x - y))}{\partial z} \right] dv ]$

9.  $x^2 + y^2 = 9, z = 0, z = 4$  চোঙের তল  $S$  দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল  $V$  এবং  $f = (4x, -2y^2, z^2)$  হলে ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই করুন।

10. যদি  $f = (x^2 - y^2)i + (3 - 2xy)j + zk$  হয় তবে ডাইভারজেন্স উপপাদ্য কাজে লাগিয়ে  $\iint_S f \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয় করুন। যখন  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  গোলকের তল  $S$  দ্বারা সূচিত।

11.  $\iint_S (\text{curl } f) \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয় করুন যখন  $xy$  তলের উপরের দিকে অবস্থিত  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  গোলকের তলটি  $S$  এবং  $f = (z - y)i + (z + x)j - (x + y)k$ .

12. যদি  $S$  তলটি  $xy$  তলের উপরের দিকে অবস্থিত  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলক এবং  $z = 0$  তল দ্বারা গঠিত হয় তবে  $\iint_S (y^2 z^2 i + z^2 x^2 j + x^2 y^2 k) \cdot n \, ds$  এর মান নির্ণয় করুন এবং ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

13. যদেখন যে  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  এর তল  $S$  হলে

$$\iint_S (x^2 i + y^2 j + z^2 k) \cdot n \, ds = 0$$

$$\begin{aligned}
 &= \iiint_V \operatorname{div}(x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) dV = \int_{z=-c}^c \int_{y=b\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}} \int_{x=-a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}}^{a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}} (2x + 2y + 2z) dx dy dz \\
 &= \dots \dots \dots
 \end{aligned}$$

14.  $x = 0, y = 0, z = 0$  এবং  $x + y + z = 1$  অঞ্চলে  $\mathbf{f} = xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$  ভেক্টর ফাংশনের জন্য ডাইভারজেন্স উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

## B

1. স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে  $\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds$ -এর মান নির্ণয় করুন, যখন  $xy$  তলের উপরের দিকে

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$  গোলকের তল  $S$  দ্বারা নির্দেশিত এবং  $\mathbf{f} = (z-y)\mathbf{i} + (z+x)\mathbf{j} - (x+y)\mathbf{k}$ .

2. স্টোকের উপপাদ্যের সাহায্যে  $\int_C (2x \sin y dx + x^2 \cos y dy + z^2 dz)$ -এর মান নির্ণয় করুন যখন  $C$  বক্রের সমীকরণ  $x^2 + y^2 = 1, z = 2$ .

3. স্টোকের উপপাদ্য ব্যবহার করে  $\int_C z^3 dx - \cos x dy + (y+z) dz$  এর মান নির্ণয় করুন, যখন  $C$  বক্রটি  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1, z = 1$  আয়তক্ষেত্রের সীমারেখা (boundary)।

4. ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f} = (x^2 + y^2)\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j}$  এবং  $x = 0, x = a, y = 0, y = b$  আয়তক্ষেত্রের জন্য স্টোকের উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

5. ভেক্টর পয়েন্ট ফাংশন  $\mathbf{f} = (x^2 + y^2)\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j}$  এবং  $x = \pm a, y = 0, y = b$  আয়তক্ষেত্রের জন্য স্টোকের উপপাদ্যের সত্যতা যাচাই করুন।

6.  $\iint_S (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} ds$ -এর মান নির্ণয় করুন যখন  $S$  তলটি  $z = 4 - (x^2 + y^2), z \geq 0$  এবং

$\mathbf{f}(x^2 - y + 4, 3xy, 2xz + z^2)$ .

7. অক্ষ তলগুলি  $2x + y + 2z = 6$  তলকে প্রথম অষ্টমাংশে যে ত্রিভুজটি ছিল করে তাকে  $S$ -এবং এই ত্রিভুজের সীমারেখাকে  $C$  ধরে  $\mathbf{f} = (x + 2y, -3z, x)$  ভেক্টর ফাংশনটির জন্য স্টোকের উপপাদ্যটি যাচাই করুন।

8. প্রমাণ করুন যে,  $\iint_S \nabla \times \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds = -\frac{a^3}{2}$

যখন  $f = (xy + z^2, yz + 1, zx + 5)$  এবং  $x = y = z = 0, x = y = z = a$  যদকের  $xy$  তলের উপরের তল  $S$ .

[ সংকেত :  $xy$  তলে  $x = 0, x = a, y = 0, y = a$  বর্গক্ষেত্রের সীমাবেষ্টিকে  $C$  ধরে স্টোকের উপপাদ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ]

9. সমতলে  $y = x, x^2 = y$  বক্রসূচির দ্বারা বক্র বক্রটিকে  $C$  এবং  $C$  দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটিকে  $S$  ধরে

$$\int_C [(3xy - x^2)dx + (2xy - y^2)dy]$$

সমাকলিতির ক্ষেত্রে গ্রীনের উপপাদ্যের সম্ভাব্য যাচাই করুন।

10. গ্রীনের উপপাদ্যের সাহায্যে  $\int_C \{(x^2 - y \cos x)dx + (y^2 + x)dy\}$  সমাকলিতির মান নির্ণয় করুন, যখন  $C$  বক্রটি  $xy$  সমতলে একটি অস্থায়ক্ষেত্র যার ক্ষেত্রিক ক্ষেত্রগুলি  $(0,0), (\pi,0), (\pi,2), (0,2)$ .

11.  $x$  অক্ষের উপরের দিকে  $x^2 + y^2 = 1$  বৃত্তের অর্ধাংশ এবং  $x$  অক্ষ দ্বারা বক্রবক্রটিকে  $C$  ধরে  $\int_C \{(2x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy\}$  এর মান নির্ণয় করুন।

$$\begin{aligned}
 & [\text{সংকেত : গ্রীনের উপপাদ্য অনুযায়ী নির্ণেয় সমাকল} = \iint_S \left[ \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) - \frac{\partial}{\partial y}(2x^2 - y^2) \right] dx dy \\
 & = \int_{x=-1}^1 \int_{y=0}^{\sqrt{1-x^2}} (2x + 2y) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \left[ xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 & = 2 \int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} dx + 2 \int_{-1}^1 \frac{(1-x^2)dx}{2} \\
 & = 0 + 2 \int_0^1 (1-x^2)dx \quad [ \because \int_{-a}^a f(x)dx = 0 \text{ যখন } f(x) \text{ অযুক্ত এবং } = 2 \int_0^1 f(x)dx \text{ যখন } f(x) \text{ যুক্ত } ] \\
 & = \frac{4}{3} ]
 \end{aligned}$$

## 9.7 উজ্জ্বলমালা

(A) 5.  $5a^3$  7.  $4\pi$  8.  $\frac{1}{2}$  10.  $\frac{4}{3}\pi a^3$  11.  $-8\pi$  12.  $\frac{1}{12}\pi$

(B) 1.  $8\pi$  2. 0 3. 2 6.  $4\pi$  10.  $2\pi$  11.  $\frac{4}{3}$ .

---

## একক 10 □ ভেক্টর ক্যালকুলাসের প্রয়োগ (Application of Vector Calculus)

---

- গঠন
- 10.1 প্রস্তাবনা
- 10.2 উদ্দেশ্য
- 10.3 বক্ররেখার জ্যামিতি
- 10.3.1 সমতলীয় বক্ররেখা
- 10.3.2 অসমতলীয় বক্ররেখার জ্যামিতি (বক্রতা ও মোচড়)
- 10.3.3 সেরে-ফ্রেনের সূত্র (Serret-Frenet formulae)
- 10.3.4 অস্কুলেটিং সমতলের সমীকরণ (Osculating plane)
- 10.4 কণার গতি (Kinematics of a particle)
- 10.4.1 সমতলে চলমান কণার মেঝে স্থানাঙ্ক গতি ও ত্বরণ
- 10.5 নিউটনীয় গতি সমীকরণ (Newtonian equations of motion)
- 10.6 কেন্দ্রীয় বলাধীন গতি (Motion under central force)
- 10.7 ভেক্টর সমাকলনের প্রয়োগ
- 10.7.1 বলকর্তৃক কৃতকার্য (Work done by a force)
- 10.7.2 অমূর্ণক ভেক্টর (Irrotational vector)
- 10.7.3 ভেক্টর অপেক্ষকের কোন তল সাপেক্ষে উৎগমন (Flux of a Vector across a surface)
- 10.7.4 সলেনয়েডীয় ভেক্টর (Solenoidal Vector)
- 10.8 সারাংশ
- 10.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
- 10.10 উত্তরমালা

---

### 10.1 প্রস্তাবনা

---

ভেক্টর ক্যালকুলাসের বিভিন্ন এককে ভেক্টরের অন্তরকলন ও সমাকল সমস্যার আলোচনা হয়েছে। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে যে কোনো বক্ররেখার প্রতিটি বিন্দুতে তার স্পর্শক ভেক্টর, অভিলম্ব ভেক্টর, বক্রতা ব্যাসার্ধ অন্তর্ভুক্তির সহজে আলোচনা করা যায়। গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে গতি, ত্বরণ, যেহেতু এগুলি ভেক্টর এবং সময়ের উপর নির্ভর করে, সেজন্ম ভেক্টর ক্যালকুলাসের প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক ও বিষয়টিকে সহজে উপস্থাপিত করা যায়। নিউটনের

গতি সমীকরণ একটি ভেস্টের সমীকরণ হওয়ায় এখানেও ভেস্টের ক্যালকুলাসের প্রয়োগ করা হয়। আবার বলবিদ্যায় একটি বল কর্তৃক কার্যের পরিমাণ একটি সমাকল হিসাবে দেখা যায়। সমাকলীয় শর্তসাপেক্ষে কোনো ভেস্টেরকে অসূর্যক (irrotational) বা সলেনয়ডীয় (solenoidal) ভেস্টের বলা যায়। এই জাতীয় কতগুলি প্রয়োগ এই এককে দেখানো হয়েছে। (এখানে ভেস্টেরগুলিকে মোটা অক্ষের অথবা ভেস্টের চিহ্ন → দিয়ে দেখান হয়েছে)

## 10.2 উদ্দেশ্য


এই এককটি পাঠ করে আপনি

- একটি বক্ররেখার স্পর্শক ভেস্টের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- একটি বক্ররেখার একটি বিন্দুতে বক্রতা ব্যাসার্ধের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন স্থানাঙ্কতে প্রকাশিত বস্তুকণার বেগ, ত্বরণ ইত্যাদির সূত্র জানবেন।
- কোনো বস্তুকণার গতিসমীকরণ দ্বারা কণার গতিপথের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- একটি বস্তুকণার উপর প্রযুক্তি বল কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন।
- অসূর্যক ও সলেনয়ডীয় ভেস্টেরের স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

## 10.3 বক্ররেখার জ্যামিতি (Geometry of curves)

কোনো বক্ররেখার একটি বিন্দুতে ঐ রেখার স্পর্শককে ভেস্টের ভাবা যায়। আবার অভিলম্ব ভেস্টের সমস্কে সূচিক ধারণা করা প্রয়োজন। এখানে 10.3.1 অনুচ্ছেদে একটি সমতলীয় বক্ররেখার আলোচনা করা হবে। 10.3.2 অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে যে কোনো বক্ররেখার সাপেক্ষে আলোচনা করা হবে। সাধারণ ক্ষেত্রে স্পর্শক, প্রধান অভিলম্ব ও ছিতীয় অভিলম্ব এই তিনটি সমস্কে বলা হবে। 10.3.3 অনুচ্ছেদে ঐ অভিলম্বসম্বয় ও স্পর্শক-এর পরিবর্তনের হার সমস্কে সেরে-ফেনের (Seret-Frenet) সূত্র আলোচনা করা হবে।

### 10.3.1 সমতলীয় বক্ররেখা : (Plane Curve) স্পর্শক ভেস্টের ও বক্রতা, বক্রতা ব্যাসার্ধ



চিত্র 10.1

একটি একতলীয় বক্ররেখার  $P$  একটি বিন্দু, যার অবস্থান ভেস্টের  $r$  (কোনো নির্দিষ্ট মূলবিন্দু  $O$  সাপেক্ষে) এবং  $Q$  বক্ররেখার অপর একটি বিন্দু যার অবস্থান ভেস্টের  $r + \Delta r$  বক্ররেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দু  $A$  থেকে রেখার দৈর্ঘ্য  $s$  মাপা হলে এবং  $AP = s$  হলে  $AQ = s + \Delta s$  ধরা যায়। তা হলে  $\vec{PQ} = \Delta r$  এবং চাপ  $PQ = \Delta s$ .

সংজ্ঞা : স্পর্শক ভেস্টের (tangent vector)

যদি  $\lim_{Q \rightarrow P} \frac{\Delta r}{\Delta s}$  এর অস্তিত্ব থাকে, তবে এই নির্মিতকে  $t$  ভেস্টের দিয়ে সূচিত করা যায় এবং একে  $P$  বিন্দুতে বক্ররেখাটির স্পর্শক

(tangent Vector) বলা হয়।  $\therefore \mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \dots (1)$  সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে  $\mathbf{t}$  একটি একক ভেক্টর (কারণ  $\frac{|\Delta \mathbf{r}|}{\Delta s} \rightarrow 1$

যখন  $\Delta s \rightarrow 0$ ) এবং যেহেতু এই ভেক্টরটি  $\frac{\vec{PQ}}{\Delta s}$  ভেক্টরের লিমিটঅফএভা P বিন্দুতে রেখাটির স্পর্শকের দিকে।

এইভাবে যোখা যায় যে বক্ররেখার প্রতিটি বিন্দুতে একটি স্পর্শক ভেক্টর আছে। অতএব স্পর্শক  $\mathbf{t}$  কেরেখাদৈর্ঘ্য s এই প্রচলের (Parameter) অপেক্ষক (ফাংশন) হিসাবে দেখা যায়।

$\mathbf{t}$  এর মান এক, কিন্তু  $\mathbf{t}$  এর দিক বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন হওয়ায়, s এর সঙ্গে  $\mathbf{t}$  এর পরিবর্তন স্পর্শক ভেক্টরের দীক্ষাবার হার বুঝায়।

$$\lim_{Q \rightarrow P} \frac{\mathbf{t}_Q - \mathbf{t}_P}{\mathbf{PQ}} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\mathbf{t}(s + \Delta s) - \mathbf{t}(s)}{\Delta s}$$

$$= \frac{d\mathbf{t}}{ds} \dots (2)$$

$$= \frac{d\mathbf{t}}{ds} \text{ ভেক্টর } \mathbf{t} \text{ ভেক্টরের উপর লম্ব।}$$

$$(\because \mathbf{t} \cdot \mathbf{t} = 1 \text{ এই সমীকরণকে } s \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরকলন করে পাওয়া যায় } \mathbf{t} \cdot \frac{d\mathbf{t}}{ds} = 0)$$

আমরা এখানে বক্ররেখাটিকে সমতলীয় নিয়েছি; অতএব  $\frac{d\mathbf{t}}{ds}$ , এই সমতলে অবস্থিত  $\mathbf{t}$  এর লম্ব অর্ধৎ P

বিন্দুতে  $\frac{d\mathbf{t}}{ds}$  একটি ভেক্টর যা এই রেখার P বিন্দুতে অভিলম্বের দিকে অবস্থিত।

$\mathbf{t}$  ভেক্টর x অক্ষের সঙ্গে  $\psi$  কোণ করলে  $\mathbf{t} = \cos \psi \mathbf{i} + \sin \psi \mathbf{j}$

$$\text{অতএব } \frac{d\mathbf{t}}{ds} = (-\sin \psi \mathbf{i} + \cos \psi \mathbf{j}) \frac{d\psi}{ds}$$

$$\text{অতএব } \left| \frac{d\mathbf{t}}{ds} \right| = \frac{d\psi}{ds}.$$

অতএব  $\frac{d\mathbf{t}}{ds}$  ভেক্টরের মান থেকে স্পর্শক ভেক্টরের x অক্ষের সাথের কোণের পরিবর্তনের হার পাওয়া যায়।

অতএব n যদি P বিন্দুতে বক্ররেখার অভিলম্ব দিকে অক্ষিত একক ভেক্টর হয়, তাহলে আমরা শিখতে পারি—

$$\frac{d\mathbf{t}}{ds} = k \mathbf{n}, \dots (3)$$

যেখানে  $k$  একটি ধনাখাক ফ্লোর এবং  $k$  বক্ররেখার  $P$  বিন্দুতে বক্রতার পরিমাপক।  $k$  কে  $P$  বিন্দুতে  
রেখাটির বক্রতা (Curvature) বলা হয়।

$\rho = \frac{1}{k}$  কে  $P$  বিন্দুতে বক্ররেখাটির বক্রতা ব্যাসার্ধ (Radius of Curvature) বলা হয়।

উদাহরণ 1 : সরলরেখার বক্রতা শূন্য।

সমাধান : সরলরেখার ক্ষেত্রে একক  $t$  ভেষ্টির ত্রুটক। করণ  $t$  দিকটিও ত্রুটক।

$$\therefore \frac{dt}{ds} = 0, k = 0$$

উদাহরণ 2 : একটি বৃত্তের যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ভেষ্টির, অভিলম্বক ভেষ্টির, বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করুন।

a ব্যাসার্ধযুক্ত কোনো বৃত্তের কেন্দ্রকে মূলবিন্দু নিয়ে  $O_x, O_y$ , অক্ষ নিয়ে বৃত্তের যে কোনো বিন্দুর  $P$  অবস্থান  
ভেষ্টির  $r = a \cos \theta i + a \sin \theta j$  যেখানে  $i, j$  x, y দিকে একক ভেষ্টির।

যেহেতু

$$\begin{aligned} ds^2 &= dr \cdot dr = (-a \sin \theta i + a \cos \theta j) d\theta \\ &\quad (-a \sin \theta i + a \cos \theta j) d\theta \\ &= a^2 d\theta^2 \end{aligned}$$

$$\therefore ds = ad\theta$$

$\therefore P$  এর স্পর্শক ভেষ্টির

$$t = \frac{dr}{ds} = -\sin \theta i + \cos \theta j$$

$$\frac{dt}{ds} = \frac{-\cos \theta i - \sin \theta j}{a}$$

$$= -\frac{1}{a} \frac{r}{a}$$

$$= kn$$

$$\text{যেখানে } k = \frac{1}{a}, n = -\frac{r}{a}$$

$$\text{বক্রতা ব্যাসার্ধ} = a$$

অতএব বৃত্তের বক্রতা ব্যাসার্ধ একটি ত্রুটক এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান।

উদাহরণ 3 : উপবৃত্তের একটি বিন্দুতে বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করুন।

উপবৃত্তের প্রচল সমীকরণ  $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$  এই কাপে নিলে, এবং কেন্দ্র  $(0,0)$  কে মূলবিন্দু নিয়ে  
অবস্থান ভেষ্টির  $r = a \cos \theta i + b \sin \theta j$ .

সমাধান : এখানে  $\mathbf{f}(x, y, z) = ax\mathbf{i} + by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}$  ধরলে

$$\operatorname{div} \mathbf{f} = \frac{\partial}{\partial x}(ax) + \frac{\partial}{\partial y}(by) + \frac{\partial}{\partial z}(cz) = a + b + c$$

$\therefore$  গাউসের উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_S (ax\mathbf{i} + by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$= \iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$= \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{f} dv \quad [v \text{ হল } S \text{ গোলক দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চল।}]$$

$$= \iiint_V (a+b+c) dv = (a+b+c) \iiint_V dv$$

$$= (a+b+c) \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot l^3 \quad [\because 1 \text{ ব্যাসাক্ষ সম্পূর্ণ গোলকের আয়তন = } \frac{4}{3}\pi \cdot l^3]$$

$$= \frac{4}{3}\pi(a+b+c)$$

6. যদি  $xy$ -তলের উপরের দিকে  $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$  শঙ্কুর বক্রতল  $S$  এবং  $\mathbf{f} = x^2z\mathbf{i} + (x^3 - y)\mathbf{j} + 2x^2y\mathbf{k}$  হয় তবে  $\iint_S (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} dS$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : প্রদত্ত শঙ্কুর সমীকরণে  $z = 0$  বসিয়ে পাই,

$$0 = 2 - \sqrt{x^2 + y^2} \text{ বা, } x^2 + y^2 = 4$$

অতএব প্রদত্ত শঙ্কুটি  $xy$ -তলকে  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 0$  বৃত্তে হৈস করেছে। যদি ঐ বৃত্তের তলকে  $R$  বলা হয় তবে ধরা যাক  $S$  এবং  $R$  দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের আয়তন  $V$

অতএব গাউসের ডাইভারেজেন্স উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\iint_{S+R} (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \operatorname{div}(\nabla \times \mathbf{f}) dv \quad [\nabla \times \mathbf{f} = \operatorname{curl} \mathbf{f}]$$

$$= 0$$

$$[\because \operatorname{div}(\operatorname{curl} \mathbf{f}) = 0]$$

অতএব,

$$kn = \frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{2a\sqrt{t^2 + 1}} \frac{d}{dt} \left( \frac{ti + j}{\sqrt{t^2 + 1}} \right)$$

$$= \frac{1}{2a\sqrt{t^2 + 1}} \frac{\sqrt{t^2 + 1} i + \frac{t(ti + j)}{\sqrt{t^2 + 1}}}{t^2 + 1}$$

$$= \frac{(t^2 + 1)i + t^2 i + tj}{2a(t^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{(2t^2 + 1)i + tj}{2a(t^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{(2t^2 + 1)i + tj}{\sqrt{(2t^2 + 1)^2 + t^2}} \cdot \frac{\sqrt{(2t^2 + 1)^2 + t^2}}{2a(t^2 + 1)^2}$$

অতএব,  $k = \frac{\sqrt{(2t^2 + 1)^2 + t^2}}{2a(t^2 + 1)^2}$

উদাহরণ 5 :  $y = c \cosh \frac{x}{c}$  এই বক্ররেখার কোনো একটি বিন্দুতে স্পর্শক ভেস্টের ও অভিলম্ব ভেস্টের নির্ণয় করুন।

সংকেত :  $(0,0)$  থেকে অবস্থান ভেস্টের  $r = xi + yj$  নিয়ে

$$ds^2 = dr \cdot dr = dx^2 + dy^2 = dx^2 + \sinh^2 \frac{x}{c} dx^2 = \cosh^2 \frac{x}{c} dx^2$$

অতএব,  $t = \frac{dr}{ds} = \frac{dx i + j dy}{ds} = \operatorname{sech} \frac{x}{c} i + j \operatorname{tanh} \frac{x}{c}$

$$kn = \frac{dt}{ds} = \frac{dt}{dx} \frac{dx}{ds} = \operatorname{sech} \frac{x}{c} \left( -\operatorname{sech} \frac{x}{c} \operatorname{tanh} \frac{x}{c} \frac{1}{c} i + j \operatorname{sech}^2 \frac{x}{c} \right)$$

$$= \frac{1}{c} \operatorname{sech}^2 \frac{x}{c} \left( -\operatorname{tanh} \frac{x}{c} i + \operatorname{sech} \frac{x}{c} j \right)$$

$$\therefore k = \frac{1}{c} \operatorname{sech}^2 \frac{x}{c}$$

উদাহরণ 6 : ডেক্টোর পদ্ধতিতে বক্রতা নির্ণয় করুন যেখানে মেরু দ্বানাক্ষে বক্ররেখার সমীকরণ হল

$$r = \frac{t}{1 + e \cos \theta}, \quad e, \theta \text{ ত্রিভবক।}$$

সংকেত : ডেক্টোর সমীকরণ হল


$$\vec{r} = r \cos \theta \hat{i} + r \sin \theta \hat{j}$$

### 10.3.2 অসমতলীয় বক্ররেখার জ্যামিতি (Curves in three dimensions)

10.3.1 অনুচ্ছেদে সমতলীয় রেখার স্পর্শক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সাধারণভাবে যে কোনো বক্ররেখার স্পর্শক ও অভিসম্মত ইত্যাদি আলোচনা করা হবে। ধরা যাক  $O$  একটি নির্দিষ্ট বিন্দু সাপেক্ষে বক্ররেখার ডেক্টোর সমীকরণ

$$\vec{r} = f(s)$$

যেখানে  $s$  হল বক্ররেখার কোনো বিন্দু  $A$  থেকে  $P$  অবধি রেখা বরাবর দৈর্ঘ্য।  $Q$  বিন্দুতে দৈর্ঘ্য  $s + \Delta s$  হলে,  $P$  বিন্দুতে স্পর্শক ডেক্টোর হল,



$$t = \lim_{Q \rightarrow P} \frac{\Delta r}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta s} = \frac{dr}{ds} \quad \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন যেহেতু } \lim_{Q \rightarrow P} \frac{\text{জ্যা } PQ}{\text{চাপ } PQ} = 1$$

চিত্র 10.2

একটি একক ডেক্টোর কিন্তু ফ্রিক ডেক্টোর নয়, আবার যেহেতু  $t \cdot t = 1$ .

$$\text{তাহু এব, } t \cdot \frac{dt}{ds} = 0$$

অতএব,  $\frac{dt}{ds}$  ডেক্টোর  $t$  ডেক্টোরের উপর লম্ব। আবার  $\frac{dt}{ds}$  ডেক্টোরটি এমন একটি সমতলে আছে যা  $P$  এর পুরু

সমিহিত বিন্দু  $Q$  ও  $R$  হলে  $QPR$  এই সমতলের সীমান্ত অবস্থান তল, যখন  $Q \rightarrow P, R \rightarrow P$ .

$QPR$  সমতলের সীমান্ত অবস্থান যখন  $Q \rightarrow P, R \rightarrow P$  এই সমতলকে অস্কুলেটিং সমতল বলা হয়। অর্থাৎ  $P$  বিন্দুর স্পর্শক  $t_p$ ,  $Q$  বিন্দুর স্পর্শক  $t_Q$  ও  $R$  বিন্দুর স্পর্শক  $t_R$  হলে এবং  $Q \rightarrow P, R \rightarrow P$  হলে,  $(t_p, t_Q, t_R)$  দ্বারা যে সীমাসমতল হয়, তাই অস্কুলেটিং সমতল। (Osculating Plane)

$\frac{dt}{ds}$  এর সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে যে  $\frac{dt}{ds}$ , P বিন্দুতে অসকুলেটিং সমতলের

উপর P বিন্দুতে t, এর লম্বকে আমরা প্রধান বা মুখ্য অভিলম্ব (Principal normal) বলব। অতএব প্রধান অভিলম্ব দিকে একক ভেষ্টর n নেওয়া হলে, আমরা পাই,

$$\frac{dt}{ds} = kn \quad \dots (2)$$

যেখানে k হলি  $\left| \frac{dt}{ds} \right|$  এর পরিমাপ (magnitude) এবং k কে বক্ররেখার P বিন্দুতে বক্রতা (curvature),

বলা হয়।  $\frac{1}{k}$  কে P বিন্দুতে বক্রতা ব্যাসার্ধ p বলা যায়।

$$p = \frac{1}{k} \quad \dots (3)$$

P বিন্দুতে যদি t, n, এবং আর একটি একক ভেষ্টর b এমনভাবে নেওয়া হয় যে t, n, b একটি দক্ষিণহাতীয় তত্ত্ব (right handed system). তৈরি করে, তাহলে

$$b = t \times n, \quad n \times b = t, \quad b \times t = n \quad \dots (4)$$

অতএব b এর দিক t এর লম্ব। এজন আমরা b ভেষ্টরকে দ্বিতীয় অভিলম্ব ভেষ্টর (binormal vector) বলব। এখন

$$\begin{aligned} \frac{db}{ds} &= \frac{dt}{ds} \times n + t \times \frac{dn}{ds} \\ &= kn \times n + t \times \frac{dn}{ds} \\ &= t \times \frac{dn}{ds}, \text{ সূতরাং } \frac{db}{ds} \text{ ভেষ্টর, } t \text{ এর সাথে লম্ব। আবার } b \text{ একক ভেষ্টর বলে, } \frac{db}{ds} \text{ হল } b \text{ এর উপর } \\ &\text{লম্ব।} \end{aligned}$$

অতএব  $\frac{db}{ds}$  ভেষ্টর n এর সমান্তরাল।

$$\text{আমরা } \frac{db}{ds} = -\tau n \quad \dots (5)$$

সিধি। (এখানে  $\tau$  একটি ক্ষারণ। ক্ষণাত্মক চিহ্ন নেওয়ার কারণ তাহলে হেসিজ্জ ইত্যাদি বক্ররেখার জন্য  $\tau$  ধনাত্মক হবে)।  $\tau$  কে আবার মোচড় বা torsion বলা হয়।

$$\begin{aligned} \frac{dn}{ds} &= \frac{d}{ds}(b \times t) = \frac{db}{ds} \times t + b \times \frac{dt}{ds} \\ &= -\tau n \times t + b \times kn \end{aligned}$$

$$\text{অতএব } \frac{da}{ds} = tb - kt \quad \dots (6)$$

উদাহরণ 1.  $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, z = c\theta$  এই বক্ররেখার একটি বিন্দু  $\theta$  তে বক্রতা নির্ণয় করুন।  
 $\vec{r} = a \cos \theta \vec{i} + b \sin \theta \vec{j} + c\theta \vec{k}$

$$\text{সরকেত : এখানে } ds^2 = (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta + c^2) d\theta^2$$

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{d\theta} / \frac{ds}{d\theta}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta + c^2}} (-a \sin \theta \vec{i} + b \cos \theta \vec{j} + c \vec{k})$$

$$\therefore \vec{k} \vec{n} = \frac{d\vec{t}}{ds} = \frac{d\vec{t}}{d\theta} / \frac{ds}{d\theta}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta + c^2}} \frac{d\vec{t}}{d\theta}$$

$$= - \frac{ia(b^2 + c^2) \cos \theta + jb(a^2 + c^2) \sin \theta + kc(a^2 - b^2) \sin \theta \cos \theta}{(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta + c^2)^2}$$

$$-\vec{t} \vec{n} = \frac{d\vec{b}}{ds} = \frac{d}{ds} (\vec{t} \times \vec{n}) = \frac{d\vec{t}}{ds} \times \vec{n} + \vec{t} \times \frac{d\vec{n}}{ds}$$

$$= \vec{t} \times \frac{d\vec{n}}{ds}, \text{ এর থেকে যোচড় } t \text{ নির্ণয় করা যায়।$$

অতএব বক্রতা

$$k = \left| \frac{d\vec{t}}{ds} \right| = \frac{\sqrt{a^2(b^2 + c^2)^2 \cos^2 \theta + b^2(a^2 + c^2)^2 \sin^2 \theta + c^2(a^2 - b^2)^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}}{(a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta + c^2)^2}$$

উদাহরণ 2 : সমতলীয় বক্ররেখার যোচড় শূন্য

কারণ সমতলীয় বক্ররেখার  $t$  ও  $n$  এ তলৈই অবস্থিত। তাই  $t \times n$  প্রবক্তৃ সূতরাং,  $b$  প্রবক্তৃ ভেষ্টে।

$$\therefore \frac{db}{ds} = 0 = -tn, \Rightarrow t = 0$$

### 10.3.3 সেরে-ফ্রেনের সূত্র (Serret-Frenet formulae)

আমরা বক্ররেখার প্রতিবিন্দুতে তিনটি একক ভেস্টর  $t, n, b$  সমবেক্ষে পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা তাদের পরিবর্তনের হার কিমাপ হয়, তাও দেখেছি।

10.3.2 তে (2), (5), (6) এই তিনটি সূত্রকে একত্রে সেরে-ফ্রেনের সূত্র (Serret-Frenet formulae) বলা হয়। সেগুলি হল

$$\frac{dt}{ds} = kn \quad \dots (1.1)$$

$$\frac{dn}{ds} = tb - kt \quad \dots (1.2)$$

$$\frac{db}{ds} = -tn \quad \dots (1.3)$$

কোনো বক্ররেখার সমীকরণ জানা থাকলে এই তিনটি সূত্র থেকে তার বক্রতা ও মোচড় নির্ণয় করা যায়।

**উদাহরণ 1:** একটি বৃত্তীয় হেলিক্সের যে কোনো বিন্দুর বৃত্তীয় বেলনাকার স্থানাঙ্ক  $r, \theta, z$  গুলি যদি এমন হয় যে  $r = a, z = c\theta$  তা হলে যে কোনো বিন্দু  $\theta$  তে বক্রটির বক্রতা ও মোচড় নির্ণয় করুন।

আয়তক্ষেত্রাকার কার্তিয় অক্ষ  $x, y, z$  হলে এবং  $O$  বিন্দু  $z$  অক্ষের উপর একটি বিন্দু হলে হেলিক্স বক্ররেখার যে কোনো বিন্দু  $P$  এর অবস্থান ভেস্টর

$$\vec{r} = \vec{OP} = \vec{i}a \cos \theta + \vec{j}a \sin \theta + c\theta \vec{k}. \quad (x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = c\theta)$$

$$\begin{aligned} \therefore ds^2 &= d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (-a \sin \theta d\theta \vec{i} + a \cos \theta d\theta \vec{j} + ck d\theta \vec{k}) \cdot (-a \sin \theta d\theta \vec{i} + a \cos \theta d\theta \vec{j} + ck d\theta \vec{k}) \\ &= a^2 \sin^2 \theta d\theta^2 + a^2 \cos^2 \theta d\theta^2 + c^2 d\theta^2 \\ &= (a^2 + c^2) d\theta^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{অতএব } \vec{t} &= \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{d\theta} \Big/ \frac{ds}{d\theta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + c^2}} \cdot (-\vec{i}a \sin \theta + \vec{j}a \cos \theta + \vec{ck}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d\vec{t}}{ds} &= \frac{d\vec{t}}{d\theta} \Big/ \frac{ds}{d\theta} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + c^2}} \cdot \frac{(-\vec{i}a \cos \theta - \vec{j}a \sin \theta)}{\sqrt{a^2 + c^2}} \\ &= \frac{a}{a^2 + c^2} (-\vec{i} \cos \theta - \vec{j} \sin \theta) \\ &= k\vec{n} \end{aligned}$$

$$\text{অতএব বক্রতা } k = \frac{a}{a^2 + c^2}$$

$$\text{এখন } \vec{t} = -\frac{a \sin \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} \vec{i} + \frac{a \cos \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} \vec{j} + \frac{c}{\sqrt{a^2 + c^2}} \vec{k}$$

$$\vec{n} = -\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j}$$

$$\text{অতএব, } \vec{b} = \vec{t} \times \vec{n} = \vec{i} \frac{c \sin \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} - \vec{j} \frac{c \cos \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} + \vec{k} \frac{a}{\sqrt{a^2 + c^2}}$$

$$\text{আবরণ জানি, } -\tau \vec{n} = \frac{d\vec{b}}{ds}$$

$$\therefore \tau = -\frac{d\vec{b}}{ds} \cdot \vec{n}$$

$$= + \left( \vec{i} \frac{c \cos \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} + \vec{j} \frac{c \sin \theta}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right) \left( \frac{\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right)$$

$$= \frac{c \cos^2 \theta + c \sin^2 \theta}{a^2 + c^2} = \frac{c}{a^2 + c^2}$$

**উদাহরণ 2 :** অমাপ করুন :

একটি বক্ররেখা  $\vec{r} = \vec{r}(s)$  এর বক্রতা ও মোচড়

$$k = \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right|, \tau = -\frac{1}{k^2} \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right) \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}$$

$$\text{অমাপ : যেহেতু } \frac{d\vec{t}}{ds} = k\vec{n}, \vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

$$\text{আবার, } \vec{t} \times \frac{d\vec{t}}{ds} = \vec{t} \times k\vec{n} = k\vec{b}$$

$$\text{অতএব, } \left| \vec{t} \times \frac{d\vec{t}}{ds} \right| = k \text{। এখন } \frac{d\vec{t}}{ds} = \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}$$

$$\text{অতএব } k = \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right|$$

$$\frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \vec{t} \times \frac{d\vec{t}}{ds} = \vec{t} \times k\vec{n} = k\vec{b}$$

$$\therefore \frac{d}{ds} \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right) = \frac{dk}{ds} \vec{b} + k \frac{d\vec{b}}{ds} = \frac{dk}{ds} \vec{b} - k\tau \vec{n}$$

অথবা,  $\frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} = -k\tau \vec{n} + \frac{dk}{ds} \vec{b}$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} &= (-k\tau \vec{n}) \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} + \frac{dk}{ds} \vec{b} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \\ &= -k^2 \tau \vec{n} \cdot \vec{n} + \frac{dk}{ds} \vec{b} \cdot k \vec{n}. \quad (\because \vec{b} \cdot \vec{n} = 0)\end{aligned}$$

$$\therefore \tau = -\frac{1}{k^2} \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^3\vec{r}}{ds^3} \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right).$$

**উদাহরণ 3 :** একটি বক্ররেখার ভেস্টের সমীকরণ  $\vec{r} = \vec{r}(t)$ , হলে যেখানে  $t$  একটি প্রচল. দেখান যে,

$$k = \left( \frac{\ddot{\vec{r}} \dot{s} - \dot{\vec{r}} \ddot{\dot{s}}}{\dot{s}^3} \right),$$

$$\begin{aligned}\text{উদাহরণ : } k\vec{n} &= \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d}{ds} \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \right) = \frac{d}{ds} \left( \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left( \frac{\dot{\vec{r}}}{\dot{s}} \right) \frac{dt}{ds}; \quad \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \dot{s} = \frac{ds}{dt} \\ &= \frac{\ddot{\vec{r}} \dot{s} - \dot{\vec{r}} \ddot{\dot{s}}}{\dot{s}^3}\end{aligned}$$

$$\text{অতএব } k = \left| \frac{\ddot{\vec{r}} \dot{s} - \dot{\vec{r}} \ddot{\dot{s}}}{\dot{s}^3} \right|$$

#### 10.3.4 অসকুলেটিং সমতলের সমীকরণ :

মনে করি,  $\vec{r} = \vec{r}(s)$  একটি বক্ররেখার সমীকরণ  $P(\vec{r})$  বিশুভে অসকুলেটিং সমতলের যে কোনো বিন্দুর অবস্থান যদি  $\vec{R}$  হয়, তবে  $P(\vec{r})$  বিশুভে এই অসকুলেটিং সমতলের সমীকরণ হবে

$$(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \vec{b} = 0 \quad (\text{কারণ ঐ তলের উপর } \vec{b} \text{ লম্ব})$$

$$\text{অর্থাৎ, } (\vec{R} - \vec{r}) \cdot (\vec{t} \times \vec{n}) = 0$$

$$\text{অর্থাৎ, } (\vec{R} - \vec{r}) \cdot \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right) = 0.$$

### 10.3.5

P বিন্দুতে  $\vec{t}$  ও  $\vec{n}$  দ্বারা গঠিত তলকে অভিলম্ব তল (Normal plane) বলে। অভিলম্ব তলের সমীকরণ

$$(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} = 0$$

P বিন্দুতে,  $\vec{t}$  ও  $\vec{n}$  দ্বারা গঠিত তলকে রেক্টিফাইন তল (Rectifying plane) বলে। এই তলের সমীকরণ :

$$(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = 0$$

উদাহরণ 1. বক্সেরখার সমীকরণ  $x = t$ ,  $y = t^2$ ,  $z = \frac{2}{3}t^3$  হলে  $t = 1$  এ অস্কুলেটিং তল, অভিলম্ব তল এবং রেক্টিফাইন তলের সমীকরণ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

$$\text{এখানে } \vec{r} = t\vec{i} + t^2\vec{j} + \frac{2}{3}t^3\vec{k}$$

$$\therefore \dot{\vec{r}} = \vec{i} + 2t\vec{j} + 2t^2\vec{k}$$

$$\ddot{\vec{r}} = 2\vec{j} + 4t\vec{k}$$

$$\therefore t = 1\text{-তে, } \vec{r} = \vec{i} + \vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$$

$$\dot{\vec{r}} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\ddot{\vec{r}} = 2\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\therefore \dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$(\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}) \times \dot{\vec{r}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 6\vec{j} + 12\vec{k}$$

অস্কুলেটিং তলের সমীকরণ  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}} = 0$

$$\text{বা } \left\{ \left( x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \right) - \left( \vec{i} + \vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k} \right) \right\} \cdot \left( 4\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k} \right) = 0$$

$$\text{বা } 4(x-1) - 4(y-1) + 2\left(z - \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$\text{বা } 2x - 2y + z - \frac{2}{3} = 0$$

অভিস্থ তলের সমীকরণ  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \vec{r} = 0$

$$\text{বা } \left\{ (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) - \left( \vec{i} + \vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k} \right) \right\} \cdot \left( \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \right) = 0$$

$$\text{বা } (x - 1) + 2(y - 1) + 2\left(z - \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$\text{বা } x + 2y + 2z - \frac{13}{3} = 0$$

রেষ্টিফাই তলের সমীকরণ  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot (\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}) \times \dot{\vec{r}} = 0$

$$\text{বা } \left\{ (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) - \left( \vec{i} + \vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k} \right) \right\} \cdot (-12\vec{i} - 6\vec{j} + 12\vec{k}) = 0$$

$$\text{বা } -12(x - 1) - 6(y - 1) + 12\left(z - \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$\text{বা } 6x + 3y - 6z - 5 = 0$$

**উদাহরণ 2.** যদি  $\vec{r} = a \cos \theta \vec{i} + a \sin \theta \vec{j} + c \theta \vec{k}$  হয়, তবে  $\theta$  বিন্দুতে অস্কুলেটিং তলের ভেষ্টির সমীকরণ নির্ণয় করন :—

$$\text{সমীকরণ হল, } (\vec{R} - \vec{r}) \cdot \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \times \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right) = 0$$

$$\text{অথবা, } (\vec{R} - \vec{r}) \cdot \left( \frac{d\vec{r}}{d\theta} \times \frac{d}{ds} \left( \frac{d\vec{r}}{d\theta}, \frac{d\theta}{ds} \right) \right) = 0$$

$$\text{অথবা, } (\vec{R} - \vec{r}) \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta} \times \left( \frac{\vec{r}_\theta - \vec{r}_s}{s^3} \right) = 0$$

$$\left[ \because \frac{d}{ds} \left( \frac{d\vec{r}}{d\theta}, \frac{d\theta}{ds} \right) = \frac{d}{d\theta} \left( \frac{d\vec{r}}{d\theta} / \frac{d\theta}{ds} \right) \frac{d\theta}{ds} \right]$$

$$= \left( \frac{\frac{d^2\vec{r}}{d\theta^2}}{\frac{ds}{d\theta}} - \frac{\frac{d\vec{r}}{d\theta}}{\left( \frac{ds}{d\theta} \right)^2}, \frac{d^2s}{d\theta^2} \right) \cdot \frac{d\theta}{ds}$$

$$= \frac{\frac{d^2\vec{r}}{d\theta^2} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta} - \frac{d\vec{r}}{d\theta} \cdot \frac{d^2\vec{s}}{d\theta^2}}{\left(\frac{ds}{d\theta}\right)^3} = \frac{1}{\left(\frac{ds}{d\theta}\right)^3} \left( \vec{r} \cdot \frac{d^2\vec{s}}{d\theta^2} - \frac{d\vec{r}}{d\theta} \cdot \vec{s} \right)$$

অথবা,  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot (\vec{r} \times (\vec{r} \cdot \vec{s} - \vec{r} \cdot \vec{s})) = 0$

অথবা,  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \vec{r} \times \vec{r} = 0$

অথবা,  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot (-a \sin \theta \vec{i} + a \cos \theta \vec{j} + c \vec{k}) \times (-a \cos \theta \vec{i} - a \sin \theta \vec{j}) = 0$

$(\vec{R} - \vec{r}) \cdot \{a c \sin \theta \vec{i} + \vec{j}(-c a \cos \theta) + \vec{k}(+a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta)\} = 0$

বা,  $(\vec{R} - \vec{r}) \cdot (c \sin \theta \vec{i} - c \cos \theta \vec{j} + a \vec{k}) = 0$

বা,  $\vec{R} \cdot (c \sin \theta \vec{i} - c \cos \theta \vec{j} + a \vec{k}) - (a \cos \theta \vec{i} + a \sin \theta \vec{j} + c \theta \vec{k}) \cdot (c \sin \theta \vec{i} - c \cos \theta \vec{j} + a \vec{k}) = 0$

বা,  $\vec{R} \cdot (c \sin \theta \vec{i} - c \cos \theta \vec{j} + a \vec{k}) - a c \sin \theta \cos \theta + a c \sin \theta \cos \theta - a c \theta = 0$

বা,  $\vec{R} \cdot (c \sin \theta \vec{i} - c \cos \theta \vec{j} + a \vec{k}) = a c \theta$

উদাহরণ 3. অসকুলেটিং সমতল, বক্রতা ও টোপসন নির্ণয় করতে হবে যেখানে বক্ররেখাটির সমীকরণ হল  
 $x = a \cos 2t, y = a \sin 2t, z = 2a \sin t.$

সংকেত :

এখানে মূলবিন্দু হতে অক্ষিত P (t) এর অবস্থান ভেক্টর

$$\vec{r} = (a \cos 2t, a \sin 2t, 2a \sin t)$$

অতএব,  $d\vec{r} = (-2a \sin 2t dt, 2a \cos 2t dt, 2a \cos t dt)$

$\therefore ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (4a^2 + 4a^2 \cos^2 t)dt^2$

$$= 4a^2 (1 + \cos^2 t)dt^2$$

$\therefore ds = 2a \sqrt{1 + \cos^2 t} dt$

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \left( \frac{-2a \sin 2t}{2a \sqrt{1 + \cos^2 t}}, \frac{2a \cos 2t}{2a \sqrt{1 + \cos^2 t}}, \frac{2a \cos t}{2a \sqrt{1 + \cos^2 t}} \right)$$

$$= \left( -\frac{\sin 2t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}, \frac{\cos 2t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}}, \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \cos^2 t}} \right)$$

$$k = \left| \frac{d\vec{t}}{ds} \right| = \left| \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right| = \left| \frac{d\vec{t}}{dt} \right| \left| \frac{dt}{ds} \right|, \text{ এরপর নিজে করুন।}$$

**উদাহরণ 4.** একটি বক্ররেখার প্রতিটি বিন্দুতে স্পর্শক একটি নির্দিষ্ট দিকের সাথে সর্বদা একটি ধৰক কোণ  $\alpha$  কোণে মাত্র ধৰকসে, দেখাতে হবে যে,

$$\frac{1}{\tau} = \pm \frac{1}{k} \tan \alpha$$

নির্দিষ্ট দিকটিকে  $z$  অক্ষ ধরে পাই যে, স্পর্শক ভেট্টার

$$\vec{t} = (\sin \alpha \cos \theta, \sin \alpha \sin \theta, \cos \alpha) = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

(যেখানে একক স্পর্শকের  $x-y$  তলে লম্ব অভিক্ষেপ  $x$ -অক্ষের সাথে  $\theta$  কোণ করেছে)

$$\text{অতএব, } \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d}{d\theta} \left( \frac{d\vec{r}}{ds} \right) \frac{d\theta}{ds}$$

$$= (-\sin \alpha \sin \theta, \sin \alpha \cos \theta, 0) \frac{d\theta}{ds} = k \vec{n}$$

$$\left| \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right| = |k \vec{n}| = k$$

$$\therefore \sin^2 \alpha \left( \frac{d\theta}{ds} \right)^2 = k^2$$

$$\text{অথবা, } \left( \frac{d\theta}{ds} \right)^2 = k^2 \cosec^2 \alpha.$$

$$\text{or, } \frac{ds}{d\theta} = \pm \frac{\sin \alpha}{k}$$

$$\vec{b} = \vec{t} \times \vec{n}$$

$$= (\sin \alpha \cos \theta, \sin \alpha \sin \theta, \cos \alpha) \times \frac{1}{k} (-\sin \alpha \sin \theta, \sin \alpha \cos \theta, 0) \frac{d\theta}{ds}$$

$$= \pm (\sin \alpha \cos \theta, \sin \alpha \sin \theta, \cos \alpha) \times (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$$

$$= \pm [-\cos \alpha \cos \theta, -\cos \alpha \sin \theta, \sin \alpha \cos^2 \theta + \sin \alpha \sin^2 \theta]$$

$$= \pm [-\cos \alpha \cos \theta, -\cos \alpha \sin \theta, \sin \alpha]$$


$$\therefore \tau \vec{n} = -\frac{d\vec{b}}{ds} = -\frac{d\vec{b}}{d\theta} \frac{d\theta}{ds} = \pm [+\cos \alpha \sin \theta, -\cos \alpha \cos \theta, 0] \frac{d\theta}{ds}$$

$$\therefore \tau^2 = \left( \frac{d\theta}{ds} \right)^2 \cdot \cos^2 \alpha = k^2 \cot^2 \alpha$$

$$\therefore \frac{1}{\tau} = \pm \frac{1}{k} \tan \alpha$$

## 10.4 কণার গতি (Kinematics of a particle)

একটি কণার অবস্থান যে কোনো সময়  $t$  তে আমরা একটি নির্দিষ্ট হিল বিন্দু  $O$ -এর সাপেক্ষে স্থান ভেট্টের  $r$  দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। সময়ের সঙ্গে  $r$ -এর অপেক্ষকতা (অধীনতা) বুঝাতে  $\dot{r} = \ddot{r}(t)$  লিখি। অতএব  $r$  ভেট্টের একটি ক্লোর  $t$  এর অপেক্ষক। এখন  $t + \Delta t$  সময়ে কণাটির অবস্থান ভেট্টের  $r + \Delta r$  দ্বারা চিহ্নিত করলে,  $\Delta t$  সময়ে ক্ষাতির সরণ  $= \Delta r$ । অতএব  $P$  বিন্দুতে কণার



$$\text{গতিবেগ (velocity)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt}$$

বাভাবিকভাবে কণার গতিপথের  $P$  বিন্দুতে স্পর্শক দিকে গতিবেগ

$$\text{ভেট্টের } v \text{ এবং } v = \frac{dr}{dt} \dots \text{ (i)}$$

$P$  বিন্দুতে কণার ত্বরণ (acceleration)

$v$  ভেট্টেরের সময়ের সাথে পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ  $f$  যদি ত্বরণ ভেট্টের হয় তবে,

চিত্র 10.3.

$$f = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{v + \Delta v - v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad \text{(ii)}$$

$s$  যদি কণার গতিপথের দৈর্ঘ্য ( $t$  সময় পর্যন্ত অতিক্রান্ত) হয়, তবে যেহেতু  $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta s} = \frac{dr}{ds}$  = একক স্পর্শক ভেট্টের,

$\therefore$  (i) থেকে,  $P$  বিন্দুতে স্পর্শক ভেট্টের  $e$  লিখলে

$$v = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = e \frac{ds}{dt} = ev \dots \text{(iii)} \quad (\text{যেখানে } v \text{ হল } |v| = \frac{ds}{dt})$$

$$\therefore f = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds} \dots \text{(iv)}$$

$P$  বিন্দুতে প্রধান অভিন্ন দিকে একক ভেট্টের  $n$  হলে  $kn = \frac{de}{ds}$ , যেখানে  $k$  বক্রতা, (সেরে-ফ্রেনের সূত্র থেকে)

$$\text{এখন } f = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (ev)$$

$$= e \frac{dv}{dt} + v \frac{de}{dt}$$

$$= e \frac{dv}{dt} + v \frac{de}{ds} \frac{ds}{dt}$$


$$= e \frac{dv}{dt} + v^2 k n \quad \dots \text{(v)}$$

অতএব ত্বরণ ভেট্টারের একটি অংশ স্পৰ্শক দিকে  $\frac{dv}{dt}$  এবং অপরটি প্রধান অভিলম্ব দিকে  $v^2 k$  বা  $\frac{v^2}{\rho}$  যেখানে  $\rho =$  বক্রতা ব্যাসার্ক।

### 10.4.1 সমতলে চলমান কণার মেরুস্থানাঙ্ক $(r, \theta)$ -র মাধ্যমে গতিবেগ ও ত্বরণ ভেট্টার।

চিত্র অনুসারে  $e_1, e_2$  দুটি একক ভেট্টার যথাক্রমে  $r$  এর বৃদ্ধি দিকে ও  $\theta$  এর বৃদ্ধি দিকে।

কণার স্থান ভেট্টার  $= r = re_1$



চিত্র 10.4

$x$  ও  $y$  দিকে বিশ্লেষিতাংশ নিয়ে পাই

$$e_1 = i \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e_2 = -i \sin \theta + j \cos \theta \quad \dots \text{(i)}$$

এখানে  $r$  ও  $\theta$ , সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে  $\frac{dr}{dt} (= \dot{r})$  এ

$\frac{d\theta}{dt} (= \dot{\theta})$  তাদের সময় ডেরিভেটিভ। (i) থেকে  $t$  এর সাপেক্ষে

অবকল নিয়ে পাই ( $i$  ও  $j$  নির্দিষ্ট দিকে একক ভেট্টার হওয়ায়  $\frac{di}{dt} = \frac{dj}{dt} = 0$ )

$$\frac{de_1}{dt} = -i \sin \theta \dot{\theta} + j \cos \theta \dot{\theta}$$

$$\begin{aligned} &= e_2 \dot{\theta} \\ \frac{de_2}{dt} &= -i \cos \theta \dot{\theta} - j \sin \theta \dot{\theta} \\ &= -e_1 \dot{\theta} \end{aligned} \quad \dots \text{(ii)}$$

আমরা জানি গতিবেগ  $v$ ,

$$v = \frac{dr}{dt}$$

$$= \frac{d}{dt} (re_1)$$

$$= \frac{dr}{dt} e_1 + r \frac{de_1}{dt}$$

$$= \frac{dr}{dt} e_1 + r \dot{\theta} e_2 \quad \text{(ii) থেকে ... (iii)}$$

আবার দুরণ f,

$$\begin{aligned}
 f &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(r\mathbf{e}_1 + r\dot{\theta}\mathbf{e}_2) \\
 &= \ddot{r}\mathbf{e}_1 + \dot{r}\frac{de_1}{dt} + \frac{d}{dt}(r\dot{\theta})\mathbf{e}_2 + r\ddot{\theta}\frac{de_2}{dt} \quad \dots \text{(ii) বসিয়ে} \\
 &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_1 + \left(\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}) + \dot{r}\dot{\theta}\right)\mathbf{e}_2 \quad \dots \text{(iii)} \\
 &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_1 + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\theta}{dt}\right)\mathbf{e}_2 \quad \dots \text{(iv)}
 \end{aligned}$$

অতএব (iii) ও (iv) থেকে দেখা যাচ্ছে যে গতিবেগ ভেট্টের  $v$  এর ব্যাসার্কের দিকে অর্থাৎ  $r$  এর দিকে বিশ্লেষিতাংশ  $\frac{dr}{dt}$  এবং প্রতিব্যাসার্কের দিকে (অর্থাৎ  $\theta$ -এর বৃদ্ধির দিকে) বিশ্লেষিতাংশ  $r\frac{d\theta}{dt}$ । দুরণ ভেট্টেরের ব্যাসার্ক ও প্রতি ব্যাসার্কের দিকে বিশ্লেষিতাংশ  $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$  ও  $\frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\theta}{dt}\right)$

## 10.5 নিউটনের গতি সমীকরণ

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে একটি বস্তুর উপর ক্রিয়াকারী বল এর বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সাথে সমানুপাত্তি। অতএব বস্তুকণার উপর ক্রিয়ারত বল ভেট্টের ও ভরবেগের পরিবর্তনের হার একই দিকে থাকবে। বলের একক এমনভাবে নেওয়া হয় যে বল ও ভরবেগের পরিবর্তনের হার সমান। এইভাবে  $v$  গতিবেগ ভেট্টের,  $F$  বল ভেট্টের হলে এবং  $m$  বস্তুটির ভর হলে, আমরা পাই,

$$F = \frac{d}{dt}(mv) \quad \dots \text{(i)}$$

যেখানে  $mv$  হল কণাটির ভরবেগ ভেট্টের। যদি ভর অপরিবর্তিত থাকে তবে (i) থেকে

$$F = m\frac{dv}{dt} = mf \quad \dots \text{(ii)}$$

$$\text{যেখানে } f = \text{দুরণ} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

(ii) হল নিউটনের গতিসূত্রানুযায়ী, বস্তুকণার গতি সমীকরণ, (ii) এর সমাধান দ্বারা বস্তুকণাটির গতি ও অবস্থান যে কোনো সময়ে পাওয়া যায়। এর জন্য প্রাথমিক অবস্থান ও গতি জানা প্রয়োজন।

(ii) থেকে  $v = \frac{dr}{dt}$  লিখিলে, আমরা পাই,

$$F = m\frac{d^2r}{dt^2} \quad \dots \text{(iii)}$$

একটি বস্তুকণা  $F$  বলাধীন একটি সমতলে চললে মেরুদ্ধানাক  $r$ ,  $\theta$  ব্যবহার করে নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী

$$m\left[(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_1 + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\mathbf{e}_2\right]$$


$$= F = F_1\mathbf{e}_1 + F_2\mathbf{e}_2$$

যেখানে  $F_1$ ,  $F_2$  হল  $F$  বলের ব্যাসার্ধ ও প্রতি ব্যাসার্ধ দিকে বিশ্লেষিতাংশ। কালার সমীকরণ দুটি হল

$$m(r - r\dot{\theta}^2) = F_1$$

$$m \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) = F_2,$$

**উদাহরণ:** একটি বস্তুক্ষার ভর  $m$  এবং বস্তুটি একটি বৃত্তাকার পথে সুষমভাবে চলছে। বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল বলটি কিরণ।



ধরা যাক বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ  $a$ । অতএব কেন্দ্র সাপেক্ষে মেঝস্থানাঙ্ক  $r$ ,  $\theta$  ব্যবহার করলে

$$r = a$$

এবং  $\theta = \omega t$ , যেখানে বস্তুক্ষাটির  $t$  সময়ে  $\omega t$  কোণ ঘূরেছে। অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে বস্তুক্ষাটি বৃত্তপথের কেন্দ্রে  $\omega$  কোণ করে।

$$\text{আমরা দেখেছি যে, } r \text{ এর দিকে ত্বরণ} = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$$

$$\text{এবং } \theta \text{ এর দিকে ত্বরণ} = f = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta})$$


যেহেতু বর্তমান সমস্যায়  $\dot{\theta} = \omega$  = প্রবক্ষ দেওয়া আছে।

এবং  $r = a$  সর্বদা, অতএব বস্তুক্ষার ত্বরণের যে দুটি অংশ তারা ব্যাসার্ধদিকে  $-a\dot{\theta}^2$ , এবং প্রতি ব্যাসার্ধ দিকে 0। অতএব ক্ষাটির ভর  $m$  হলে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী ব্যাসার্ধদিকে  $-ma\omega^2$  বল অর্থাৎ বস্তুটির উপর কেন্দ্রভিত্তিয়া  $ma\omega^2$  এই বল ক্রিয়া করলে তবেই বস্তুক্ষাটি ঐ বৃত্তপথে সুষম বেগে চলবে।

## 10.6 কেন্দ্রীয় বলাধীন গতি

ধরা যাক একটি বস্তুক্ষার উপর সর্বদা এমন একটি বল ক্রিয়া করে যা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু (যাকে বলের কেন্দ্র বলা হবে) O ও ক্ষাটির অবস্থান সংযোজক রেখা বরাবর এবং বলটির পরিমাপ O থেকে বস্তুটির দূরত্ব  $r$ -এর উপর নির্ভর করে। বস্তুটির অবস্থান P হলে, বস্তু O থেকে P এর দিকে অথবা P থেকে O এর দিকে হতে পারে। (অর্থাৎ বলটি বিকর্ষক (repulsive) বা আকর্ষক (attractive) হতে পারে। এই ধরনের বলকে কেন্দ্রীয় বলে।

$$\text{অতএব কেন্দ্রীয় বলাধীন কোনো বস্তুক্ষার } m \text{ ভরযুক্ত হলে বলটি } \phi(r) \frac{r}{r}$$



যেখানে  $\phi(r)$  ধনাখাক হলে বলটি বিকর্ষক আর  $\phi(r)$  ঋণাখাক হলে বলটি আকর্ষক।

যেখানে  $r$  হল বস্তুক্ষার O সাপেক্ষে হান ভেঙ্গে।

অতএব নিউটন গতিসূত্র অনুযায়ী ঐ কণার গতি সমীকরণ হয়।

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = \phi(r) r \quad \dots (i)$$

এখন উভয়পক্ষকে  $r$  ভেক্টর দ্বারা ভেষ্টির শুণ করে পাই,

$$r \times m \frac{d^2 r}{dt^2} = r \times \phi(r) r$$

কিন্তু  $r \times r = 0$  অতএব

$$r \times m \frac{d^2 r}{dt^2} = 0 \quad \dots \text{(ii)}$$

$$\begin{aligned} \text{অতএব } & \frac{d}{dt} \left( r \times m \frac{dr}{dt} \right) \\ &= \frac{dr}{dt} \times m \frac{dr}{dt} + r \times m \frac{d^2 r}{dt^2} \\ &= 0 + r \times m \frac{d^2 r}{dt^2} \\ &= 0 \dots \text{(ii) হইতে} \dots \text{(iii)} \end{aligned}$$

অতএব (iii) সমাকলনের দ্বারা পাই।

$$r \times m \frac{dr}{dt} = \text{ক্রবক}$$


$$\begin{aligned} \text{অর্থাৎ, } & r \times \frac{dr}{dt} = \text{ক্রবক} = \text{প্রাথমিক মান} \\ & = r_0 \times V \quad \dots \text{(iv)} \end{aligned}$$

যেখানে  $r_0$  বস্তুকশার প্রাথমিক অবস্থান ভেক্টর এবং  $V$  প্রাথমিক গতিবেগ।

অতএব ক্ষাতির অবস্থান ভেক্টর  $r$  ও গতিবেগ  $\frac{dr}{dt}$  সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সমতলে থাকবে। অতএব বস্তুকশাতির অমরণপথ সমতলীয়।

**উদাহরণ :** একটি ক্ষা একটি নির্দিষ্ট হির বিন্দু অভিযুক্ত ব্যন্তি বর্গানুসারে আকৃষ্ট। ক্ষাতির প্রাথমিক অবস্থান  $r_0$  এবং প্রাথমিক গতিবেগ  $V$  হলে ক্ষাতির গতিবেগ নির্ণয় করুন।

ধরা যাক  $O$  দিকে বলাটি এমন যে



চিত্র 10.7

$$\phi(r) = -\frac{m\mu}{r^2} \quad (\text{যেখানে } m = \text{ভর, } \mu = \text{ক্রবক})$$

$$\text{ফলে বলাটি হইল } -\frac{m\mu}{r^2} \frac{r}{r}.$$

মেরু স্থানাঙ্ক  $r, \theta$  ব্যবহার করে নিউটনের গতিসূত্রানুসারে,

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{m\mu}{r^3} r$$

$$\text{অথবা, } \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} \quad \dots \text{(ii)}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{d}{dt} \left( \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) &= 2 \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \\ &= \frac{-2\mu}{r^3} \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \mathbf{r} \quad \dots \text{(ii) হইতে} \\ &= -\frac{\mu}{r^3} \frac{d}{dt} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) \\ &= -\frac{\mu}{r^3} \frac{d}{dt} r^2 \\ &= \frac{-2\mu}{r^2} \frac{dt}{dt} = 2 \frac{d}{dt} \left( \frac{\mu}{r} \right) \quad \dots \text{(iii)}\end{aligned}$$

(iii) সমাকলন করে

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{2\mu}{r} + C \quad \text{যেখানে } C = \text{গ্রহক।}$$

$$\text{কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় } \mathbf{r} = \mathbf{r}_0, \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{V}$$

$$\text{অতএব } V^2 = \frac{2\mu}{r_0} + C,$$

$$\text{অতএব } \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \text{ লিখলে}$$

$$\begin{aligned}v^2 &= V^2 + \frac{2\mu}{r} - \frac{2\mu}{r_0} \\ &= \mu \left[ \left( \frac{2}{r} \right) + \frac{V^2}{\mu} - \frac{2}{r_0} \right]\end{aligned}$$

## 10.7 ভেক্টর সমাকলনের প্রয়োগ (Application of Vector Integration)


### 10.7.1 বলকর্তৃক কৃতকার্য (Work done by a Force)

মনে করি একটি কণার উপর ক্রিয়াকারী একটি বল  $\mathbf{F}$  যখন কণাটি একটি বিন্দু  $\mathbf{r}_1(x_1, y_1, z_1)$  থেকে  $\mathbf{r}_2(x_2, y_2, z_2)$  এই বিন্দুতে একটি বিশেষ পথে গমন করে, তখন বলকর্তৃক যে পরিমাণ কার্য (Work) সম্পন্ন হয়, সেটা আমরা একটি রেখা সমকল রূপে লিখতে পারি। যেমন—

যদি কণাটি P বিন্দু থেকে Q বিন্দুতে সাধারণ সময়  $\Delta t$ -তে যাই, তাহলে এই সময়ে বল F কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাণ

$$= \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \mathbf{F}(r) \cdot \Delta r$$

অতএব কণাটি যদি A থেকে B বিন্দুতে গমন করে, তা হলে এই সময়ে F বল কর্তৃক কৃতকার্য



চিত্র 10.8

যেখানে  $r_1, r_2, \dots, r_n$  হল  $P_1, P_2, \dots, P_n$  বিন্দুগুলির স্থান ভেটার।

অতএব যদি  $n \rightarrow \infty$  এবং  $|\Delta r_i| \rightarrow 0$  অত্যোক i-এর জন্য,

তাহলে (1)-এর লিমিট হবে নিম্নের রেখা সমাকল।

$$W_{APB} = \int_{APB} \mathbf{F}(r) \cdot d\mathbf{r} \quad \dots (2)$$

মন্তব্য : কণাটির উপর ক্রিয়াকারী বলের কার্য সাধারণভাবে নির্ভর করে সম্পূর্ণ পথ APB এর উপর।

উপরান্ত 1. কোনো বলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে কার্য পরিমাণ কেবল প্রাথমিক বিন্দু A ও শেষবিন্দু B-এর উপর নির্ভরশীল এবং A ও B এর মধ্যবর্তী পথের উপর যদি তা নির্ভর না করে সেক্ষেত্রে আমরা কার্য পরিমাণকে একটি কার্য-অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। যেমন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A হতে কোনো বিন্দু P (r) পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কার্য পরিমাণ

$$W_p = \int_A^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \text{ যেখানে সমাকলণটিকে যে কোনো পথে A থেকে P-তে নেওয়া যেতে পারে।}$$

$P'(r + \Delta r)$  যদি P-এর নিকটস্থ বিন্দু হয়, তবে কণাটি A থেকে  $P'$  পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কার্য

$$W_{P'} = \int_A^{P'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_P^{P'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\therefore W_{P'} - W_p = \int_P^{P'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F}(r) \cdot \Delta r, \text{ যেখানে } \Delta r = r_{P'} - r_p. \quad \dots (3)$$

অতএব দেখা যাচ্ছে  $W_p$  একটি r-এর ক্ষেত্রে অপেক্ষক এবং  $\text{grad } W_p = \mathbf{F}(r)$

এখন  $W_p = -V_p$  লিখলে,  $\text{grad } V_p = -\mathbf{F}(r)$

এই  $V_p$  ক্ষেত্রে অপেক্ষককে F বল দ্বারা ক্রিয়াকারী ক্ষার বিভব (Potential energy) শক্তি বলে।

মন্তব্য 3. যদি  $\mathbf{r} = xi + yj + zk$  হয় তবে

$$d\mathbf{r} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}, \mathbf{F} = X\mathbf{i} + Y\mathbf{j} + Z\mathbf{k} \text{ হয়}$$

$$\text{তবে } \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int (Xdx + Ydy + Zdz)$$

উদাহরণ 1.  $\mathbf{F} = xi + yj + zk$  এই বলটি একটি কণার উপর  $\mathbf{r}_1 = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}$  অবস্থান থেকে  $\mathbf{r}_2 = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}$  এই অবস্থান পর্যন্ত ক্রিয়া করে, বল কর্তৃক কার্যের পরিমাণ কত?

$$\text{সমাধান : } 2 \cdot \text{কার্য} = 2x \int_{AB} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$= 2x \int_{AB} (xi + yj + zk) \cdot (dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k})$$


$$= 2x \int (xdx + ydy + zdz)$$

$$= \left[ x^2 + y^2 + z^2 \right]_A^B$$

$$= x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) = \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_1$$

অতএব দেখা যাচ্ছে এখানে কার্য শুধু  $\mathbf{r}_1$  ও  $\mathbf{r}_2$  ডেইন উপর নির্ভর করে।

(a.a)



চিত্র 10.9

উদাহরণ 2.  $\int \bar{F} \cdot d\bar{r}$ , যেখানে  $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}^2}{a^2} \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$  দুটি পথের

জন্য নির্ণয় করুন :

$$(1) \mathbf{r} = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} \quad (t = 0 \text{ থেকে } t = \frac{\pi}{2} \text{ পর্যন্ত})$$

$$(2) \mathbf{r} = (1-t) a\mathbf{i} + t a\mathbf{j} \quad 0 \leq t \leq 1.$$

পথমক্ষেত্রে

$$\bar{F} \cdot d\bar{r} = \left( \frac{a^2 \mathbf{i}}{a^2} + \mathbf{j} + \mathbf{k} \right) \cdot (-a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}) dt \quad (\because r^2 = a^2)$$

$$= (-a \sin t + a \cos t) dt$$

$$\text{অতএব পথমক্ষেত্রে } \int \bar{F} \cdot d\bar{r} = \int_0^{\pi/2} (-a \sin t + a \cos t) dt$$

$$= -a + a = 0$$

বিলীয় ক্ষেত্রে :

$$\bar{F} \cdot d\bar{r} = \{((1-t)^2 + t^2) \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}\} \cdot (-a dt \mathbf{i} + a dt \mathbf{j})$$

$$= [-a(1-2t+2t^2) + a] dt. \quad (\because r^2 = [1-t]^2 + t^2 a^2)$$

$$\therefore \int \bar{F} \cdot d\bar{r} = \int_0^1 [-a(1-2t+2t^2) + a] dt$$

$$= a \int_0^1 (2t - 2t^2) dt = a \left[ 1 - \frac{2}{3} \right] = \frac{a}{3}$$

অতএব দুটি পথের জন্য কার্যপরিমাণ আলাদা।

**সংজ্ঞা :** সংরক্ষী ফিল্ড (Conservative field) : কোন ভেট্টার ফিল্ড  $\mathbf{F}(r)$  যদি এমন হয় যে  $\mathbf{F}(r) = \text{grad } \phi(r)$ , যেখানে  $\phi$  একটি সন্তুত আংশিক অবকল্যুক্ত ক্ষেত্র, তাহলে ভেট্টার ফিল্ড  $\mathbf{F}(r)$  বেসংরক্ষী ফিল্ড বলা হয়।

**10.7.2 সংজ্ঞা :** অবৃর্ণক ফিল্ড (Irrotational field) যদি কোন ভেট্টার ফিল্ড  $\mathbf{F}(r)$  এমন হয় যে সর্বজ্ঞ  $\text{curl } \mathbf{F}(r) = 0$ , তবে এরাপ ভেট্টার ফিল্ডকে অবৃর্ণক ফিল্ড বলা হয়।

**উপপাদ্য 1 :**  $\mathbf{F}(r)$  সংরক্ষী ফিল্ড হলে,  $\text{curl } \mathbf{F} = 0$  হবে।

প্রমাণ :  $\mathbf{F}(r) = \text{grad } \phi$ ,  $\phi$  ক্ষেত্র, অতএব  $\text{curl } \mathbf{F} = \text{curl grad } \phi = 0$ .

অতএব  $\mathbf{F}(r)$  সংরক্ষী হলে অবৃর্ণক হবে।

**উপপাদ্য 2 :**  $\mathbf{F}(r)$  অবৃর্ণক ফিল্ড হলে,  $\mathbf{F}(r)$  সংরক্ষী ফিল্ড ও হয়।

প্রমাণ : যেহেতু  $\mathbf{F}(r)$  অবৃর্ণক, অতএব  $\text{curl } \mathbf{F}(r) = 0$

অর্থাৎ  $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$  হলে,

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$$

আমরা একটি ক্ষেত্র অপেক্ষক  $\phi(x, y, z)$  নির্মাণ যাতে

$$\phi(x, y, z) = \int_{x_1}^x F_1(t, y_1, z_1) dt + \int_{y_1}^y F_2(x, t, z_1) dt + \int_{z_1}^z F_3(x, y, t) dt$$

যেখানে প্রথম সমাকল হল  $(x_1, y_1, z_1)$  বিন্দু থেকে  $(x, y_1, z_1)$  বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা বরাবর

দ্বিতীয় সমাকল হল  $(x, y_1, z_1)$  বিন্দু থেকে  $(x, y, z_1)$  বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা বরাবর

তৃতীয় সমাকল হল  $(x, y, z_1)$  থেকে  $(x, y, z)$  সরলরেখা বরাবর

অতএব

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = F_3(x, y, z)$$


$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2(x, y, z_1) + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_3}{\partial y}(x, y, t) dt$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = F_2(x, y, z_1) + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_2}{\partial t}(x, y, t) dt \quad \left[ \because \frac{\partial F_3}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial z} \right]$$

$$= F_2(x, y, z_1) + F_2(x, y, z) - F_2(x, y, z_1)$$

$$= F_2(x, y, z)$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \phi}{\partial x} &= F_1(x, y_1, z_1) + \int_{y_1}^y \frac{\partial F_2}{\partial x}(x, t, z_1) dt + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_3}{\partial x}(x, y, t) dt \\
 &= F_1(x, y_1, z_1) + \int_{y_1}^y \frac{\partial F_1}{\partial t}(x, t, z_1) dt + \int_{z_1}^z \frac{\partial F_1}{\partial t}(x, y, t) dt \\
 &= F_1(x, y, z_1) + F_1(x, y, z_1) - F_1(x, y, z_1) + F(x, y, z) - F_1(x, y, z_1) \\
 &= F_1(x, y, z).
 \end{aligned}$$



চিত্র 10.10

অতএব আমরা দেখতে পাইছি  $F(r) = \text{grad } \phi$  অতএব  $F(r)$  একটি সংরক্ষিত ভেস্টের।

উপপাদ্য 3 :  $E$  একটি অধূর্ণক ভেস্টের ফিল্ড হলে যে কোনো বন্ধ বক্ররেখার দিকে  $E$  এর সমাকল শূন্য হবে।

$$\text{কারণ, } \oint_C E \cdot dt = \int_s \text{curl } E \cdot n \, ds \quad \dots (i)$$

(স্টোকস উপপাদ্য)

যেখানে  $S$  হল একটি তল যার সীমারেখা হল  $C$ . ( $C$  বক্ররেখা দ্বারা  $S$  তলটি আবদ্ধ।)

কিন্তু  $E$  অধূর্ণক ভেস্টের হওয়ায়  $E = \text{grad } \phi$ , যেখানে  $\phi$  একটি ক্ষেত্রের অপেক্ষক।

অতএব (i) থেকে

$$\begin{aligned}
 \oint_C E \cdot dl &= \int_s (\text{curl grad } \phi) \cdot n \, ds \\
 &= 0 \quad \text{যেহেতু curl grad } \phi = 0.
 \end{aligned}$$

### 10.7.3 একটি ভেস্টের অপেক্ষক $F(x)$ এর একটি বন্ধতল সাপেক্ষে উদ্গমন (Flux) বা প্রবাহ

একটি ত্রিমাত্রিক দেশে (space) একটি বন্ধ তল  $S$  (যেমন একটি বন্ধতল গোলক  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ) নেওয়া হল। ঐ দেশে একটি ভেস্টের অপেক্ষক  $F(r)$  সংজ্ঞাত হলে এবং ঐ তলের একটি বিন্দু  $P$  তে তলের বহিঃস্থ অভিলম্ব একক ভেস্টের  $n$  হলে, আমরা ঐ বন্ধতলের সাপেক্ষে  $F(r)$  এর উদ্গমন (flux) বলতে বুঝব

$$\int_S F(r) \cdot n \, ds \quad \dots (1) \text{ এই তল সমাকল}$$

**মন্তব্য :** যদি  $F(r)$  কোন সস্তত (একক ভর ঘনত্ব যুক্ত) বস্তুগুলোর  $r$  বিন্দুতে অবস্থিত বস্তুকণার গতি ভেস্টের হয় তাহলে  $F(r) \cdot n \, ds$  হল  $ds$  ক্ষেত্র দিকের গমনকারী বস্তুর আয়তন এবং  $\int F \cdot n \, ds$  বুঝাছে কি আয়তন বস্তু প্রতি একক সময়ে  $S$  তল মধ্য দিয়ে  $S$  এর বাইরে যাচ্ছে। গ্যাউস এর

উপপাদ্য অনুযায়ী

$$\int_S F(r) \cdot n \, ds = \int_V \text{div } F \, dv \quad \dots (2)$$

অতএব আমরা দেখলাম যে একটি বন্ধ তলের সাপেক্ষে একটি ভেস্টের অপেক্ষকের উৎগমন এই ভেক্টরের ডিস্ট্রাভেক্ষের আয়তন সমাকলের সমান।

#### 10.7.4 সলেনয়োডীয় ভেস্টের অপেক্ষক (Solenoidal Vector Function)

একটি অঞ্চলে যদি কোনো ভেস্টের অপেক্ষক এমন হয় যে ঐ অঞ্চলে যে কোনো বন্ধ তলের সাপেক্ষে এই ভেস্টের অপেক্ষকের উৎগমন (flux) সর্বদা শূন্য হয়, তা হলে এরূপ ভেস্টের অপেক্ষককে বলা হয় সলেনয়োডীয় ভেস্টের অপেক্ষক। গাণিতিকভাবে লেখা যায় যে  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  যদি একটি অঞ্চলে এমন হয় যে কোনো বন্ধতল  $S$  এর জন্য

$$\int_S \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = 0$$

তাহলে  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  একটি সলেনয়োডীয় ভেস্টের।

উপপাদ্য 1 : যদি  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  একটি ভেস্টের অপেক্ষক  $\psi$  এর কার্ল (curl) এর সমান হয় অর্থাৎ  $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \text{curl } \psi = \text{curl}(\psi_1, \psi_2, \psi_3)$  হয়, যেখানে  $\psi_1, \psi_2, \psi_3$  তিনটি অপেক্ষক তাহলে  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  সলেনয়োডীয় ভেস্টের অপেক্ষক হবে। কারণ

$$\int_S \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = \int_V \text{div} \mathbf{F} dV = \int_V \text{div} \text{curl } \psi dV = 0 \quad \text{যেহেতু}$$

(গাউসের প্রতিঞ্চা অনুসারে)

উপপাদ্য 2 : একটি ভেস্টের অপেক্ষককে দৃঢ়ি ভেস্টেরের যোগফল রূপে লেখা যায়, যার প্রথমটি একটি স্কালার অপেক্ষকের গ্রেডিয়েন্ট এবং অপরটি একটি ভেস্টের অপেক্ষকের কার্ল। অর্থাৎ

$\mathbf{F}(\mathbf{r})$  অপেক্ষককে

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \text{grad } \phi + \text{curl } \psi$$

যেখানে  $\phi$  একটি স্কালার অপেক্ষক এবং  $\psi$  একটি ভেস্টের অপেক্ষক। (এই উপপাদ্যটির প্রমাণ এখানে দেওয়া হল না।)

উপপাদ্য 3.  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  যদি একটি সলেনয়োডীয় ভেস্টের অপেক্ষক হয়, তা হলে  $\text{div } \mathbf{F}$  প্রতিটি বিন্দুতে শূন্য হবে।

$$\int_S \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} d\mathbf{s} = 0$$


$$\text{অর্থাৎ } \int_V \text{div} \mathbf{F} dV = 0. \quad (\text{গাউসের উপ: অনুযায়ী})$$

কিন্তু উপরের সমাকল যে কোন ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য সত্য হওয়ায়,  $\text{div } \mathbf{F}$  সন্তুত হলে,  $\text{div } \mathbf{F}$  প্রতিটি বিন্দুতে শূন্য হবে।

উদাহরণ 1 : যদি  $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = x^2 \mathbf{i} + y^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$  একটি ভেস্টের অপেক্ষক হয়, এবং  $|\mathbf{r}| = a$  একটি গোলক তল  $S$  হয়।  $S$  এর সাপেক্ষে  $\mathbf{v}$  এর উৎগমন (flux) নির্ণয় করুন।

এখানে  $S$  এর সমীকরণ হল

$$f(x, y, z) \equiv x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ এবং}$$



$$\text{ন হল } \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}}{\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{অতএব ফ্লাক্স} &= \int_S \vec{v} \cdot \vec{n} \, ds = \int \frac{x^3 + y^3 + z^3}{a} \, ds \\ &= a^2 \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\phi=0}^{\pi/2} (\sin^3 \theta \cos^3 \phi + \sin^3 \theta \sin^3 \phi + \cos^3 \theta) a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &\quad (x = a \sin \theta \cos \phi, y = a \sin \theta \sin \phi, z = a \cos \theta \text{ বসিয়ে}) \\ &= a^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} (\sin^4 \theta \cos^3 \phi + \sin^4 \theta \sin^3 \phi + \cos^3 \theta \sin \theta) \, d\theta \, d\phi \\ &= 0 + 0 + 2\pi \frac{a^4}{4} = \frac{\pi}{2} a^4 \end{aligned}$$

উদাহরণ 2 : যদি  $\vec{v}(\vec{r}) = k(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = k\vec{r}$  হয়

তবে  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  এই গোলক সাপেক্ষে  $\vec{v}$  এর ফ্লাক্স নির্ণয় করুন। [উৎ:  $4\pi k$ ]

সংকেত : উদা. 1 এর মত করুন। এখানে  $\vec{v} \cdot \vec{n} = k$  [উৎ:  $4\pi k$ ]

## 10.8 সারাংশ

এই এককে ভেষ্টের ক্যালকুলাস প্রয়োগ করে (1) একটি রেখার স্পর্শক, প্রধান অভিলম্ব ও দ্বিতীয় অভিলম্ব এসের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এর ফলে বক্ররেখার প্রতি বিন্দুতে বক্রতাব্যাসার্থ ও মোচড় এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে। সমাকলের সাহায্যে একটি বস্তুকগার উপর প্রযুক্ত বল কর্তৃক কৃতকার্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। সংবর্ধনী বল ভেষ্টের, অঘূর্ণক ভেষ্টের ও সলেনজীয় ভেষ্টের হওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে। কোন বক্র তলের সাপেক্ষে ভেষ্টের অপেক্ষকদের উৎগমন (flux) এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

## 10.9 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. বল  $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$  বল, একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল এবং কণাটির অবস্থান  $A(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$  থেকে  $B(2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})$ -তে গেলে বলকর্তৃক কৃতকার্য কত?

2.  $\vec{F} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j}$  একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল। কণাটি  $x^2 + y^2 = 4$  এই বৃত্তে একটি বিন্দু হতে যাত্রা করে এই বৃত্তপথে একই বিন্দুতে পুনরায় এলে বল  $\vec{F}$  কি পরিমাণ কার্য করবে?

3. দেখান যে  $\vec{F} = f_1(x)\vec{i} + f_2(y)\vec{j} + f_3(z)\vec{k}$

একটি অসূর্যক ভেক্টর।

4.  $\vec{F} = f_1(y, z)\vec{i} + f_2(z, x)\vec{j} + f_3(x, y)\vec{k}$  হলে দেখান যে,  $\vec{F}$  সঙ্গেনয়েভীয়।

5. যদি  $\vec{F} = \nabla\phi$  হয়, যেখানে  $\phi$  হল একটি ক্ষেত্রের অপেক্ষক যার আংশিক অবকলসমূহ সম্পৃক্ত, তাহলে দেখান যে কোনো কণা যে কোনো বিন্দু  $P_1(x_1, y_1, z_1)$  থেকে  $P_2(x_2, y_2, z_2)$  বিন্দুতে যেতে  $\vec{F}$  কর্তৃক কৃতকার্য, পথের উপর নির্ভর করে না।

6. যদি  $\vec{F} = (2xy + z^3)\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j} + 3z^2x\vec{k}$  হয় তবে দেখান যে এটি একটি সংরক্ষী বলের ফিল্ড।

7. মান নির্ণয় করুন :  $\int_S \vec{r} \cdot \vec{n} \, ds$  যেখানে  $S$  একটি বন্ধুতল

8. প্রমাণ করুন :  $\int_V \text{grad } \phi \, dv = \int_S \phi \, \vec{n} \, ds$

9. যদি  $x = -1, y = -1, z = -1, x = 1, y = 1, z = 1$ , এই তিনি ছয়টি দ্বারা গঠিত একটি ঘনকের তল  $S$  হয় তা হলে  $\int_S \vec{r} \cdot \vec{n} \, ds$  নির্ণয় করুন।

10. যদি  $\vec{A} = 5x\vec{i} + 10y\vec{j} + 30z\vec{k}$  একটি ভেক্টর ফিল্ড হয়, তা হলে  $S$  একটি বন্ধুতল হলে  $\int_S \vec{A} \cdot \vec{n} \, ds$  নির্ণয় করুন।

## 10.10 উজ্জ্বলমালা

1. উজ্জ্বর 26

2. সংকেত : বৃক্ষের একটি বিন্দু  $(2, 0)$  থেকেরওনা হয়ে কণাটি ঐ বিন্দুতে ফিরে এলো কার্যপরিমাণ

$$= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (\text{বৃক্ষের সমীকরণ } x = 2\cos\theta, y = 2\sin\theta)$$

$$= \int_{\theta=0}^{2\pi} (4\cos^2\theta\vec{i} + 4\sin^2\theta\vec{j}) \cdot (-2\sin\theta\vec{i} + 2\cos\theta\vec{j}) d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (-\cos^2\theta\sin\theta + \sin^2\theta\cos\theta) d\theta$$

$$= 0.$$

3. উজ্জ্বর :  $\phi = \int f_1(x)dx + \int f_2(y)dy + \int f_3(z)dz$

$$\text{হলে } \frac{\partial\phi}{\partial x} = f_1(x), \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = f_2(y), \quad \frac{\partial\phi}{\partial z} = f_3(z)$$

অন্তএবং,  $\vec{F} = \text{grad } \phi$ , অতএব  $\vec{F}$  একটি অসূর্যক ভেক্টর

4.  $\because \int_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \int_V \text{div } \vec{F} \, ds = 0$  অতএব  $\vec{F}$  সঙ্গেনয়েভীয়।

$$\begin{aligned}
 5. \text{ সমাধান : } \text{কারণ কার্যপরিমাণ} &= \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\
 &= \int_{P_1}^{P_2} \left( \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k} \right) (idx + jdy + kdz) \\
 &= \int_{P_1}^{P_2} \left( \frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \right) \\
 &= - \int_{P_1}^{P_2} d\phi = \phi(P_2) - \phi(P_1)
 \end{aligned}$$

সূতরাং কার্যপরিমাণ শুধুমাত্র  $P_2$  ও  $P_1$  এর অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

অতএব  $P_1$  থেকে  $P_2$  যে পথেই যাওয়া হোক না কেন,  $\mathbf{F}$  কর্তৃক কার্য-পরিমাণ অপরিবর্তিত হবে।

$$6. \text{ সংকেত : } (2xy + z^3, x^2 + y^2, 3z^2x) = \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \left( x^2y + z^3x + \frac{1}{3}y^3 \right)$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad &\iint_S \bar{r} \cdot \bar{n} ds \\
 &= \iiint_V (\operatorname{div} \bar{r}) dx dy dz \\
 &= \iiint_V 3 dx dy dz = 3V, \quad V = s \text{ তল দ্বারা বক্ষ আয়তন।}
 \end{aligned}$$

8. যদি  $\bar{c}$  একটি প্রবক্ত ভেষ্টন (অর্থাৎ মান ও দিশা অপরিবর্তনীয় হয়, তবে  $\phi$  টি এই ভেষ্টনের সাপেক্ষে গাউস্ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী।

$$\int_v \operatorname{div}(\phi \bar{c}) dv = \int_s \phi \bar{c} \cdot \bar{n} ds$$

$$\text{কিন্তু } \operatorname{div}(\phi \bar{c}) = (\operatorname{grad} \phi) \cdot \bar{c} + \phi \operatorname{div} \bar{c} = (\operatorname{grad} \phi) \cdot \bar{c}$$

$$\text{অতএব, } \int_v (\operatorname{grad} \phi) \cdot \bar{c} dv = \int_s \bar{c} \cdot \phi \bar{n} ds$$

$$\text{বা, } \bar{c} \cdot \left[ \int_v \operatorname{grad} \phi dv - \int_s \phi \bar{n} ds \right] = 0$$

কিন্তু টি আমাদের স্বেচ্ছাধীন একটি ভেষ্টন। অতএব  $\int_v \operatorname{grad} \phi dv = \int_s \phi \bar{n} ds$

9.  $\Omega: 24$

10.  $\Omega: 45V, V = S$  দ্বারা বক্ষ আয়তন।

## NOTES