

## Question Bank

ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম ( Elective Course )

### উদ্ভিদবিদ্যা ( Botany )

ষষ্ঠ পত্র (6th Paper )

**Morphology & Embryology, Taxonomy : EBT-06**

- 1 Spikelet inflorescence is found in the family \_\_\_\_\_  
স্পাইকলেট বা অনুমঞ্জরী পুষ্পবিন্যাস যে গোত্রের মধ্যে দেখা যায়, তা হল - \_\_\_\_\_
- 2 Internode between androecium and gynoecium is called: \_\_\_\_\_  
পুংস্তবক থেকে স্ত্রীস্তবকের পর্বমধ্যকে বলা হয় - \_\_\_\_\_
- 3 A flower that can not be cut into two equal halves through vertical plane is called : \_\_\_\_\_  
কেন্দ্র বরাবর যে ফুলকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করা যায় না ,সেরকম ফুলকে বলা হয় - \_\_\_\_\_
- 4 When in a flower the stamens are in two whorls,the first being antipetalous, i.e. alternating with sepals and the second being antisepalous ,i.e. alternating with the petals,the flower is called:  
\_\_\_\_\_ দুটি আবর্তে সাজানো ফুলের পুংকেশরগুলির মধ্যে বাইরের আবর্তটি পাপড়ির বিপরীতে থাকে এবং ভিতরের আবর্তটি বৃত্যংশের বিপরীতে থাকে, এরূপ ফুলকে বলে - \_\_\_\_\_
- 5 A soft raceme, spike-like pendulous inflorescence of small apetalous unisexual flowers is called:  
\_\_\_\_\_ একলিঙ্গ ফুলবিশিষ্ট ,দলছাড়া ঝুলন্ত নরম রেসিম বা রেসিম সদৃশ পুষ্পবিন্যাসকে বলা হয় - \_\_\_\_\_
- 6 Stamens remaining attached on the petals are known as: \_\_\_\_\_  
দলাংশের উপর সংযুক্ত পুংকেশরকে বলা হয় - \_\_\_\_\_
- 7 Individual segments of perianth is known as: \_\_\_\_\_  
পুষ্পপুটের এক একটি অংশকে বলা হয় - \_\_\_\_\_
- 8 Formation of seed without fertilization is known as: \_\_\_\_\_  
নিষেক ছাড়া সৃষ্ট বীজ তৈরীকে বলা হয় - \_\_\_\_\_

9 Pollination of a flower from the pollens produced by a different flower of same plant is known as:

একই গাছের দুটি পৃথক ফুলের মধ্যে পরাগসংযোগকে বলা হয় - \_\_\_\_\_

10 Seed dispersal through explosive mechanism is called: \_\_\_\_\_

বিদারী পদ্ধতিতে (explosive mechanism) বীজের বিস্তারকে বলা হয় - \_\_\_\_\_

11 The artificial system of classification was introduced by: \_\_\_\_\_

কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রচলন করেন : \_\_\_\_\_

12 The group "Lignosae" was recognised in the classification of: \_\_\_\_\_

"লিগনোসি" (Lignosae) বিভাগটি শ্রেণীবিন্যাসে পরিচিত করেন : \_\_\_\_\_

13 Tetradynamous stamens are found in: \_\_\_\_\_

দীর্ঘ চতুষ্টয়ী পুংকেশর দেখা যায় - \_\_\_\_\_

14 Pappus is the modified organ of: \_\_\_\_\_

প্যাপাস (pappus) একটি রূপান্তরিত অঙ্গ যা আসলে - \_\_\_\_\_

15 Synandrous stamens and inferior ovary are found in: \_\_\_\_\_

সাইনান্ড্রাম পুংকেশর এবং ইনফিরিয়র ওভারি যে গোত্রে দেখা যায়, তা হল - \_\_\_\_\_